

Solanum

inoquale

Solanum caule petiolisque aculeatis, foliis oblongo ovatis integris
stellato-punctatis

Habitat in Martinique & set

Caulis fruticosus, teres, stellato villosus, flavescens; sordide tomentosus;
aculei parvi, recurvi. Folia geminata, tripolliciana vel parum
ultra, alterum brevius et brevius petiolatum, supra e villis distantibus
punctata, subtus villosiora, attenuata, acuta, altero latere bases
saepe breviora, supra sulco longitudinali. Petiolus longior & equi
pollicari, superiores cespitantes, inferiores glabiores. Peduncul:

a sarmento
50 la
Mark non videtur
diverum accidit
quod ad flexus
mem fuerit vero
mentandi

supra foliacei, solitarii, pollicares, incant. & lora racemosi. Calyx
quinquefidus, laciniis lanceolata, uti ^{pedicelli floriferi} petal. corollaque extus fla

vido tomentosius. Corolla squifida: laciniis linearer. Bacca globo
sa, Perisperm duplo minorer, glabra, lora.

#: pedicelli fructiferi 3 & equi pollicares, glabri, sursum sensim
incrassati, aculeo uno alterove adspersi
persistens, fructu brevior, aculeolatus

rhomboidale Solanum Tomentosum, caule ramisque aculeatis, foliis rhomboides
ovatis, integris subangulatisque, floribus umbellatis. Vetrandri.

Habitat in Puerto Rico. herb. Fusidae, ad littora maris in maxima
fruct.

Caule suffruticosus, ramosus, teres, uti tota planta Tomento denso vetrandri
flavescente vetrandri. Aculei sparsi, ^{rami} in caule, ramisque unus vel
alter in foliorum costa subtus, recurvi, glabri, teretes, basi latiores. Solan
subpetiolatis, gemmae remotae, gemmae, alternum 3-5 pollicibus, utrinque
angulis duobus remotis absque sinu, alterum duplo minus, inter
gnum, apice angulisque obtusis, ^{basi acutis} crassa, supra scabriuscula, subtus
magis Tomentosa, umbellae laterales, a foliis remotae, sessiles, cit
iter q flor. Pedicelli unguiculares, uti calycis herti. Flores par
vi. Calyx inermis, laciniis subulatis. Bacis magnitudine Pipe
nis nigri, glabro.

Convolvulus

~~Convolvulus orientalis, humifusus, pedicellifolius Tournef. Cor. p.~~

~~Habitat in Oriente herb. mus.~~

~~Paulis herbis. . . folia opposita, lanceolata, petiolo, integerrima. Pedunculi pitha
moi, bifidi. Stos in diversis fasciis, 4 vel 5que in singulis ramo, remotis, subsessi-
lis. . . folia duo ad basin singuli calycis~~

grandiflorum ^{hirsutum sublanatum} 3
Solanum foliis sinuato-lobatis, oblongis persistibus utrinque ^{calycibusque} aculeatis
floribus racemosis

Habitat in Guinea, ^{in maturis} fructus in colis esculentis Thonning;

Caulis herbaceus, erectus, ^{hirsutus} sublanatus, uti petioli, folia juniora,
dentata, pedunculi et basi calycum, subnervis. Volea persistens, epithi-
mosa et ultra, oblonga, basi acuminata, lobis utrinque 3-4
ovatis sinuata apicibus obtusis, ^{intermediis} intertus versus lobo obtusis,
et pilis sparsis pubescentia, costa et venis utrinque aculeatis;

Congore bipolli ^{Cari} aculeis unguicularibus compressis, flavis, glabris. Racemi latera-
les; 4. 5 flori, flores cernui. Calyx sive partitus: lacinis lan-
ceolatis, aculeatis, aculeis acicularibus, sive partitus: lacinis

attenuato. ^{regulans} lanceolata, ^{conulescens} corolla rotata, ^{regulans} extus pilosus, quinque-
quangulatus, quinquefidus; lacinis ovatis, acutis.

Racem^{sub} globosa, magnitudine pomi majoris, glabra, ramosa, ser-
vata lutea, calyce magno ^{aculeato} insidens. Thonning

~~hastata~~ *Convolvulus*

Det. la Mart.

Solarum

Habitat in Antillis Herb. Surinam. no 85. P. opus Guss.

affine obfuro. Solae geminatae, ovato oblongae, vel ellipticae lanceolatae, altera margine basi brevior, attenuata, subtus uti petioli et costa adpressi aculeis parvis frequentibus, supra glabra, subtus uti caulis villosi. Racemi villosi. Calyx et corolla carinae. Corolla profunda fissa: lacinae lineares

Sela nua

Ha bita in Antillis et Guaf. Surinam herb.

inorme. Caulis herbaceus, dichotomus, glaber, angulatus. Folio petio
lata, remotissima, 2-3 pollicaria, ovata, attenuata, integerrima, gla
berima, amplexu acuta, apice gemina, altero minore vel terna
ta, demum solitaria. Pedunculus dichotomus vel apice ramulo
sum, solitarie pollicaris, uniflorus. Massa magnitudine Pipe
ris nigri
confer cum Sol. in Guon. var. notum Guacqui

humile Solanum

Habitat herb la Mantia

Rami superne canescentes. Acilici in sumis, foliis utrinque, petioli pedunculis
lis calycibusque rectis flavis. Folia polliciana, ovato-oblonga, obtusa, altero
latere breviora, sinuato-dentata; dentibus ovatis, integerrimis, obtusis, opo-
centis villosa. Racemi laterales, 2-4 flori. Calycis foliola lanceola-
ta. Corolla coerulea, extus villosa. Baccæ magnitudine pep-

Confes ram caput

Latifolium Solanum

Habitat herb. La Martini

semulis nigro, diversum caule persistente, semipetali, pedunculis longioribus

Solanum

Solanum hesperium peregrinum non fruticosum fructu rotundo parvo Bononiae

Statet herb. Bonon. in bibliotheca Leidunensi

Caulis fruticose, erectus. Rami teretes, superne inanis tomentosi. Solia petiolatis, oblonga, basi ovata, subaequalia, sed altero latere interdum parum breviora, b. f.

In pollicaria, integerrima, integra, raro sine obscure, acuta, supra glabra, subtus inanis, tomentosa. Paniculae terminales et laterales, trichotomi. Flores racemosi. Calycis lacinae parvae, lanceolatae. Corolla candida, Sol. bononiensi dimidio minor: lacinae ovatae, extus medio tomentosa. Bacca globosa, locis

nisi duplo majores.
affinis Sol. bononiensi

Submicium Solanum

Habitat . herb. Thauri 5

Caulis fruticosus. Rami apice tomentosi, uti petioli et floris, inermes. Solia
bipollicaria et ultra, ovato-oblonga, supra glabra, subtus villosa-canescentia
costa aculeis paucis, recurvis, parvis adpersa, integra. Pedunculi terminali-
pedicelli approximati, subracemosi. Calyx truncatus. Corolla lacinis lacino
lato, unguiculatis
an obpinnatis?

La Mantz

1
Sarcocolla belandana.

Habitat in Java herb. Thoninii

Ferme, glabrum. Folio petiolata, 4-5 pollicaria, elliptico-lanceolata, utrinque acuta, integra. Pedunculi laterales ^{inquinulose} pedicelli plures, umbellati, pedunculo parvis
longioribus. Flores parvis, albidis. Calyx squarrosus: laciniis ovatis

indiflorum Solanum

Habitat in St. Domingo herb. Thunbergii

Anerme, glabrum. Caulis herbaceus. Folia petiolata, basi stipulicaria, elliptica
cuneolata, attenuata, integerrima. Pedunculi laterales et ex apice ramu-
lorum, cum foliis duobus altero minore. Flores parvi, umbellati, 5-que profun-
dissime. Ramuli superiores canescentes.

pyrifolium Solanum

Habitat herb- la Manthui

Inermis. Rami glabri. Folia petiolata, pollicaria, ovata, obtusiustula
glabra, venosa. Panniculi laterales et terminales. Calycis lacinae ob-
tusae. Corolla villosa

Cornutum Solanum

Attabit herb. La Martini

*Folia magna, semipedalia, lato, utrinque tomentosa, incana. Racemi la-
terales multiflori. Calyx foliola lanceolata. Corolla pollicari*

Solanum

Habitat in America antillis herb. Sur. no 850.

Rami teretes, villosi, adpressi aculeis minutis. Folia petiolata, geminata, elliptica, ovata, 4 pollicaria, altero panem minor, altero latere basali breviora, supra glabra nuda, punctata, subtus villis stellata, scabriscula, costa aculeis parvis recurvis subtus, integerrima, nervi laterales multi flori, solitarii, villosi, inanis, inermes, tripollicares: pedicelli pollicares. Corolla spatulata: laciniis linearibus extus inanis ab obscuro fere non diversum

vel barbatum

Solanum

Habitat in Borana herb. mus.

Caulis herbaceus, subaerescens. Folia petiolata, lanceolata vel subovata lanceolata
dentata subpinnata, ore luteo villosa, pollicaria. Pedunculi laterales folio brevioris:
pedicelli 4. umbellati. Calycis lacinae obtusae

Solanum

Habitat in Bonaria herb. Mus.

Fruticifera, ramifera, inerme: Rami flexuosi, inani. Folia petiolata, approxi-
mata, frequentia, serrulata, vix semipollucina, catagemma, interdum basi dentata
parvo subhastata. Pedunculi laterales et terminales, 2-3flori. Flores parvi

an varietas cheimodactylea

Solanum

Solanum acanthophyllum species horridum flore albo Cimet. Reg.

Habitat herb. Mus.

Cauli herbaceus? crassitie pennis cymis, canescens. Aculei fere pollicares, copiosi, flavi, compressi, recti, glabri in caule, petiolis, foliis utrinque pedunculisque. Folia ovata, longitudine et latitudine fere aequalia, subpinnatifida, fruticosa et ultra, petiolata, supra glabra, subtus leviter tomentosa. Lacinis ovatis, acutis integerrimis. Petioli incani. Racemi laterales brevissimi. Calyx dentibus quinque minutis, inermis, incanis.

Solanum

Solanum abo resens *puschpinum* foliis amplioribus laciniatis annuum herb. Villb. herb.
Habitat. herb. mes.

Caulis herbaceus erectus, glaber. aculei frequentissimi in caule, compressi, raris
vix ferri vaginulares, recti, raris longiores in petiolo & utrinque in ramis
foliiferum. Solia petiolata, semipedalia, ovata, acuta, dentata subpinnatifida
Dors: dentibus parvis, remota subdentatis, juniora utrinque vellopelo, ad altera
glaberrima, oculo armato supra pilis decumbentibus, simplicibus, subtus stellatis
Pedunculis lateralibus bipartitis, meris pollicariis, raris parvis longioribus, flexis vix
moxi, approximatis plurimi. Calycis laciniis lanceolatis, meris petala lan-
ceolata. Stylus nullus in fructibus. Stamina 5 quae reliqua fertilia

Solanum

Habitat in Insula Bourbonia Commerf.

Racis Solan. virginiani, a culcis horridum, nitidis, longis, semipollicantibus frequentibus; in caule petiolis foliis utrinque et calycibus. Caulis herbaceus glaber, uti folia, flexuosus, ramifus, ^{et flua} supra puncti raris pinnis adpressis, pennatifida: laciniis dentato angulata, oblonga, acuta basi altero latere breviora. Racemi laterales, tripartiti. Calycis laciniis breves, ovato. Poda ~~to~~ ex his submentosa: laciniis lanceolata. Stamina 5. Flores inferiores absque stylo

confer cum indico La Mart

cornutum Solanum

Habitat in America herb. ^{parvis stellatis subulloper}
Caulis herbaceus, canescens. ^{folia} petiolata, pennata, pennis oblongis penna
tripidis, supra glabri, subtus adpressi pili stellatis: lacinae oblonge, angulatae
vel subpinnatae, acutae, aculei utraque verti, unguiculari vel longiore
vel breviori, flavi frequentes; uti in ramis, petiolis, pedunculis calycibusque
minoribus. Racemi laterales breves. Calycis lacinae lanceolatae. Corolla
ovata attenuata ~~corolla~~ flava. Stamina quinque: Anthera unica
reliquis longiora.

Solanum

Solanum creticum frutescens chenopodii folio Tournef. Cor.
β Solanum creticum arborescens chenopodii folio Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Tusc.

^{4 n. n. m.}

Caulis fruticosus, erectus, teres, flexuosus, glaber, ramosus; rami apice villosi.
Folia petiolata, oblonga vel subovata, per petiolum parum decurrentia, acuta,
vel egemina, vel dentibus 2-3 utraque, glaberrima, remote subnervosa. Umbel-
læ laterales et terminales. Pedicelli 6-7. villosi canescentes. Flores par-
vi. Calycis laciniæ ovatae. Baccæ magnitudine Solani nigri. Solen
α β lanceolata

α Sol. chenopodii folio La Mark Divesqua

Solanum

Habitat in monte rideo Com-maspon herb. Puzos.

Inermis. Caulis herbaceus, dichotomus, vellosus, flexuosus, teres. Folia petiolata, semi-
peltata vel ultra, oblonga vel subovata, obtusa, integerrima vel basi utrinque 1-2
dentata, interdum peltata et ultra, dentato-fimbriata, per petiolum, decurrentia,
utrinque vellosula. Umbella lateralis, 5-6 flora. Flores parvi. Calycis lacinae ovatae.
Corolla lacinae albae, lanceolatae.
³*Solanum* ⁴*nigro* ⁵*baucis* ⁶*magitudine*

mammosum? Solanum

Habitat in America herb. sui

Cauli hirsutus, uti petroli. aculeis compressi, inferiores lanceolato latiores et breviores, superiores uti petrolonum et foliorum fere semipollicares, omnes rati, flavi, nitidi. Folia basi squeloba, villosa, utrinque cuneata, remote nervosa. Lobi ovati, dentato-sinuati.

Species foliorum fere solani fruticosi non multum abliedit a solano depicta in fasciculo tertio ticonum.
forte a Linnaei Divesum.

recurvatum Solanum

Habitat in America herb. Lus.

Caulis perpaucis, glaber, adpressus aculeis frequentissimis, lanceolatis, flavis
subrecurvis. Folia petiolata, spithamea et ultra, late ovato-oblonga, quinqueloba
lobi ovati, integerrimi, vel dente uno alterove subsinuati, acuti, utraque
pili adpersa supra simplicibus, subtus stellatis scaberrima, supra nervosa
subtus pallidiora subvenosa, utraque, utriusque petioli, in nervis et venis majoribus
aculei recti, flavi, unguicularis vel minoris glabri, nitidi. Petioli glabri
1-2 pollicares. Pedunculi laterales, pollicares, bifidi, ramis longitudine
pedunculi, glabri. Flores racemosi, parvi. Calyci ^{apertis} lacinis reflexis, lanceolatis
an S. stramonifolium L. Mark ?
an S. aculeatissimum L. Mark ?

crassi folium Solanum

Solanum Dulcinum B. Lin

Habitat herb. Fusf.

rami tetragon, villosi. Folia petiolata, six pollicaria, ovata, obtusifolia, utriusque villosa, suprafiabra, a venia, enervi, integro, integerrima, interdum dente uno ad eum ab utrinque latere. Pediculi axillares et terminales, villosi, quatuor flori, terminales bifidi: pediculus singulis trifloro. Calycis laciniis ovatis, obtusis, margine villosis

Tomentosum Solanum

Solanum fruticosum maximum Tomentosum Bouc. plant. rar. 3
Anachanda Rheed. Mal. 2

Habitat in India herb. Mus. 5

Totum tomentosum, fruticosum. aculei copiosi in caule, petiolis, costa ^{liber} foliorum
easque venis majoribus utrinque, pedicellis calycibusque, rectis, compressis
puberulis. Folia petiolata, cordata vel cordato oblonga, inferora palmata
Stultia, sinuata, obtusa, lobis integerrimis undulatis, interdum dente uno
altero obsolete, altero latere basi saepe breviora. Radices laterales ante
florulentiam nutantes, 7 8 flori. Corolla parva, exterior tomentosa: laci-
nis ovato, acuta. Anthera via longitudine corollae

Sarmentifera Solanum

Habitat in America meridionali herb. Surinam 5

Rami teretes, scabri, purpurea scintillantes, superne pallato-velloso, canescentes. Axi-
les sparsi, haud frequentes, in caule, ramis, petiolis et costa subtis, parvi, recurvi, com-
pressi. Folia petiolata, bi-3 tri-polluciana, ovato-oblonga, obtusa, integerrima, in-
terdum altero latere obscure sinuata, simpliciter venosa, supra glabra, subtus
velloso, canescentia. Petioli sordide incarni, uti peduncululi et calyces. Racemi
lateralis, pauciflori. Calyx obsoletus squedentatus. Corolla extus velloso: lacin-
is oblongis.
an obfunim.

aspenum
clatum Solarum

Habitat in Puerto Rico herb. Chesf.

Erubesc 12-15 pedalis, erectus: rami crispitie pennis asperius, superne scabri.
Folia petiolata, pinnatim, palmam lata, elliptica ovata, acuminata
integerrima, basi attenuata, utraque velis stellatis scabris, subtus vel
tota viridi canescentia. Cyma terminalis, dichotoma ramosa, multi-
flora. Calyx, uti corolla villosa tomentosa. Corolla profunde fissa:
laciniis lanceolatis.
affine verbascifolius

confer cum asperum

Solanum

Solanum fruticosum launifolium aculeatum Plam. Spec.

Habitat in America meridionali herb. ^{Jungui} 3

Rami teretes, villosi; villis ferrugineis. Aculei basi lati, compressi, recurvi, femina
quiculares, glabri nitidi. Solia petiolata, 4 pollicaria, oblongo-ovata, basi aequali
supra glabra, nitida, infra, subtus villosa, venosa, integra; aculei in costa, supra
pauciores, subtus plures, recti, subulati. Petioli fere pollicares, aculeo uno altero
basi aculeo. Flores penduli: pedicelli ferruginei. Pedunculus villosus.
Calyces quinquepartiti. Corolla
an varietas Solan. ignei

ciliare Solanum

an Sleane pag 236 tab. 44. fig. 3

Habitat in herb. Guaf. 5

Rami tomentosi, incani. Caulis ramosus, compressus, recurvus, glabri. Folia breviter petiolata, 2-3 pollicaria, oblonga, basi attenuata, apice acuminata, acumina lanicollata, utroque stellato-vellosa, dentata, geminis ad foliolum lateris, remotis serrata, interdum integerrima, supra arena, enervata, subtus tomento seu incana, remote nervosa. Petioli vix ulli. Pedunculi laterales, vix unguiculares: pedicelli 8-9. umbellati, pedunculo parum longiores. Calyx quinquefidus: laciniis subulatis pilosis ciliatis.

Cethale Solanum

Habitat in America

Fruticosa. Caulis herbaceus? teres, glaber flexuosus. Folia petiolata, pithamata, elliptica-lanceolata, venosa, utraque glabra, interdum breviter oppositam. Petiolus sesqui-pollicaris Asiatici oppositifolii. Petalo parvis & cernuis, multiflori. Pedicelli sempolluati. Calyx glaber, subquinquelobus. Corolla 5quepartita: laciniis lanceolatis.

compressum Solanum

Habitat in India orientali herbar. Guss.

Caulis herbaceus? in cano tomentosis; superne compressus, aculeatus, aculei sparsi
siccus, compressi, semivincularis, flavi, subrecurvi, basi tomentosi. Folia petiolata,
spithamea, lanceolata-oblonga, supra pilis stellatis villosa, v. indurata, subtus v. v. ^{in costa}
sa, incana, et pilis stellatis punctata, obtusis ~~dentatis~~ ^{imbricatis} ~~dentatis~~ ^{imbricatis}, utraque aculei
recti flavi basi tomentosi. Racemi laterales bif. tri. pollicares, quibusque flori-
slores remoti, penduli, uti corolla extus incana, aculei nonnulli in pedunculis
et calycis profertim inferos. Calycis laciniis ovatis. Corolla fere dimidia
minor quam in tuberoso, quinquefida. laciniis ovatis. infima herma-
phrodita, reliqua masculis pentandra
affine S. ruderali.

Divaniatum Solanum

Habitat in S. Domingo herb. Desfont 7

inermis. Rami teretes, dichotomi, divanitati, laevés, inferne glabri, superne
flavescenti tomentosi. Folia petiolata, saepe geminata, petiolata, 2-3 pollicaria, al-
tero minore elliptico-lanceolata, utrinque acuta, integerrima, supra obsolete
nervosa, aversa, glabra, subtus incana tomentosa, mollissima. Pedunculi axil-
lares, longitudine petioli, unguicularis, 4-5, uniflori, uti Calyx et corolla edis-
flavo tomentosa. Calyx 10 dentatus: dentibus alternis brevioribus, obtusis

Solanum

Solanum zeylanicum fruticosum amplis et incano foliis Plukh. tab. 226. fig. 6.
Habitat in India orientali herb. Mus.

Caulis her. baccatus? Terres, uti tota planta incano tomentosis, flexuosus. aculei in caule, petiolis et costa flavescentes, frequentes, sparsi, recurvi, seminoqueculares, rarisime in nervis et nervis, recti. Folia petiolata, geminata, palmata et ultra, altero minore, rhombica, per petiolum parum decurrentia, acuta, subtruncato-angulata: angulis utraque 2-3. obtusis. Umbellae laterales sessiles. Pedunculi seminoqueculares, luti, uti calycis aculeis aciculantibus armati.

haud abponem in herb. Surinam vidi an devesum

biflorum Solanum

Habitat in Romanā Commeson herb. Fusf.

Caulis suffruticosus? Ramis inæani, uti folia et tomento tenuissimis, ^{oxyac-} Petioli
folia utraque, pedunculis, calycisq; aculeis frequentibus aureis aciculati-
bus. Folia bi-^{tempo}collia ^{lat-}ania, ovato-oblonga, sinuata, acuta, nervosa, supra
secundum nervos obscure lineata, utraque arena. Petioli pollicis aeri.
Pedunculi laterales biflori, breves: pedicelli unguiculares. Flores tomentosi-
inæani. Calyx dentibus quinque subulatis

Solanum

Solanum scandens spinosum foliis acutis angulosis Plum. herb. Surin.
no 700

Solanum scandens aculeatum hyssiparum folio, flore intus albo extus
purpureo Plum. spec.

Habitat in America herb. Surin. t

Rami teretes, glabri. Aculei parvi, sparsi, rari, in caule, petiolis et costis
foliorum pubes. Folia petiolata, spithamea, ovata, utrinque attenuata
acuta, glaberrima, subvenosa, interdum medio e. dente ovato-acuto
rhombos angulati. Flores non vidi.

confer eum scandente Sw.

Solanum

Solanum scandens fruticosum foliis acutis angulosis Plum u. ined. Tom. 4. 32.

Habitat in America meridionali herb. Surinam apud Guj.

Caulis angulatus, aculei parvi, compressi, prosci. Folio petiolata, pithamoa,
lanceolata-elliptica, utrinque attenuata, acuta, glabra, obscure venosa, utrin-
que dentibus tribus magnis dentato serrata. Petioli et costa subtus enormis

Leptophyllum Solanum

Solanum laciniatum? caule aculeato fruticoso scandenti, foliis geminis laciniatis; altero lanceolato integerrimo, racemis filiformibus longissimis Fl. Peruv. pag 40 tab. 177. fig. a

Habitat in Peruvia nemoribus

glabrum. Caulis frutescens, bis-ternis, scandens, aculeatus. Ramis diffusi angulosi, aculeati. Aculei parvi, recurvi, lutescentes.

Folia gemina, sessilia, dorso aculeata, majora oblonga, laciniata

hastato minus

sefidia

lobi oppositi

tri utrinque

gemini oppositi

lanceolati

oppositum

lanceolati

trium

lobata: laciniis sublanceolatis, acutis, horizontalibus; alterum quadruplo minus, ovato lanceolatum, integerrimum. Petioli brevissimi decurrentes. Pedunculi laterales, solitarii, aculeati, filiformes, simpliciter, folio majori plerumque breviores, aliquando longiores, in fructu dependentes. Flores racemosi & parvi, secundi duplici ordine, alterni. Calyx parvus, quinque crenatus. Corolla profunda quinquefida: calyce triplo major coerulea. Bacca globosa obovata, magnitudine parvi pyri, aurca fl. p. l. c.

an *Sonchifolium* dicend. folium enim majus fere *Sonch.* *Polustri*

astrucos.

~~Stellatum~~ Solanum

Solanum ~~Stellatum~~ caule aculeato fruticoso hispido sericeo, setis apice stellatis, foliis lobatis, corymbis magnis dichotomis Fl. Penur. 2. pag 40 Tab 176. fig. 6.

Habitat in Penuria nederlandis

Hispidissimus. Setis apice stellatis. Caulis origjalis, erectus, caule aculeatus superne ramosissimus. Rami subteretes, aculeati. Aculei recti, obscuri purpurei. Folia petiolata: Superiora nonnulla ovata, integerrima acuta, paucis subrepanda; reliqua cordata, basi inaequalia, 7-11 lobata

lobatos subrepanda, valde hirsuta, supra aspera & setis minutis stellatis, lobis oblongis venosis nervosis, aculeis nonnullis adspersa. Lobi ovati, acuti integerrimi. Pedunculi rami & terminalis, inermes. Corymbi magni dichotomi. Flores duplici serie, secundis plurimi caducis. Calyx ^{conspicuosus} caducus: lacinis acutis. Corolla alba, extus lanata, profunda quinque fida, calycis triplo longior. Anthera volucris: Bacca globosa, pubescenti Fl. Per.

Sub nomine stell. specios in la Mark. exstat diversa

incaneratum Solanum

Solanum incaneratum caule aculeato suffruticoso, foliis geminis cordatis aculeatis, floribus secundis bacis glabris cancellatis &c.

Per. p. 40 Tab. 176. fig. a

Habitat in Peruvia nemoribus

Dense hirsutum. Caulis suffruticosus, bulbosus, erectus, aculeatus. Rami subangulati, aculeati. Aculei nigri, recti, inaequales. Folia gemina, petiolata, cordata, ^{acuta} 5-11 angulata; altero altiori, fere triplo breviori. Pedunculi rami, breves, racemosi, incurvati, inermes. Flores racemosi, secundi, duplici serie. Calyx inermis floriferus reflexus; fructiferus erectus, squae partibus; longitudine bacis, eaque includens. Lacina subulata. Corolla albo violacea. Bacis, oblonga, albo, venosa, glaberrima, Cerasi magnitudine fl. Peruvia

calycis fovea subulata

lobi subrotati acuti

in a nam Solanum

Solanum in a nam caule arborico aculeato, foliis junceis 7-9 lobatis, adu-
tis sinuatis, racemis bi-3nis subcymosis, floribus secundis Fl. Penur. p. 40
2. Tab. 175. fig. 6.

Habitat in Penuria praeceptis ad torrentium margines &

Arbor quadrangula. Caulis crassus, aculeatus. Rami superae, senio-
res teretes, inermes: juniores angulati, aculeati, glauci. Aculei dis-
persi, horizontales, erecti, curvique. Folia inermia, solitaria, gemma-
que, nonnulla oblongo-lanceolata, integerrima, sinuato-lobataque,
basi inaequalia, supra glabra, nitida, pubes tomentosa, alba. Racemi
suboppositi folii, gemini, terni, quaterni, bifidi, tomentosi. Flores sub-
cymosi, secundis. 14-20, plures caducii. Calyx parvus, quinquecrena-
tus. Corolla alba, calyce quadruplo major, patens. Bacca globosa
parva, lutea, tandem nigra. Fl. l. l. c.

Folia ovato-oblonga basi subcordata sinuato repando vel lobata ut in
Lusitania

Saponaceum
Scabum Solanum

Solanum scabrum caule aculeato fruticoso, foliis sinuato angulatis acutis
scabris, corymbis dichotomis, floribus intus secundo Fl. Peruv. 2. pag. 39. tab
175. fig. a
Habitat in Peruvia versum et meridie 5

Caule erecto, terribili, ramoso, leviter angulatus, aculeatus, lavis. Aculei
pauci, remoti, minimi, rigidi, fulrescentes, per caulem, ramos, petiolos et folio-
rum dorsum dispersi. Folia solitaria, interdum gemina, petiolata, ovato-oblo-
nga, sinuato-angulata, basi inaequalia, subtus valde venosa, utraque basi mini-
mum in stellatis, scabra, anguli acuti. Petioli tripliciter axi, supra sulcati. Peduncul-
li rami, cum foliis alternantes. Corymbi magni dichotomi. Flores pedicellati
secundi: pedicelli erecti, superne incompressi, angulosi. Calyx profunde squa-
fidus, acutus. Corolla coeruleo-violetea, calyce triplo major: laciniis acuta
Bacca globosa, auranti coloris, cucurbi magnitudine Fl. Peruv. l. c

folia basi sub cordata sicut quae in rugis
scabrum jam habetur a hanc expressum docendum

lobi ovati acuti
int. gestimi

Diffusum Solanum

Solanum diffusum; caule suffruticoso, ramis vagatis diffusis, foliis impari pennatis
folioli oblongi, pedunculis axillaribus 2-5 floris &c. Penur. 2. pag. 37. tab. 171. fig. 6.

Habitat in Penura nemoribus.

Habitus Gasmuni. ^{gasmuni} Caulis suffruticosus, angulatus. Rami diffusi, congesti
pubescentes. Folia impari pennata. foliola oblonga, integerrima, acuta
menata, extrema majora. Petioli pubescentes. Pedunculi axillares, bini vel
terni, bi-sque flori, inaequales pubescentes, foliis breviores. Flores pedicel
latis. Calyx parvus 5que crenatus. Corolla calyce 4plo longior, violacea,
patens, 5quefidu &c. Per. l. c.

flores pubercenti folia 4-juga. foliola petiolata

pubescens Solanum

Solanum pubescens caule fruticoso, foliis ovatis acutis, ramis lateralibus
floribus secundis &c. Pers. 2. pag. 36 tab. 169. fig. 6.

Habitat in Peninsula montibus

pubescentes

^{inermis} Pubescens. Caulis teretis, erectus: ramuli tenerrimi foliosi. Folia sparsa
petiolata, ovata, acuta, utrinque pubescentia, integerrima. Peduncululi
rami, solitarii, ~~marginati~~, foliis duplo brevioribus, pauciflori, pubescentes
Flores duplici serie, secundis, alterni. Lacinia calycis fructiferi 5
Ho. Corolla albolutescens. Bacca globosa, nitidissima, glaberrima
curvantia coloris, magnitudine Cerasi. &c. Pers. l. c.

folia ovata oblonga attenuata

Nomen triviale mutandum cum aliud jam adest sub hoc nomine

anceps Solanum

Solanum anceps; caule herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axil-
laribus 2-3nis brevibus, fructibus conis, ancepsitibus. Fl. Penus. 2. p 36

Tabl 69. fig. a

Habitat in Peninsula nemoribus

Inermis. Caulis teres, parum ramosus, tripedalis. Folia petiolata, oblongo-lanceolata
acuta, integerrima, utrinque glabra. Pedunculis ^{axillaribus} axillaris, binis, ternisque
brevibus inaequalibus, racemosis, paucifloris. Flores breviter pedicellati duplici
serie, racemosi, alterni. Calycis laciniis saepe rotunda. Corolla parva
calyce duplo major, virescens. Baccis conis, anceps, versus apicem multo
triangularibus, albis. Fl. Per. l. c.

grandiflorum Solanum

Solanum grandiflorum; caule arboreo, foliis ovatis binuatis integerrimis
que, racemis ramosis recurvis, floribus secundis magnis fl. Peruv. 2. pag
35 - tab 168 fig. 6.

Habitat in Peruvia montibus umis et calidis

Genere Truncis. Peruvialis, frondosus, crassus. Rami varicosi, terrenis aban-
gulati, angulosi. Folia petiolata, ovata, binuata-angulata integerrima, repanda
subtus lanuginosa, venosis prima, supra hispida, basi inaequalia. Petioli le-
viter sulcati. Peduncululi ramosi, solitarii, multi flori, breves, racemosi. Flo-
res duplici serie, alterni, secundi. Calyx 5que partitus, lanuginoso-hispidus,
crescens. Corolla magna violacea, zoni 5que costis lanuginosis, inter-
dentibus. Anthera et Stylus violacei. Bacca magna, lutescens, la-
nuginosa, dependens &c. Per. l. c.

Quell sub, que lobis lobi acuminati

oppositifolium Solanum

Solanum oppositifolium caule fruticoso, foliis oblongis acuminatis, re-
dunculis opposit-folii bi-quadri-flori &c. Per. 2. p. 35 Tab 16 P. fig

Habitat in Peruvia nemoribus.

Inermis, glabrum. Caulis teretis, erectus, teres. Rami nitidi. Folia breviter
petiolata, oblonga, acuminata, lenter undulato-repanda, utra-
que glabra, supra nitida, viridia, nervis venosa. Petioli brevissi-
mi, sulcati. Pedunculi opposit-folii teretes, bi-quadri-flori.
Calyx sive dentatus. fructus semis magnus fere unicoloratus. Corolla
alba sive fida: Lacinae uncinatae &c. P. l. c.

folia ovato-oblonga, alternata, pedicelli alterni

glandulosum Solanum

Solanum glandulosum caule suffruticoso scandente, foliis geminis ovatis cordatis, pedunculis 3-5nis interfoliaceis, denticuli calycini glanduliformibus Fl. Peruv. 2. pag 35. Tab 167. fig. 6.

Et habitat in Peruvia nemoribus

Fructus glabrum. Caulis suffruticosus, scandens, teres. Folia gemina, breviter petiolata, subsessilibus, ovato-cordata, basi inaequalia, acuta, integerrima, repanda, venosissima. Pedunculi interfoliacei, 3-4-5ni, uniflori, pollicares inaequales, verticillati superne incrassati. Calyx tuberculatus, angulato-striatus, carnosus: laciniis decem, rarius 12-14 glanduliformibus, alternis majoribus; striis in fructu oblitterantibus. Corolla alba patentissima, limbo involuto, plicato, obsolete 5-lobato. Bacca globosa, dilute carminea Fl. Per. l. c.

folia cordata-ovata

Gessile Solanum

Solanum gessile caule inermi fruticoso, foliis oblongo spatulatis sessilibus, pedunculis terminalibus recurvo pendulis, floribus capitato umbellatis fl. Pers. 2. p. 35 tab. 167. fig. a

Habitat in Peruvia meridionali

globum. Caulis, durus, erectus, simplicissimus, teretes, superne angulosi. Telen sparsa, conferta, erecta, sessilia, oblongo spatulata, acuminata, integerrima pedalia et ultra, ad basem crispata, valde venosa. Pedunculus terminalis, solitarius, unicus a singulis caulis, spithamou; recurvus, flores in capitulum, dicto trino-trifidum, numerosi, brevis pedicellati, parvi. Pedicelli erecti, in fructu curvati, inaequales. Calycis squesidi: lacinae breves, obtusae. Corolla alba, calycis triplo major, profunde quinquefida: lacinae acutae. Anthera atropurpureae. Nasci magnitudine Perasi, alba fl. P. L. L.

Folia lanceato lanceolata, aluta, cyma terminalis pedunculata minime capitulata sec: figura

Dicotyles Solanum

Solanum dicotylum caeruleo-hermi fructuoso, foliis oblongis acuminatis in
canis, corymbis terminalibus dichotomis multifloris fl. Peruv. 2. p. 34.
Tab. 166. fig. 6.

Habitat Peruvia ad margines torrentium &

incanum tomentosum. Caulis triorgali, erectus, crassiusculus. Rami
superne patentiusculi, teretes, saepe granulosi. Tenes erecti, tomen-
toso-pubescenti, canes. Folia sparsa, patentia, in summitatibus ra-
monim, oblonga acuminata, integerrima, latiuscula, tripalmana
subtus dense tomentosa. Corymbi terminaliter, magni, dichotomi
multiflori, incani. Flores pedicellati, parvi. Calycis quinquefidi
lacinis acuta. Corolla profunde squifida, acuta, patens, calycis
duplo major, violaceo. Baccas lutea, magnitudine nucis Arca-
lano Pl. P. L. C.

Folia oblongo-ovata
inflorescentia longe alia ac habet descripta
Racemi enim latissimos compositos sed pedicelli multiflori floribus
pedicellatis

nitans Solanum

Solanum nitans, caule inerme fruticoso, foliis oblongo-ovatis acumi-
natis, racemis brevibus & unis oppositifoliis, floribus & secundis nutanti-
bus. Fl. Peruv. 2. pag. 34. Tab. 166 fig. a

Habitat in Peruvia suderatis

Caulis bryozalis, erectus, ramosissimus. Rami teretes, granulati, lanugino-
si, ferruginei; Tenes subangulosi. Folia petiolata, oblongo-ovata, acumina-
ta, integerrima, venosisima, subtus lanuginosa, ferruginea, supra glabri-
uscula. Racemi oppositifolii recurvi, brevissimi, fere 16 flori. Flori-
duplici serie, secundis, subspercati, breviter pedicellati; plures deci-
dui. Pedicelli curvati, lanuginosi. Calycis lanuginosi, squae fidi: lacini-
na ovata. Corolla alba, brevis, calycis duplo major. Baccia globosa
lutea Fl. Per. l. c.

folia attenuata

obliquum Solanum

Solanum obliquum caule inermi & affinis, foliis cordatis obliquis acutis
pedunculi lateralibus recurvis, floribus & secundis Fl. Peruv. 2. p. 35. tab
165. fig. a.

Habitat in Peruvia nemoribus

glabrum. Caulis, erectus, teres, variegatus, ramosus. Folia petiolata,
cordata, acuta, obliqua, supra nitida, leviter pubescentia. Pedunculi
laterales, & ~~quidam~~ ^{recurrens} ~~caulati~~. Flores duplici serie, & secundi: superiores
brevis pedicellati; inferiores pedicelli longissimi, incurvi. Calyx
quinquefidus: lacinis subrotunda. Corolla purpureo violacea, profun-
de quinquefida: lacinis lanceolata, calyce quadruplo major.
Anthera rotata. Bacca oblonga utroque acuti stula Fl. Peruv. c.

Folia altero latere venon

oblongum Solanum

Solanum oblongum caule inermi suffruticoso, foliis geminis oblongis
acuminatis; altero maximo, racemis lateralibus brevissimis, floribus
secundis *Fl. Per. 2. pag 34. Tab 165 fig. a*

Habitat in Peru in nemoribus

glaberrime. Caulis suffruticosus; bulbosus, teres, lavis, ramosus. Folia
geminis, inaequalia, petiolata, oblonga ovataque, acuminata, integerrima;
nervis extus bisulcis, majora triangularia; parva quae duplo minor
Racemi laterales, longitudine petiolorum. Flores duplici ordine, alternis,
secundis, parvi. Calyx quinque dentatus; obtusus. Corolla profunde
5quefida, patens, albo-violacea, calyce duplo major. Bacca lutea
3cens, magis nitiditate ciceri *Fl. Per. 6. c.*

folia oblonga. pedicelli approximati

Cuneolatum Solanum

Solanum Cuneolatum caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis,
foliis lanceolatis acutis, racemis terminalibus, corollis magnis fl.

Peruv. 164 ^{17, 33} fig. a

Habitat in Peruvia nemoribus.

Pulverulentis. Caulis erectus, teres, furcus, glaber. Rami patentes, angulati,
tenuis, foliosi. Folia sparsa, breviter petiolata, lanceolata, acuta, integri-
ma, supra nitida, parum undulata, sesquipalmata. Racemi terminaliter,
subcymosis, multiflori. Calycis corolla sextuplo brevior. Corolla magna,
patentissima, 5que lobata, acuminata, violacea. Bacca nigra, magnitudine
Pecari fl. Per. l. c.

folia subovato-lanceolata Racemus terminalis pedicelli biflori
Corolla 5-fida-lacinis ovatis

incurvum Solanum

Solanum incurvum; caule herbaceo, foliis ovatis acuminatis, racemis
geminis, altero breviori, pedicellis incurvis secundis &c. Peruv. 2.
pag. 34. tab. 16. 4. fig. 6.

Habitat in Peruvia nemoribus

Frax. Caulis herbaceus, bipedalis, erectus, glaber, articulationibus incrassatus
angulatus, ramosus. Folia longe petiolata, ovata, acuminata, utrin-
que pubescentia, indegerrima, venosa, & esquipalmata. Solum
parvum ex singulo axilla. Petioli hirsuti folio duplo breviores
Racemi axillares, gemini, bifidi, altero breviori. Flores duplici
pericly, altero, & secundi. Pedicelli incurvi, longi, uniflori viola-
cei, hirsuti. Calyx campanulatus, leviter quinque dentatus, pubescens
brevis. Corolla albo-violacea, calyce triplo longior. que fido

folia lanceolata-oblonga attenuata

nudum Solanum

Solanum nudum caule nermi furtioso, ramis glabris nitidis, foliis
ovato-lanceolatis acutis, racemis terminalibus subcymosis Fl. Per.
2 pag. 33. tab 163. fig. a.

Habitat in Pensia nemoribus
glabrum, *nudum*. Caulis bulbosus, erectus, teres. Rami teretes, flexuosi
nitidi. Folia petiolata, ovato-lanceolata, acuta, integerrima, leviter repen-
da, venosa; venis horizontalibus. Petiolis basi inaequalibus. Racemi terminalis, sub-
cymosis, pubescenti. Calyx squesfidus: lacinis ovatis, acutis. Corolla caly-
ce quadruplo major, squeloba, albo-violacea, extus pubescenti. Baccis
nigris, magnitudine Piceni. Fl. Per. l. c.

Cyma terminali ramo de latomo

^{Solanum}
~~angustifolium~~ Solanum

Solanum angustifolium caule inermi fruticoso, ramis pulveru-
lentis, foliis lanceolato-linearibus longis, racemi ramosi subro-
syntesis. Fl. Per. 2. pag 33. tab 163 f. 6.

Habitat in Peninsula nemoribus

Caule inulnans, teris, ramosissimus: rami junioro virgati, pulverulenti, folio-
si. Folia petiolata, fere bipalmata, lanceolato-linearia, acuta, integri-
sima, undulato-repanda, valde venosa, rugosiuscula, subtus magis pulve-
rolenta. Pedunculi rami, racemosi-corymbosi, pulverulenti, multiflo-
ri. Calyx semiquinquefidus, pulverulentus. Corolla albo-vioacea, calyce
duplo major, profunde squarrosa, extus pulverulenta. Bacca subovata
nigra, magnitudine Cerei H. P. l. c.

folia lanceolata

acutifolium Solanum

Solanum acutifolium caule inermi suffruticoso flexuoso, foliis
geminis ternisque lanceolatis integerrimis, pedunculis unifloris
interfoliaceis Fl. P. 2 pag 33. Tab 162. fig. 6.

Habitat Peruvia in nemoribus calidis

Hereditum. Caulis suffruticosus, erectus, teres. Rami flexuosi, hispidesculi, su-
perne dichotomi. Folia plerumque gemina, altero minime, rarius subverticil-
lato. Ternas, inaequalia, breviter petiolata, lanceolata, acuta, angusta, inter-
gemina, utraque hispida, deflexa. Pedunculi interfoliacei, termina-
les, solitarii, uniflori, hispidi, capillares, superne incrassati. Calyx hespi-
dius decem denticulatus, denticulis pubulatis. Corolla alba, profunde 5-loba,
lobis lanceolatis remotis. Bacca subrotunda, aurantii coloris, magnitu-
dine Cucurbitae fl. P. 1. 1

calyx subdecemfidus. Corolla 5quefida

biformifolium Solanum

Solanum biformifolium; caule inermi & suffruticoso flexuoso, foliis geminis oblongo-lanceolatis; altero minime orbiculato, pedunculis unifloris interspaliatis. Cl. Per. 2. pag. 32. Tab. 161. fig. a.

Habitat in Canaria nemoribus

Caule suffruticosus, teres, erectus, fuscus. Rami flexuosi angulosi, hispidi. Folia gemina, parum obliqua, integerrima, subtus per venas nervosque, supra per nervos tantum hispida: alterum

minus cordato-subrotundum, quadruplo majus, breviter petiolatum, lanceolatum, acumine integerrimum. Pedunculi interspaliati, & opus bini, aliquando triflori, filiformes, uniflori, hispidi, basi attenuati, erecto incisione. Calyx decempartitus, hispidus: lacinis subulata. Corolla per basi angustata, semiquinquefida, patens. Bacca calyce inclusa sum ad insertionem magnitudinis pisi, luteo rubra fl. p. l. c.

sub
minus cordato
subrotundum
quadruplo majus
integerrimum
pedunculi interspaliati
bini
aliquando
triflori
filiformes
uniflori
hispidi
basi attenuati
erecto incisione
calyx decempartitus
hispidus
lacinis subulata
corolla per
basi angustata
semiquinquefida
patens
bacca calyce inclusa
sum ad insertionem
magnitudinis pisi
luteo rubra
fl. p. l. c.

oblongum
basi angustata
sum ad insertionem
retuli obtusum
corolla 5 quefida

Seneceum Solanum.

Solanum seneceum caule inermi fruticoso, ramis gracilibus, foliis
ovatis senecei integerrimis, pedunculis lateralibus 2-6 floris &c.
Per. 2 pag 33. Tab. 161. fig. 6

Habitat in Peruvia nemoribus inermis, calidis &

Caulis multinervi, erectus, teres, fuscus, glaber. Rami longissimi, diffu-
si, fileiformes, ^{sub}teretes, graciles, teres, tomentosi, foliosi. Folia soli-
taria, longe petiolata, ovata lanceolata, acutiuscula, angustata, par-
va, integerrima, utrinque senecei incana. Pedunculi laterales, 2-6
floris, tenues dense pubescentes. Calyces, quinque fidi, obtusiusculi,
tomentosi. Corolla intus violaceo-^{caerulea} ~~senecei~~ extus senecei, squelobus
calyce triplo major. Nactica rubra, magnitudine Pisi &c. P. L. c

vel ovato oblonga superiora laciniat
folia petiolo oblongo decussata pollicaria flores racemosi Corolla
duplexida

montanum Solanum caule inermi herbaceo, foliis subcordatis repandis Lin. S. V. pag
224.

Solanum tuberosum minus, abnippleis folio, vulgo Papa montana Deuss. Peruv.
3. t. 46 p. 8. 46.

Habitat in Peru y lino collibus arenosis saxosis y
Radix tuberosa. Caulis terpollicaris

Solanum montanum caule inermi herbaceo, radice tuberosa, globosa
foliis ovatis integris laciniatisque, pedunculis 3-7. flori DC. Peruv.
2. pag 32.

Stipidiusculam. Caulis pedalis, erectus, striato-angulosus. Rami al
terni, superne dichotomi. Folia ovata, integra, lobata laciniataque
inferiora longa petiolata; superiora sessilia, saepe petiolata nonnulla
recurvata. Pedunculi oppositi folii terminalis que, longi; 3-7 flori
infra medium folii unico, saepius integro, sessili. Flores alterni, pedi
cellati, erecti. Calyx 5que partitus: laciniis linearibus; obtusis. Corolla coe
rulea, calyce triplo major. Bacca flavo-cantia, magnitudine pus
DC. Peruv. t. c.

acuminatum Solanum -

Solanum acuminatum; caule inermi fruticoso, foliis geminis ovatis
oblongisque acumine stricto, racemis lateralibus, floribus secundis
Fl. Per. 2. p. 34. tab. 159. fig. a

Habitat in Peruvia nemoribus &

glabrum. Caulis erectus; ramosus; teres. Folia petiolata, integerrima
cum acumine stricto subsphaecelato, supra nitidiora, alternatim
gemina; altero duplo minori, ovato; majori oblongo. Racemi latera-
les, solitarii, fere bipollicares, folio triplo longiores, multiflori. Cores-
duplici serie, alternantes, secundis. Pedicelli tenues, superne in-
crassati. Calyx squesfidus, obtusus; corolla triplo brevior. Corolla
parva, profunde 5que lobata, alba: lobis atubis. Baccæ globosa
cucurbitis magnitudine, nigricans Fl. Per. l. c.

folia oblonga

filiiforme Solanum

Solanum filiiforme caule inermi fruticoso, foliis ovatis cordatisque obtusis,
pedunculis lateralibus filiiformibus bifidis & umbellatis. S. C. Panur. 2.

pag. 31. Tab. 159. fig. 6.

Habitat in Panuriae collibus.

Pubescens, habitus Salicis. Caulis erectus, ramo corymboso, granuloso.
Rami granulosi, juniores hirsuti. Folio petiolato, ovato cordatisque, obtu-
sa, integerrima, utrinque dense pubescentia, venosa. Petioli longi-
tudo hirsuti. Pedunculi laterales filiiformes, bifidi. Flores subumbellati
cernui. Calyx quinquefidus pubescens. Corolla alba, coemlea, calycis tri-
plo major.

pedunculi folio longioris pedicelli 4 umbellati duo intermedia uniflori
laterales florum multi florum florum micromosi

Decurrens Solanum

Habitat in Lima Herb. Mus. O

Caulis bipedalis, dichotomus; articulo armato squamis albis lanceolatis raris adpressis
alatus: ala versus jugulum folium decrescentes. Folia bipollicaria, spatulata
lamina ovata, bipollicaria, dentato subangulata, squamulis raris et caulibus
simillemis adpressa. Pedunculis et apice ramorum, canescentibus et squamulis
tri vel 4 flori. Flores subumbellati. Calycis laciniis ovata. Corolla villosa.

sed a nunciato forte non diversum;

nuncinatum Solanum

Solanum nuncinatum; caule herbaeae anguloso, foliis laciniato pennatifido, corymbis terminalibus dichotomis & l. Penn. 2. pag. 36.

Habitat in Peruvia, Chili, locis ruderalibus et versuris.

^{ignidus oculum}
Inermis. Caulis sive cosus, fragilis, tripedalis, procumbens, angulatus: angulis et petiolorum basi utroque decurrentibus. Rami similes. Folia subnatis, laciniato-pennatifida laciniis sursum et deorsum curvatis; supra nitidiuscula, utroque scabriuscula, alterna, patentia, per petiolum deorsum vertia. Corymbi terminales, dichotomi. Corolla violacea calyce triplo major revoluta. Baccis globosa, parva, lactea & l. Penn. 1. c.

Calygnaphalum Solanum

Solanum calygnaphalum Caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis
repandis, umbellis oppositi foliis tomentosis, bacis nutantibus. —
Fl. Penes. 2. pag. 31.

Habitat in Penaria umbrosis et locis calidis
Caulis terroregalis, teris, erectis, ramosus. Folia petiolata, lanceolata,
acuta, integerrima, repanda, glabra, nitida. Pedunculi oppo
siti foliis, tomentosi. Flores umbellati. Calycis tomentosi. Corolla
violacea, calyce triplo major. Bacca nutantes, atro rubra, mag
nitudine nucis Avellanae Fl. Per. l. c.

Ternatum Solanum

Solanum Ternatum caule suffruticoso tetragono & scandente radicante, foliis
ternatis, pedunculis axillaribus. Pl. Penw. 2. pag 30. tab 172. fig. a.

Habitat in Penwira nemoribus humidis
glabris. ^{um} ~~gen~~ ~~er~~ ~~ma~~ ~~g~~ ~~is~~ ~~us~~ ~~;~~ ~~&~~ ~~scandens~~, radicans, obtuse tetragonus. Rami simplici-
folia longe petiolata, ternata: foliola oblongo-lanceolata, integerrima; laterali-
bus obliquis intermedio majori, acuminato. Pedunculi plures axillares, pau-
ciflori. Flores subumbellati, pedicellis aequalibus. Calyx parvus quinque-
crenatus. Corolla purpureo violacea, calyce quadruplo major, profunda
quinquefida. Bacca ovato-conica, albicans, magnitudine cicani. Pl.
Penw. l. c.

foliola longeolata petiolata

conicum Solanum?

Solanum conicum caule herbaceo, foliis impari-pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus subternis spicatis, fructu conico & C. Penns. 2. pag. 3. D. Tab. 172. fig. a.

Habitat in Penns. nemoribus O

Caulis ^{fruticose} bipedalis erectus, inferne divaricus; superne pilosus; angulatus.

Folia: petiolata, impari pinnata: foliola breviter petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, cinnata, supra pilosa, nonnulla basi inaequalia externa sensim majora. Pedunculi axillares, solitarii, terni, oppositi, erecti longitudine fere petiolorum, filiformes; apice recurvati; glabri. Flores ^{pedicellati} ^{var. comite} spicati, duplici serie alterni, parvi. Pedicelli superne incoarctati.

Calyx squae partibus; acutus. Corolla albo coerulea, calyce duplo major.

Bacca conica, alba, magnitudine Amygdolae fl. Pers. L. c.

folia 5-queque foliola ovato lanceolata petiolata

mita Solanum

Solanum mita caule herbaceo radicante, foliis impari-pinnatis: foliolo oblongo
racemis axillaribus aggregatis, bacis globosis Fl. Per. 2. pag. 30. Tab. 173.
fig. a

Habitat in Penins nemoribus ⁱⁿ locis umbratis humidis O
Inermis glabrum. Caulis bipedalis, erectus, simplex, rarius inferne divinus, radicans
nitidus flexuosus, obtuse angulatus. Folia petiolata, impari-pinnata: fo-
liola breviter petiolata, oblonga, acuta, integerrima, supra nitida, basi obli-
qua inaequalia. Peduncululi plures, axillares, petioli triplo breviores, gra-
vis, pauciflori. Flores neutrius, minimi, secundi, duplici serie alterni.
Calycis lacinis subrotundo. Corolla alba. Bacis globosis, albo, magnitudi-
ne pisi Fl. Per. l. c.

folia 4 paja foliola ovato lanceolata acuminata
flores racemosi racemi brevissimi foliola petiolata

Mila Solenne Carlo Alberto

vinidiflorum Solanum

Solanum vinidiflorum caule fruticoso, foliis cordato-ovatis simplicibus, venis
dependentibus fl. Peru. 2. pag. 30. tab. 173 fig. 6

Habitat in Peruvia nemoribus. 5

Fraxinea, villorum. Caulis crassus, ardens, teres, ramosus. Folia perichlora, cordato-ova-
ta, acuta, subrepanda, integerrima. Petali breves. Peduncul. axillares, ramosi,
longitudine fere foliorum dependentes. Disci. saepe multi. Calycis lacinis acuta.
Corolla viridi, profunde squesfida: lacinis ovato-lanceolata reflexa. Bacca
oblongo-obovata, villosa, lutescens. fl. Per. l. c.

asperolanatum Solanum

Solanum asperolanatum caule aculeato-arboresco, foliis oblongis solitariis geminisque angulatis integerrimisque, corymbis ramosis subdichotomis fl. Peruv.
2. ³⁹¹⁸⁸rej. 174. fig. 6.

Habitat in Peruvia prope ~~5~~ ~~causa~~ ~~causa~~ ~~causa~~ ~~stellata~~
~~asperolanatum~~ ~~causa~~ ~~causa~~ ~~causa~~ ~~stellata~~
Caulis fruticosus, quinque ~~orgyalis~~; erectus, ~~simplex~~, superne ramosus ~~sub~~ ~~erectus~~ ~~aculeatus~~. Rami annotati inferiores glabri, aculeati; superiores ~~inermes~~ lanuginosi, ferruginei. Folia petiolata, lucida: ramulorum inferiorum juniorum solitaria, oblongo-lanceolata: superiora gemmas vel solitaria, oblonga, acuminata, basi inaequalia, integerrima, subtus lanuginosa, supra hispida. Panniculi ramosi, subdichotomi, longissimi, multiflori. Flores pedicellati, duplici serie, alterni. Calycis lacinae ovatae, acutae, lanuginosae. Corolla alba, ciliata, calyce duplo major. Bacca lutea magnitudine nuci arellana fl. Per. l. c.

ho. h. fide
Folia oblonga acuta pedum peduncul. subdichotomi
nucicelli racemos

pendulum Solanum

Solanum pendulum, ^{caule fruticoso} foliis pinnatis, folioli 2-bris oblique cordatis, racemis dependen-
tibus furcatis Fl. Penins. 2. pag. 39 Tab 174. fig. a

Habitat in Penins nemori bus et umbrosis
Inermis Caulis terribilis, erectus medullosus. Rami superne, dichotomi, hirsuti. Folia
remota, rarius gemina, pinnata, interdum simplicia: foliola 2-3na, oblique cor-
data ovataque, acutissima, impari majori, utraque pubescentia, integerrima, ve-
nosissima. Pedunculi ex dichotomia, solitarii, semipedales, furcati, dependen-
tes, laevae Flores laxa racemosi, alterni. Calyx quatuor crenatus; creni breviter
acuturati. Corolla obscura purpurea, leniter pubescens, profunda 5quefida
Laciniae lanceolatae, acutae, apice reflexae, calyce quadruplo majore. Thalamus
magna, ovata, pyri mediocri magnitudine, ^{caduce} lutea. Flores quatuor ad maturi-
tatem plerumque perveniunt. reliqui decidui. fl. P. L. C.

Folia simplicia ternata vel pinnata 4-5-7-8 foliola corda-
to ovata simplicia basi superiore breviora, inferiore parva
decurrentia Pedunculi ⁱⁿ fide pedicelli crenati & remoti