

Solanum

melongena. I caule inermi herbae erecto, foliis lyratis ovatis tomentosis, pedun-
culis pendulis incrassatis, calycibus inermibus Linn. S. V

Solanum pomiferum, fructu oblongo Bauh. pin. 167. Monf. hist. 3-p. 524

Mala infana Dod. pempt. 450.

S. 13. tab. 2. fig. 1.

~~Fraxinum hirtum Rumph. ant. 5. p. 230. f. 25.~~

Habitat in Asia, Africa, America O

Caulis subnuber. Folia longe petiolata sinuata nigrescentia. Corolla
albida aut purpurea fructus albi vel purpurei

in farum Solanum caule aculeato herbaceo, foliis ovatis tomentosis, pedunculis pen-
dulis incrassatis, calycibus aculeatis Lin. Mant 46. 7

+ Solanum pomiferum magno fructu ex albo & atro purpureo nitente, foliis et calyce spinosis
Pluk. phytogr. t. 226. fig. 3. Monf. h. 3. p. 524. f. 13. tab. 2. fig. 2.

Troxum hordense Rumph. Amb. 5. p. 230. f. 8. PS.

Habitat in India O

valde affinis Melongena Lin. nola - baridena Rheed. M. 10. p. 147. Tab. 67

+ Solanum spinosum fructu rotundo Bauh. Pin. 167.

Simillimum melongena; caule ut ramis, tomento stellato foliis subsinuatis;
Pedunculis solitariis unifloris pendulis incrassatis; Pomis magnis. Differt
caule aculeis parvis; foliis aculeis utrinque raris rectis; calyce multum
aculeato Lin. Mant. l. c.

caulis uti tota planta tomentosa, aculei parvi interdum tantum in
calyce folia ^{ad tomentum breviora} sinuato angulata obtusa latius latis obtusissi-
mi

Solanum pomiferum fructu nigro spinoso Bauh. pin.
Monf. h. 3. p. 524 f. 13. tab. 2. fig. 4. 2.

baccis glabri

aculeatus humilis
erectus quum Sol. foliis oblongis dentato-angulatis villosis pedunculis lateralibus
libris calycis multifloris calycibus inermibus, fructibus hirsutis
Vossii

Habitat in India orientali. Dr. Prothler
ramosus

Caulis teres crassitie pennis cygneo, uti rami, petioli
foliis utraque pedunculis univesalis aculeis copiosis
flavis compressis glabris. ^{inaxillibus} Solia petiolata spitha
mosa oblonga altero latere basi inaequalia
dentibus 6-7 longitate magnis ovatis acutis angulatis
utroque villosa prope basin subtus juniora fovea
flava to flavescenti tomentosa. pedunculi laterales
breviflori ut unguiculares multiflori Calycis hirsutissimi
laciniis ovatis acutis. Baies magnitudine Cerasi globosae
hirsutae densiflorae testae.

serotum Lin

~~Serox~~ Solanum caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentosis aculeatis;
baccis hirtis calyce obtectis Lin. Sp. pl. pag. 267. * S. V. pag. 225

Habitat in Malabar

Statura S. melongena. Folia cordata, angulata, ampla, petiolata, venis aculeis erectis adpressis, supra villosa, subtus tomentosa. Aculeati sunt petioli, pedunculi, calycis. Calycis campanulati, tomentosi, valde aculeati, obtegentes totas baccas. Baccas admodum hirtas Lin. Sp. l. c.

ana fetunda Hort. Malab. 2. pag. 65. Tab. 35

pedunculi laterales plures uniflori. Folia magna angulata ovato lanceolata acuta 6-7. tomentosa utraque mollia utraque juncta corolla extus pilosa Rheede

Campechiense caule aculeato hirsuto, foliis cordato oblongis quinquelobis:
sinubus obtusis elevatis Lin. Mant. 340 & S.V.

Solanum campechiense, calycibus echinatis Dill. Elth. 361. T. 260. Fig. 347.

β. Solanum americanum, caule et pedunculo nigro, foliis acanthi spinosi Boerh.
Leydb. 2. p. 60.

Solanum fuscatum caule aculeato hirsuto, foliis ovatis obtuse lobatis: aculei
utrinque raris: superioribus coloratis Boerh. Leydb. 2. p. 60 Lin. Spei p.

pag. 2604

Habitat in America meridionali O. A

longitudine aculeorum patentibus

Caulis erectus 3 pedalis hirsutus proferitur petiolis teres ramosis adpressis aculeis
copiosissimis. aculei subulati secti flavi, glabri petiorum et foliorum

copiosissimi. aculei subulati secti flavi, glabri petiorum et foliorum
petiolis longis distinctis pellucidis adpressis. ^{botis in quibusdam 5-7 lobis} ^{lati foliatis} ^{2 vel 3} lanceolatis acuti dentatis

petiolis longis distinctis pellucidis adpressis. ^{proferunt juniorum} ^{lati foliatis} ^{2 vel 3} lanceolatis acuti dentatis
dine foliorum lateris superioris purpurei 4-5 flori glanduloso pilosis. Calyx uti corolla pilis rarisissimis.

adpressi punctis eminentibus. ^{sed aculei interdum gemini alter, flori alter subquadri flori} ^{Corolla albo}
vel coenulescenti

variat lobis foliorum integris ovatis vel dentatis uno altero

Solanum fuscatum

angulatis

lobis quinquelobis subpennatis
lobis ovatis subintegris

alter herbari et aculeatum toign defendendum
~~con~~ campechense

ciliatum Solanum caule aculeato herbaceo foliis cordatis sinuato-an-
gulatis aculeatis, ciliatis, pedunculis brevibus paucifloris
La Mart. P. L. 2. p. 21.
Habitat

Sim. rubrae & macr. capwooder All. fide herb. Thourin.

mammosum Solanum caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulato-lobatis: vitum
que villosis aculeatis Lin. S.V. pag. 225

Solanum barbadosense spinosum annuum, fructu aureo rotundiore pyri par-
vi in versi forma et magnitudine Pluk alm. 350. t. 226 fig. 1. Menon juv.
27. t. 27.

Habitat in Virginia, Barbados C. herb. Vaillant

Folia longitudine et latitudine aequalia, obtusifuscula lin.

aculei longi prope in caule pallide flavescetes

semper unguiculati vel minores superne uti petioli pedun-

culi brevissimi ad inferum folia vix ad pubes panem pallidiora pedun-
4 flori aculeatis, spmum pilosum pediculis ^{unculis} aggregatis subquaternis

aculei longi, recti, glavi in petioli et folii. Folia remote acutepauci-
dentata. Caulis, petioli et calyce hirti. Racemi breves bifidi: ramo pi-
yulo 4 floro. Calyx parvus hirtus inermis. Corolla squae partita laciniis tan-
to solato

Solanum americanum molle foliis ovatis et aculeis flavascentibus
fructu mammoso Tournef. not. v. h. 144

~~non videtur~~ sequens a Plukenet cum nostra quadrat

Carolinense Solanum caule aculeato annuo, foliis hastato-angulatis: aculeis utrinque
rectis, racemis laxis Lin. Spec. pl. p. 268. * L. V. pag. 225

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis ovatis lateribus laciniatis: aculeis
utrinque rectis Hort. Cliff. 61 *

Solanum carolinense spinosum, boraginis floribus spicatis. Dill. Elth. 362. t. 269.
f. 348.

Habitat in Carolina O.

Caulis quasi fruticosus, sed annuus. Folia basi integra, sinuata angulis
acutiusculis, spinis in costa nec lateribus. Racemi foliis longioribus
laxi; simplicibus Lin. Spec. l. c.

Caulis uti folia pili minuti rarisimis stellatis subsessilibus acutis
lei praesi frequentes flavescens glabri ^{foris} sinuato-hastata lateribus
palmaria laciniis obtusi utrinque l. ad 3. Pedunculi calycis
et corolla extus tomentosa racemi elongati. Barba

foliis oblongo lanceolatis sinuato angulatis basi subha-
statis

virginianum l. caule aculeato angulato, foliis pinnatifidis undique acu-
leatis: laciniis sinuatis obtusis, calycibus aculeatis Lin. l. V. p. 225
Jacqu. coll. 2. p. 205. Royen Leydbot. 425. *

Solanum annuum virginianum nigricans spinosissimum flore concoloro
Plukn. alm. 351. t. 62. fig. 3.

Solanum americanum laciniatum spinosissimum Dill. Elth. 366. t. 267. fig.

346.

Habitat in America ☉

Rami angulati glabri, sicut folia et calycis armati spinis sere
pollicaribus copiosis necesse est per speciem frumens glabris. Folio
basi ^{folia} ~~in~~ petiolata juniora veli rarissimis stellatis adpressis adulescentia glabra
nitida scabra: laciniis lanceolata. Rami laterales. Calycis
laciniis ovatis vix villosis. Corolla extus tomentosa. Bacis magni-
tudine sere Persici globosis glabris et vix et albo variegata

~~aculeatis~~ acutis
glabris

bipinnatum Solanum caule ^{annuo} fruticoso aculeato, ^{spino} foliis pinnatis pinnis pinnatis fidis
aculeis utraque rectis
habitat in Bohemia.

Caules herbarum Teres pubescens aculeatis finis; aculei recti
longissimi inaequales fulvi crasse

Folia alterna, petiolata ^{triplicata} pinnata pinnis lanceolatis pinnatis fidis
villosis, aculeis secundum nervos rectis, ~~longis ut caulis~~ ^{in petiolo et foliis} ~~fruticosis~~
laciniis oblongis dentatis ~~aculeis~~ ~~petiolonum et~~

Petiolus folio triplo brevior aculei ut in caule et validiores.

Racemi laterales Calyx aculeatus laciniis lanceolatis. Cymae laterales pauciflorae
les pedunculatae Corolla pinnae extus villosa.
villosi aculeati.

Sepretalis Solanum caule aculeato fruticoso, foliis cordatis integris, corollis subirregularibus, antheris imo productione Hort. Kew. 1. p. 252.

Habitat in Caranis

aculei caulis recti, numerosi. Folia subsicca, subtus tomentosa rarisime aculeata, aculeis unicis in pagina superiore versus basim. Calyx quadridentatus, acuminatus, inermis. Corolla quadripeta, lacinis duabus elongato-foliatis. Stamina 4. pedunculata et petioli aculeati. fructibus glabris

municatum Sol. caule subnervi suffruticoso radice ante, furionibus municatis, fo-
lis oblongo-lanceolatis integris pubescentibus. Hort. Kew. 1. p. 250
Melongena launifolia, fructu Turbinato variegato Seuill. N. 2. p. 435

Tab. 26.

Habitata in Peru. 5

non vidi

Sabinea Sol. caule subnervi fruticoso, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis supra glabris; subtus tomentosis cymis farinosis Hort. Kew. 1. p. 250
Sw. prodr. noster.
Solanum sabineae Jacq. hort. 50. tab. 40. fig. 3

Habitat in India occidentali

Truncus 6 pedalis folia 3-4 pollicina, petiolata, acuta supra glabra, subtus subtomentosa. Racemi laterales 2-3 pollicares. Pedunculi bini. Baccæ globosæ Jacq. folia basi aequalia

non vidi

40-41 niveum Solanum caule fruticoso aculeato, foliis ellipticis integerrimis
inermibus
subtus tomentosis niveis.

Habitat in Capite bono per dedit Dr Bulow.

~~Fruticosa~~ Rami teretes, superne angulati, tomentosi, aculeati: aculeis par
numerosis
sive rectis, apice nudis, floriferis

Folia petiolata, ^{quam nulli sanis} alterna, elliptica, utraque acuta, integerrima, etate supra glabra nuda: junctura utraque tomento
sa

Pedunculus tomentosus, pollicaris
Cyma terminalis, pedunculata, multiflora, tomentosa, nivea.

Pedicelli umbellati, apice coarctati, cernui.

Calyx laciniis lanceolatis.

Corolla extus nivea, farinosa.

(Affinis S. subnerme Sw. prodr: par
aculeatispinis, foliis subtus niveis
diversa ^{vero} patria, ramis

Solanum giganteum Jacq. coll. 4. p. 125

~~profructu~~ ~~Chromola~~

procumbens Acreana foliis linear-lanceolatis vel longi caulibus, procumbentibus
et floribus pedunculatis glomeratis ^{et} erectis petalis calyce brevioribus
Cat. fl. Egypt. p. 66

Radix perennis ^{ramosi} caulis lignosi teretes filiformes.
Caulis plures, diffusi ^{rami} ~~procumbentes~~ pedales simpliciter apice dichotome
~~prostrati~~
ramosi,

Folia sessilia opposita linear-unguicularia, superiora majora et intersti-
tis duplo minora breviora, rudimenta foliacea ex axillis axillis
Panicula terminali ~~dichotoma~~ ^{dichotoma} Flores pedunculati ex axillis ramorum

Panicula terminalis dichotoma. Flores pedunculati, peduncululi
nonum minorum Capillares uniflori, pubescentes pubescenti unguiculari

~~P~~ Petala calyce ovato-lanceolata, margine membranacea
Petala rubra calyce parum breviora
diffidat aem. montana caulibus ^{omnibus} pro floriferis etiam procumbent
nec floriferis erectis, pedunculati non floriferi in non reflexi

Cosolla multo minor rubra calyce brevior. ^{aliam} varietatem in Egypto
legit Boiss. ^{qui gam ad Chederam sed} foliis superioribus oblongis crispioribus vis vero diversa.

cat. fl. Egypt. p. 66
caulis procumbens Boiss.
quodam aem. procumbens
reflexis

obscurem Solanum foliis elliptico-lanceolatis planis, subtus villosis, racemis
 cadentibus, caule petiolis que aculeatis

Habitat in Caienna In von Rohr ex herb. In Lund
Tridactylo, inferne glabra, purpura rasenti, superne tomentosa,
 aculeata: aculei reflexi, fl. reflexi, glabri, pauci
Folia petiolata, bipollicaria, vel ultra, utrinque acuta, integra,
 basi altero latere parum breviora, margini margini plana,
 cetero ^{oriens} supra pilis minutis stellatis adpressis, subtus cetero tomento
 sa, interdum aculeo uno altero parvo, supra ^{petiole} p. demumque
 inermia.

Petiolis pollicariis, tomentosis, aculeatis: aculeis subulatis, rectis
 variis.

Racemi supra folia cæsi, breves, nutantes, tomentosi

Calyx quinque dentatus

Corolla extus villosa, quinque fido: laciniis linearibus

2-3 terminale ^{inermis} Solanum caule ^{inermis} ^{frutescens} ~~frutescens~~, foliis lanceolatis-ellipticis subin-
aequaliter pinnatis; umbellis compositis terminalibus

Solanum inermis; caule inermi frutescente; foliis ovalibus, acutis;
umbellis terminalibus ^{Tosk. descr. pag. 45.}

Caules decumbentes ramosi; rami teretes ^{superne} ~~caeteris~~ ^{apice} ~~caeteris~~ ^{villo}

^{fi} folia petiolata, bipolliciana ^{in ramulis pollicaria unguiculata} utraque ^{laevissima} acuta, simpliciter
venosa, villosa ^{max. profertim subtus}, marginibus undulato
sub-ventriculatis, ciliatis; ramulorum unguiculata pilosior

~~caeteris~~ ^{lobis} oblonga
Pedunculus terminalis erectus ^{in polliciani} umbello ^{termo pedun-}
culato alterno ^{7-9 floro}, ^{pedicelli filiformes inaequales unguiculati} pedunculus pedicellis calycibus corollae
^{caeris} ^{que} ^{superficie} villosis. Corolla

Calyx quinque-dentatus. Laciniis aequalibus lanceolatis obtusis in-
traus glabris

18

Solanum flexuosum, foliis geminatis elliptico-lanceolatis scabriusculi integris
subtus petioliisque aculeatis, floribus tetrandris.

Habitat in Cayenna von Rohr 5

Frutex. Rami teretes, flexuosi, per intervalla biciliatricata, inferne
inermes glabri, superne villosiusculi canescentes, armati aculeis
minutis raris.

Folia petiolata, gemina quinque vel septemlobulata, altero dimidio be
vae, minore, elliptico-lanceolata, integra, integerrima, basi apiceque
acuta, altero latere basos parum angustiora, utrinque e pulis obsoletis
rarioribus stellatis scabriuscula, supra nitidiuscula inermia, subtus
pallidior, costaque inferne aculeata: aculei plerumque per panem
parva parum approximati, interdum solitarii distantes, parvi, flava
scentes, glabri, recurvi.

Petioli pollicares; alter parum brevior, villis ^{raris} brevibus adspersi, subtus
aculeati: aculei ^{minuti} situ et figura ut in foliis, plures frequentes.

Pedunculi laterales, filiformes, unguiculares, cinerascetes. Pedi
celli umbellati (andemum racemosi?) pedunculo parum longiores, inermes.

Calyx inermis, pulverulento-villosiusculus, cinerascens: laciniis sub
latis.

Corolla profunda quadrifida: laciniis linearibus, villosiusculis.

Stamina quatuor. Antherae lineares, longitudine fere corollae.

(Valde affine Sol: obscuro Symb. bot. 2. pag. 41. cui quoque folia geminata, differt ramis rigidioribus, flexuosis, foliis majoribus magis attenuatis, aculeis frequentioribus in petiolo, staminibus quatuor. Nec multum distat a Solano lanceo folio facq. Coll. 2. pag. 286. diversum Yanden ut videtur ramis flexuosius parvis aculeatis, staminibus quatuor.

Crotalaria Solanum fruticosum aculeatum foliis elliptico-lanceolatis supra
glabris subtus tomentosis inermibus; aculeis rectis, manifestis La Mart.
P. E. 2. p. 24

Habitat in Martinique &

Tomentum breve ferrugineum superne

Specimen herb. Ausp. videtur parum
differre frugum Solanum peduncul.
Sicut autem uniflori

quod La Mart. nunc S. affinem Symbol. bot.
et certissime differet Dedit Desfont.

perfoliatum ^{caule scandente} Solanum ^{gastibusque} foliorum aculeatis
Solanum scandens, aculeatum, hyssipami folio, flore albo extru-
perqueno Plum. spec. 4. Aubl. fl. Gu. pag. 217.
Habitat in Guania

Caulis scandens Plum. angulatus, fanticus, pulvereulentus, crassitie
calor Penna cygneus, aculeatus: aculei quasi compressi basi lata
flarescenti, glabri recti. Folia biplica alterno praeternata
pollicis tres lata ovato-lanceolata attenuata extropium obscure
crenata transversum remote venosissime nervosa supra pilis mun-
tis ^{stellatis} rarisissimis subtus pallida pilis coarctationibus. Spina subtus in
costa caulinis simillimo modo angustioribus. Flores non vidi
basi subaequalis

Micranthor Solanum fruticosum aculeatum foliis ovatis acuminatis pubescentibus tomentosis pediculis aculeis minimis raris recurvis La Mart. T. E. 2. p. 24.
Habitat Guadelupe, Brasilia &

Canicifolium L.

Solanum Canicifolium Jacq. coll. 2. p. 2 Pl.

Habitat in America meridionali 5

Caulis pollicem circiter teres erectus, 10 pedalis, superae vix nitidus. Rami
caule similes debiles. aculei in caule et ramis numerosissimi breves recurvi
apice aurantiaci compressi. Folia gemina petiolata, lanceolata utraque
acuta integerrima utraque nitida, scabra supra, subtus ad nervum aculeata 6-8 pollicum
longe. Petioli aculeati. Racemi laterales inermes. Calycis calicis Canico
lata - aculeata Corolla alba profunde spida lobis lanceolatis

Jacq.

cyneum l. caule aculeato fruticoso, foliis lanceolatis acuminatis basi
utroque revolutis, racemis simplicibus An sp. pl. p. 270, Gaertn. herb. t. 14.

Solanum spiniferum frutescens, spinis igneis americanum Plukh. alt. 350
t. 225. fig. 5.

Habitat in America

Rami ^{teretes} superne e pilis stellatis pulverulento tomentosi. Folia petiolo
Solanum fruticosa alta ta attenuata palmaria basi acuta altero latere parum breviora
bacciferis, caule integerrima transversis nervis, adnata ^{simplex armata} ^{si minus} punctata scabra
pinnoso Plum. subtus pilosiora aculeis utroque in costa glabri nitidi rubro ignei
fide herb Surar uti in petioli et ramis. Pediculi laterales elongati racemis
flore superne racemosi uti pedicelli tomentosi. Calycis enormes
parvi lacini lanceolatis corolla lacinis lanceolatis. Anthera
purpurea ~~in botanice flore~~

— attenuatis scabripulis racemis elongatis

Solanum bacciferum fruticosum, frutibus et foliis majoribus
spinis ferocioribus armatis Floran hist. p. 3. v. t. 11. fig. 3
attenuatis lanceis lanceolatis

varietas par
vifolia
aliam misit In West similit nisi quod gaudet foliis pollicantibus ramis uti
reliqua partes minores. aculei longiore angustiore. baccis magnitudine
simili est hoc flor. candido tam. Road: vid. l. c. idcirco non botanice

19

Solanum igneum vs parvifolium

Indiculus virgatus. Pauli varos, vix crassitie penna columbina, glaber

Rami alterni, patentes, superne oculo armato stellato-vellosi.

Aculei sparsi in caula, ramis et costa foliorum utroque, fere ungui-
culares, basi parum latiores, teretes, rigidi, purpurascetes, nitidi.

Folia breviter petiolata, pollicaria vel fere pollicaria, integerrima
basi parum revoluta angustiora, obtusiuscula, utroque oculo arma-
to velli stellatis adspersa, ~~pubescentia~~ ^{pubescentia} supra scabra, arenaria; supra
viridia, adulescentia fere nuda, secundum nervos sublineata: subtus
nervi extantibus, a velli confertioribus pallidiora; tanella subtomento-
sa.

Racemi laterales et terminales, ^{simpliciter;} Pedunculis filiformis, laxis; bipolli-
cari vel parum ultra. Pedicelli remoti; vix pollicares, fere unciar-
satis, fructiferi re flexi.

Corolla quinquepartita; Lacinis angustis, extus villosis.

Bacca glabra, laevis, nitida, magnitudine feminis Conandi

Specimina hujus ex insula St. Crucis misit Rector West. Solano igneo tam
affine, ut quamvis primo intuitu diversum appareret, difficile tamen dicitur ~~esse~~
^{inspectum} ~~esse~~ ^{num} specie differre. Adeoque solum modo uti vari-

varietatem ^t S. ignei hinc descripti, alius, qui occasionem habent ut bene ~~examine~~
in loco natali examine et cum S. igneo conferre velinquit: dignificari non
nomen speciei meretur ^{vel modo varietatis} ~~reserua~~. Differre videtur principaliter: caule ramisque
tenuioribus: foliis multoties minoribus, minus attenuatis: aculeis duplo vel
triplo longioribus

Canicola sola

Solanum polyacanthos, ^{aculeatissimum} ~~spinosissimum~~, foliis linear-lanceolatis subrepandis subsessilibus obtusis, pedunculis axillaribus unifloris, aculeis acicularibus.

Solanum frutescens, spinosissima, foliis angustis et crispis Plum. Ind. pag 218. Tab. 224. fig. 1.

Solanum polyacanthos frutescens, aculeatissimum; foliis linear-lanceolatis, subdentatis utrinque aculeatis; aculeis rectis, acicularibus Le. Mark. Tabl. Enc. etc. pag. 23.

Specimen communicavit Dr. Fischer + ^{crassitie, fere parva columbina}

Caulis fruticosus, ^{crassitie, fere parva columbina} teres, villosus-subtomentosus: villis stellatis flavescentibus, uti rami et folia ^{omnium utrinque} adpersus aculeis conicis, flavescantibus; apice fissis, glabris, rectis, semiinquiriculantibus. Rami alterni, structura caulis.

Folia vix petiolata, sesquipollicaria, angusta, obtusa, basi aequalia, subrepanda vel integra, utraque ^{villis} petiole stellatis minutis adpersa, scabra, scula, viridia.

Pedunculi axillares, solidarii, brevissimi, uni flori.

Calyx pubescenti-stellatus, ^{villis} ^{pub.} ~~inermis~~ stellato-pubescenti, inermis.

Petala linearia, extus villosa.

Stamina quinque, longitudine petalorum petalis pariter breviora.

Bacca globosa, glabra, nitida, magnitudine seminis Corandri

angustatum l. fol. acule fructuoso ^{subt. argenteo} caule folisque aculeatis pinnis aculeis rectis
aciculantibus, foliis lanceolatis serratis pinnatis pubescentibus

Habitat in Bonana Commeson

Flores desunt. aculei aurei Folia sequipollitiana iniana unguem
lata

prostratum s.

bahamense. S. caule aculeato fruticoso, foliis lanceolatis repandis obtusis
 margine reflexis, racemis simplicibus l. n. 5. V. Jan 1. 08
 Solanum fruticosum baic. specum fruticosum, flore conleto Swan-hut 1 p. 20.
~~Det. f. 3.~~

Habitat in America Insula Providentia 7

Caulis teres glaber rami e pilis minutis stellatis puberulentis. aculei sparsi
 acrofi glabri flavescentes. ^{altero latere granis brevem} folia petiolata bipollicana ^{interrogu} ^{remote}
 vel subrepanda utraque ^{marginibus} pilis stellatis state supra fere glabra nervosa
 subavenia, ^{obtusiuscula}. Racemi laterales foliis longiores, ^{inermis}
 pedicelli distantes unguiculari ^{versus} ^{florem} ^{crasse} ^{inraspati} uti
 pedunculis state glabri. Flores parvi calycis ^{inermis} ^{ut} ^{extus} stellato pilo
 villosi. Bacca magnitudine ribi nigra glabra 7

igneo affine

aculeata Agrostis Gay. Amer. 15. t. 12. Sp. pl. pag. 161 * Gay. Pl. fr. pag. 19

Habitat in America meridionali

Habitat in ⁴floribus ²quadripedalis. Ramis teretibus junioribus aculeatis junioribus tomento
p. folia pedicelata, alterna, ^{polligera} ovalia, integerrima altero latere breviora, obtusa,
superne acuta, utrinque pilosa: pili stellati. aculei sparsi, recti, circula-
res. Pedunculis lateralibus solitariis, unifloris. Corolla alba. Calyx tomento fusco.

— foliis ovalibus subtomentosis, pedunculis lateralibus unifloris flori-
bus tetrandris

villosum s. ^{ovato} ^{subrepando} fabrisium aculeis recurvis, foliis oblongis ^{subrepando} ^{fabris} integris canescentibus
inermibus, ramisque canescentibus

Habitat in Arabia Forsthal

Rami teretes incani aculeis compressis recurvis flavis. Folia
petiolata villosa fabrisiana oblonga pollicaria integra vel obscure
repanda obtusa. Flores in specimenis desunt

Coccineum L. caule aculeato fruticoso, foliis ovatis subrepandis uno
alterove aculeo armatis subtomentosis Lin. l. V. p. 225. Gaicq. *Muscul*
n. p. 327. Gc. var. t. 24

Habitat.

Frutex bipedalis breviter et rantes aculeatus. Rami patuli, tenues aculei
rasti, subulati, fusi. Folia late ovata obtusa, petiolata, ferdide virentia
nervo medio utrinque et petiolo rantes aculeato. Racemi oppositi folii
breves, simpliciter, subinermes, tomentosi. Calyx parvus subinermis, tomen-
tosus. Corolla rotata, profunde quinquefida, calyce multoties longior
albida vel alba: laciniis ovatis lacincolatis acutis. Bacca pififor-
mis rubra, dein ferdide aurantia Gaicq.

an ~~pl~~ Solanum sub nomine acanthifolii ex horto Panfense
non vidi

undatum Solanum fruticosum aculeatum, foliis ovatis repandis ^{puberulis}
† omentopis, tubis aculeis nidis La Mart. T. E. 2. p. 22.

Rheed. Malab. 2. t. 37

Habitat in India orientali; insula panicosa

hybridum. caule aculeato fruticoso, foliis ovatis subinermibus acutis
repandis, venellis dorso et ad oras violaceo-pulverulentis Lin. l. V. p
225. Jacq. Hort. 2. t. 113.

Habitat.

Aculei validi. Caulis bipedalis, ramis tomento pulverulento obfritis. Folia petio-
lata, undulata, pallide viridia. Pedunculi racemosi, tomento
si, umbellati, flos violacei, pauci. Calyx tomentosus
Corolla pallide coerulea. Bacca subrotunda, depressa, subflicca-
ta, pendula colore aurescente nitida Jacq.

non vidi

vide nota sub solano sancto

Lanatum L. caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosi foliisque oblique
ovatis repandis Lenz. Spec. pl. p. 269x

Solanum Ethiopicum maxime tomentosum, caule solummodo non
foliis, aculeatum Planch. aln. 35 p. 7. 316. fig. 52.

Solanum spinosum fructu rotundo Bauh. pin. 167.

Habitat in palæstina

Paulis tomentosus cinereus, aculeis crassis compressis subcervicibus basi tomen-
tosi flavescientibus. Folia ovata basi subcordata altero latere breviora
palmata vel minor incana obtusa obtu. aculei in costa supra
2-vel 3. Petioli subtus aculeati. Racemi laterales breves pedicello
primario cum calyce spinoso, reliquis mapulis inermibus. Specimen Guss.
~~Planch. fr. lanato tomentosum foliis fere pinnatifido~~

Folia cordata cuneata, margine equali, raro obscure repanda herb. Vahl.

alicuius sub hoc nomine colui caule fere lanato aculeis angustioribus
foliis minus tomentosis videntibus basi acie obtusi p. fere
pinnatifido sinuati aculeis pluribus in costa et venis flos Mora-
gini coerulei an dem cultura mutata vel specie diversa
~~habet~~ hybridam facere credo

Planch. ed. potius ad tomentosum spectat