

*Solanum*

Saniculum Solanum caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosis, foliisque oblique  
ovatis repandis Lin. l. VI pag. 225  
Solanum incanum Cosm. descr. pag 46.



*Solanum* s. caule aculeato fruticoso: aculeis acerosis, foliis cordatis <sup>ovatis</sup> inermibus  
subrepandis: venellis purpureo-pulverulentis. Lin. Spec. pl. p. 769.

*Solanum spinosum* maxime *Solanum* Boiss. fr. p. 85.

*Solanum africanum spinosum*, folio carnositate undulato Trumpheti prol.  
46. t. 6. Ray. suppl. 355.

Habitat in Aethiopia &

Caulis uti tota planta dense tomentosa rami teretes aculeis setaceis flavis teretibus  
paucis adpressis. Folia cordata obtusa repanda crassa costa fere  
sola spinosa uteridum inermia. Venella prodeuntia margine pulvere  
violaceo adpressa. Bacca fulva magnitudine grossularum

cordatum *S. foetidum* tomentosum, foliis cordato lancicollatis attenuatis subrepandis, micis lateratibus

Habitat in Peru ex horto Madritensi habitus

Rami flexuosi uti tota planta vel dense villosa tomentosa adpressi aculeis nonnullis acicularibus auris minutis <sup>glatris</sup>. Corolla petiolata palmaria basi sesquipollicem lata cordata inaequalia extrospum versus sensum attenuata integra vel obscure repanda acuta utraque inermia. Racemi floriferi breves. Calycis <sup>lacinae</sup> foliola lineari lancicollata obtusa dense tomentosa. Corolla magna coenaeo extus villosa.



agrestis fruticosum, foliis oblongis sinuato sub quinquelobis subtus tomentosis.

floribus racemosis

Habitat in India orientali Hongk

Habitus omnino Solanum indicum ut tantum differe videtur ab  
Spinanum ceterum in omnibus convenit ut vix differat

marginatum l caule aculeato fruticoso, foliis cordatis repando margine albis  
Her. Suppl. p. 147. & L.V. p. 226 Gaerth. coll. 1. p. 50

Solanum marginatum, aculeatum foliis sinuato-angulatis, fructus  
omnino, superne margine tomentosi, Calycibus tripartitis Murr.  
in Com. Gott. 1703. 4. 4.

Habitat in Abyssinia

Caulis fruticosus, orgalis albo tomentosus ramis aculeis flavescenti-  
bus adpressis. folia petiolata basi cordata altero latere aequalia  
breviora <sup>punciora mollescunt</sup> ~~in~~ albedo tomentosa ad altero supra  
state glabra <sup>interius vel subangulatis</sup> excepto ad marginem venosa sinuato repando  
sinuato laciniis obtusi utraque ac venis aculeata. aculei proxi-  
mi recti flavescentes longi caulini longioribus. Rami laterales  
albo tomentosi pulverulenti. Flo. laci calycis uti pedicelli  
aculei tenuibus plentibus. laciniis in fructu feni majoribus laciniis  
ovatis. Corolla campanulata plicata extus albedo tomentosa

repando sinuatis



heterophyllum Solanum fruticosum aculeatum, foliis ovatis serratis,  
repandis subtus tomentosis, alicuius minoribus obovatis integerrimis

La Mart. T-E. 2. p. 25.

Habitata Guiana &  
aculei ramorum recurvi.

Torum Solan. caule aculeato fruticoso, aculeis curvis; foliis cordatis  
 ovatis pinnatis tomentosis, rachibus aculeatis, calycibus inermibus.  
 Sw. prod. pag. 47.  
 Solanum indicum Lin. Spec. 1.

Habitata India occidentalis

Caulis angulatus superne tomentoso griseo aculei parvi basi  
 lato compresso tomentoso superne glabri flavescente apice purpurei  
 recti. <sup>palmaria</sup> folia petiolata, alterna basi cordata, longitudine et latitudi-  
 ne <sup>ab medio</sup> aequalia s. vel 7 loba <sup>interdum breviores</sup> supra scaberrima pilis minutis  
 aculei plerumque stellati, viridia subtus tomentosa <sup>incana venosa</sup>. Lobi ovati  
 utrinque in <sup>basi</sup> acuti obtusi vel <sup>angustissimi</sup> acuti <sup>integri</sup> obtusi, Pedunculi  
 Costa et venis <sup>parvis</sup> laterales plerumque gemini <sup>caeris</sup> <sup>basi</sup> <sup>pediculis</sup> sesquipolli-  
<sup>interdum tantum</sup> <sup>subtus interdum</sup> ces. pedicelli femurquidens <sup>glabrescens</sup> <sup>fusco villosi</sup> uti caly-  
 ces calycis laciniis <sup>fusca</sup> <sup>laevicolata</sup> mucrone terminata  
 Corolla et tunc tomentosa. Baccis magnitudine pesi.

Solanum Bill. 270 fig. 349 huc forte pertinet  
 variat foliis minus vel majori integris  
 S. huc descriptum an prolixius mammosum Lin. ~~quod dubit~~  
 Diversa a Sol. ind. Lin Ind orientalis

seta



Specimen aliud ex horto parisiensi sub nomine acanthifolium an diversum.  
Folia ovata angulata sublobata basi non cordata. racemi solitarii  
pedicelli unicam alpe<sup>te</sup> abque mucrone <sup>supo</sup> an corineum saepe  
cui? Diversa nisi videbitur  
Specimina mea ex aite cam spec. herbarie hui. conveniunt. et quia  
ideoque hui. l. ind. India occidentalis. differentia l. Torr. in hui. prodo  
est eadem ac differentia Solandri qui hanc <sup>ant</sup> in manusi. *Solanum*  
vocavit et in herb. Torr. unde hui. nomen et differ. mutaverit *Daphn.*  
planta nostra ex parte nte Determinata est  
radicum <sup>com</sup> Orientale et forte armatum Solandri folio villosi *Solanum*  
basi transversa racemi multiflori

————— *Solanum* pennatifidi racemis  
lateralibus bifidi pedicelli secundis  
*Solanum acanthifolium* Plum. Cat. spec. herb. Gars.

*Stramonifolium* Sol. caule aculeato fusciflo, foliis cordato-angulatis lobatis  
integris subnervibus, subtis tomentosis pilis Hort. kew. 1. p. 282  
*Solanum stramonifolium* Gaigu. miscel. 2. p. 290.

Habitat in India occidentali;

Caule, folio utrinque, petioli, ramis per se aculeati: aculei cauleni raris  
vi reliqui recti. Truncus cinereus exasperatus. Folia ampla, cum petio

la maris folia  
grosse dentata  
angulata cordata  
subtus villi raris  
caulis suffruticosus  
glaber aculei se  
sunt in

lo pedalis, utrinque villosa mollia, foliis sub lanceolatis acutis.  
Petioli teretes, villosi - appen. Pedunculi breves in caule foliis superioris  
ni oppositi, horizontales. Pedicelli plurimi, circulatiter dispositi, subvires  
casi uti calyx. Calyx minimus, laciniis subrotundis. Corolla pallida  
purpurea aut alba laciniis lanceolatis longis Gaigu

sub nomine *acanthifolii* Solan: a fusciflo habui cum different: Hort.  
kew bene conveniens cum in non parvis cum <sup>definitione</sup> ~~invenimus~~

nisi quod <sup>folia</sup> ~~subtus~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>mea</sup> ~~non modo~~ <sup>subtus villosa</sup> ~~subtus villosa~~ <sup>invenimus</sup>  
tomentosi lobis potui ~~subtus villosa~~ <sup>obtusis</sup> ~~obtusis~~ <sup>quam lanceolatis</sup>  
scati an meum a Basniflo habui sub nomine  
torvi an Tororum meum *stramonifolium* et *stramonifolium*  
nifolium tororum

an idem cum Torvo non vid



2930 herb. Solanum caule fruticoso aculeato, <sup>lim</sup> foliis cordato angulatis to-  
mentosis aculeatis, pedunculis lateralibus aggregatis calycibus  
que hirsutissimis

Habitat in Insula Trinitatis a. von Rohr ex herb. Dr. Lund

Caulis fruticosus, superne tomentosus, aculeatus: aculei  
recti, parvi, aciculari, sparsi

Folia petiolata, palmata, <sup>obtusa.</sup> angulo l. vel 3 ad singulum  
latus inaequali, obtuso, utrinque tomentosa, mollia,  
subtus albidiora: aculei sparsi in nervis <sup>utrinque</sup> ungui-  
culari, robustiores quam in caule, glabri, recti,

Petiolus pollicari, aculeatus

Pedunculi supra foliacei, plures aggregati, unguicula-  
res, uni flori hirsutissimi

Calyx: laciniis ovatis, acutis, extus hirsutissimis.

Corolla quinque partita, extus hirsuta intus glabra, caly-  
ce duplo longior: laciniis 3 laciniis reliquis duobus parum  
longioribus

[Litr. L. pag. 41.]

Anthera subulato, corolla parum brevior.  
Germen hispidum. Stylus antheris brevior



Crinatum Solanum fruticosum aculeatum, foliis ovatis sinuato-angulatis  
Tomentosi petioli pedunculis calycibusque ciliatis s. p. m. subcinai  
si La Mark - T. E. 2. p. 20.

Habitata Cayenna <sup>herb. 4 us.</sup> et naque tomentosae simpliciter serop.

Folia ampla <sup>per m. 11</sup> supra <sup>at</sup> inermia, subtus rantes aculeata, flores maximi

¶ vel aculei non  
nulli parvi recti  
base fusi

anguinea Sol. aculeatum fruticosum, foliis ovatis pinnato-angulatis puberulis  
tomentosis calycibus inermibus La Mart. P. E. 2 p. 23.

Habitat in Madagascaria

caulis parvus, ruber, glaber, spiculenta

Secundum specimen herbarii Turci non videtur descriptum ab indicis Lin.  
Est India orientali



rigidum Solanum frutescens aculeatum humile, foliis ovatis sinuato-  
angulatis aculeatis nudis, aculeis rectis albidis L. Mart. T. E.

2 pag 23.

Habitat

Cauli erectus, rigidus pedalis, folia acuta, flos albi.

17

Solanum scabrum, foliis ternis ellipticis subsinuatis pilosis scabris, racemis lateralibus,  
caule foliis calycibusque aculeatis

Habitat in America una India occidentali von Rohr &

Frutex. Rami teretes, flexuosi, a pilis stellatis <sup>obsolis</sup> (substatis), armati aculeis  
recurvis, compressis, flavis, glabris, brevibus.

Folia petiolata, terna simul ad eodem latus rami, <sup>unicum</sup> quadrata vel quinque pollicaria  
alterum tripollicare, tertium interdum vix pollicare, majora pollicis  
duos lata, elliptica, basi acuta, apice obtusiuscula, lateribus utrin-  
que bi sine triangulato-subsinuata, <sup>utrinque</sup> stellato-pilosa, scabra, ~~proscinduntur~~  
e stellulis ~~scabra~~ <sup>compositioribus subtus perclivata</sup>, costa utrinque aculeata: aculei parvi, facie ramorum. Rudia  
mentum ramuli in axilli, folus sordida flavescens tomentosus.  
Petiolus unguiculans vel pollicaris, aculeatus

\* aculeatus; racemi laterales, solitarii, bipollicares, pericla florescentia florum infimo  
eius aciculantis, non reflexa retroflexa. Pedicelli unguiculares, filiformes, interdum  
frequentibus: aculeo aciculari armati, fructiferi sursum curvati, uti pedunculis et  
calycis pilis stellatis tacti.

Calyx brevis, Lacinia lanceolata, acuminata, acumine patulo.

Corolla quinquepartita & lacinia lineares, extus tomentoso incano.  
Thalio parvo, glabro.



~~an Solano scandente Swartzii prodr. pag.~~

(Quantum a differentia conjuncta licet, affinis videtur Solano scandente Swartzii prodr.  
pag. 47. quod a Solano scandente Linnei diversum est

volubilis  
~~pendens~~ l. caule aculeato fruticosa scandente, foliis angulatis, petiolis, rachibus  
calycibusque aculeatis, racemulatis Sw. prodr. pag. 47.  
Habitat in Hispaniola.

non vidi Diversa a Scand-ber.



paniculatum Solanum caule petiolisque aculeatis, foliis pinnatis-angulatis supra gla-  
bris floribus paniculatis. Lin. Spec. pl. pag. 267\* P.V. pag. 225  
Jurepeba P. J. bras. 181.

Habitat in Brasilia

Caules et petioli albo tomentosi aculeis rectis, rarioribus, nudis: folia  
tomentosa, lata, cordata, profunde angulata, acutiuscula, inermia,  
supra glabra. Panicula terminalis, composita, tomentosa, uti Calycis  
vermis Lin. Spec. pl.

non vidi num synonymum P. foliis hinc pectinatis

*aculeatissimum* <sup>*aculeatissimum*</sup> *S. foliis cordatis sub-vellofis subpinnatifidis laciniis dentato ang<sup>2</sup>*  
*lobis, racemis brevissimis lateralibus*  
*Solanum aculeatissimum* Gaerth. coll. 1. pag. 100.

Habitat in Amer. merid.

Suffruticosum *S. campestris* hians valde affine. Caulis teres erectus;  
2-3 pedalis, crassitie digiti. Densissime aculeis subulatis inop longitudine  
vario villosque in tergetis obpitis. Folia cordata, acuta, lobata, denta-  
ta, petiolata, villosa, mollia, utrinque aculeis longioribus rectisque arma-  
ta, venosa. Petiolus aculeatus, villosissimus. Pedunculi laterales, villo-  
si; brevissimi et umbellati pauciflori: pedicelli subaculeati. Calycis  
lacinis lanceolatis. Corolla nuda laciniis lanceolatis. Baccis glabra  
pallide flava Gaerth.

— *ca aculeatissimum villosum*



*Gurpaba Solanum fruticosum, aculeis in ramis recurvis, in petiolo et nervo medio rectis, foliis ovatis serratis, subtus subtomentosis, racemis subsessilibus, laciniis corollae longo linearibus. Act. Soc. h. n. par*

ney. 107

Habitat in amer. merid.

non eodem cum refecto

31-92 Coagulari Solanum caule <sup>aculeato</sup> ~~aculeato~~ <sup>subcordato</sup> ~~oblongo~~ foliis oblongis repando-  
sinuatis tomentosis aculeatis: lobis rotundatis integris, calycibus aculeatis

Solanum coagulari Boiss. descr. p. 47.

Caules tomentosi, incanus, uti tota planta. aculei sparsi, aciculari,  
flavescentes, glabri, recti

Folia petiolata, remota, bipolliciana, obtusa, basi altero <sup>latere</sup> breviora; lobis  
utrinque tribus, <sup>40</sup>lati, rotundatis, integerrimis, supra arena, planum  
que inermia, subtus simpliciter venosa, aculei in costa aciculari  
rarius in venis

Petiolus sesquipollicari, undique aculei sparsi ~~est parvis~~

Racemi <sup>sub</sup> oppositi folii, erecti usculi, octoflori.

Pedunculus rigidus, sesquipollicari; pedicelli unguiculari, reflexi,  
inermes, uti pedunculus aculei ~~robustiores~~ quam in

Calyx tomentosus, valde aculeatus, persistens religiosa planta

Fructus globosus, magnitudinem nuclei Ceyli, campi glabro.



Coagulans Solanum caule <sup>fr</sup> aculeato fruticoso, foliis oblongis repando  
pinnatis laciniis rotundatis integris, ramis lateralibus baccis  
pendulis <sup>glabris</sup> calycis aculeato tectis

rami forme *S. Luteo* opem aculeis caulibus <sup>oblongis</sup> aculeatis, foliis <sup>oblongis</sup> laciniolatis <sup>oblongis</sup>  
<sup>pinuatis</sup> basi attenuatis calycibusque <sup>racemosis</sup> aculeatis floribus <sup>racemosis</sup>

Habitat in Armenia meridionali

an Solanum scandens, aculeatum, hypogyni folio, flore intus albo,  
extus purpureo Plum. frei. pag. 4?

an Solanum scandens L.

Habitat in Armenia Cambis Mart. f. 5

Rami teretes, villosi adpressi aculei parvi purpurascantibus  
rectis. Folia, oblonga bi <sup>epily</sup> <sup>stellata</sup> <sup>utrinque</sup> <sup>tripollicana</sup> acuta basi attenuata

juniora tomentosa adultiora fere glabra utroque aculeis  
validioribus 5-6-7 lobis lobis laciniolatis acutis. <sup>pediculi</sup>  
breves aculeati. Racemi laterales, breves <sup>aculeati</sup> <sup>aculeati</sup>  
nisi <sup>sub</sup> <sup>ramis</sup> <sup>robustior</sup> <sup>setis</sup> <sup>ma</sup> <sup>culis</sup> <sup>calyx</sup> <sup>valide</sup>

aculeatus laciniis laciniolatis villosis Corolla tomen-  
tosa Bractea glabra magnitudine pennis juglandis globo-  
sa

Confer Plum. n. 225 fig. 6



acetosifolium Solanum aff. suffruticosum; aculeatum glabrum, foliis obtu-  
si pinnatis subquadronifloris; aculeis minimis recurvis La Mart  
T. E. 2. p. 24

Habitat in India orientali.

Calyx parvus inermis. Corolla ampla.

Indicum. caule aculeato fruticoso, foliis cuneiformibus angulatis pub  
villosis integerrimis: aculeis utraque rectis Len. Fl. Zeyl. 947 Burm  
Zeyl. 2208. 102.

Solanum americanum perenne subaerianum, fructu pyriformi longiore,  
fimis plurimis armatum Plukn. alm. 350. T. 225. fig. 6.

Solanum indicum fruticosum, flore Bonplandii Dill. Elth. 962. T. 270. fig.

349

Habitat in Indiat

Schem. secundum Schum. Arch. mal. pag. 67. t. 36

Habitat in India orientali

Frutex bipedalis ramosa: rami teretes superne tomentosi aculeati  
aculei compressi fulvi: diffantes recurvi. Folia petiolata bi  
pollicari basi transversa vel obliqua altero latere breviora  
utroque villosa supra vixidia subtus incana aculei recti

flore omnes  
hermafrodit.

pediculis in utraque pagina junioribus obtusis lobis utroque  
geminis obtusis brevibus integerrimis. Pediculi incani tomento  
si aculeati Pediculi laterales sesquipollicari quinque vel  
sexloso pedicelli longitudine fere pedunculorum sursum in  
craspedi aculeati calycis laciniis aculeato aculeis parvis  
lanicollatis tomentosis uti corolla extus. Baccis globosis  
De Syn. Plukn. dubito) glabris nitidis magnitudine fere cerasi



Differt igitur a ~~torvo~~ caule brevior, foliis minoribus basi non cordatis  
racemis paucifloris calycibus aculeatis, bacis majoribus <sup>calycibusque</sup>  
varietas ~~aliam dedit~~ ~~caule~~ foliis pedunculisque magis aculeatis.  
Racemi parum longioribus forte e cultum  
Vestrum denique misit de König foliis longioribus, minus villosis  
basi aculeatis ~~videtur~~ bacis duplo majoribus

<sup>aculeis recurvis</sup>  
fruticosus foliis oblongis paucatis subtus incanis calycibusque aculeatis  
racemis paucifloris

varietatem misit König sub nomine. Kasi s. agride via diversum nisi quod  
fere in rermis. aculeis unguis vel alter minutus in pedunculis ad caule  
superne reliqua in rermis ceterum in omnibus cum indicis convenit  
foliis majoribus magis paucatis lobis obtusioribus.

<sup>2</sup> ruderale S. f. undique aculeatum aculeis rectis, foliis oblongis villosis  
limbo obtuse sinuato lobatis glombis ratisimosis infimo fructifero

Habitat in India orientali Koenig

affine S. india diversa videtur caule, nisi superne minus  
villosa tomentosa habitu latiore, foliis tenuioribus utraque  
villosis nec pubescentibus in <sup>villosis</sup> pedunculo <sup>racemosis</sup> aculeis com-  
pressis rectis, pedunculo infimo tantum fructifero <sup>inleji-</sup>  
doe caducis, facilius longiore tuberosa per glabro  
reflexo sulcata triplo major



fuscatum L. caule aculeato furticoso, foliis ovatis obtuse lobatis: aculeis  
utrinque rectis: superioribus coloratis Gaigu. coll. 1. p. 51.

varietas campestris L. ~~non~~ <sup>notum</sup> specimen herbarii vero plane recedit

2. Hortum *S. fruticosum* acul ramis distortis aphylli aculeis aciculantibus <sup>rectis</sup> foliis <sup>puberis</sup> cune-  
puberatis glabris <sup>integris</sup> septemlobisve pedunculis unifloris

Habitat. Ex horto Hafneri 5. Speciei dubia sed pro Sodomae habitata

Rami teretes, glabri, cortice cinereo, aphylli sive aculeis minutis acic-  
culantibus armati rectis armati. Ramuli breves dense villosi  
~~foliis et floriferis aculeis pallidis rectis~~ versus apicem foliorum  
Folia polluciana aequalia glabra tenella tomentosa ut unguis aculeata  
uti petioli aculeis validioribus quam in ramulis apice rotun-  
data basi angustiora flabdequalia acuta integra vel 5-7 lobo  
pinnata. Pedunculi laterales solitarii uniflori. Calycis  
aculeati

an modo varietas Sodon



nutans E. floribus <sup>nutantibus</sup> quadrifidis lateralibus, foliis cordatis  
Habitat in <sup>zeilone ad lemites</sup> India agris sylvaticis solo fertili humido. Heriz  
Planta plerumque vix uncialis, rariusque digitalis. Caulis tetragonus  
Dichotomus. Folia sessilia remota, carnosae. Pedunculi axillares  
<sup>folia longioribus</sup> breviter angulati, uniflori. Flores nutantes albi

Sodomium. Caule aculeato fruticoso tereti, foliis pennatifido-finuati  
frange aculeatis nudis, calycibus aculeatis Linn. fl. zeyl. 95.

Solanum pomiferum frutescens africanum fruticosum nigricans, boraginis flore  
foliis profunde laciniatis Monf. hist. 3. p. 521. f. 13. t. 1. fig. 15. Heron Lugd  
973. t. 575.

Solanum fruticosum, profunde laciniatis foliis subtus lanuginosis, maderupata  
num Pluken. alm. 351. t. 3, 6 fig. 4? 226. fig. 5.

Habitat in africa, <sup>per punctum puncti farinosi rarisimi ad presens</sup>  
Caule ~~in octofo~~ aculeis sparsi distantibus, crispioribus com  
pressis, recurvis luteis. Folia oblonga finuata paucibus rotunda  
tis, supra glabra, subtus tomentosa undia: utrinque aculeis  
subulatis albidioribus, angustioribus, erectis, parvis ramis venis  
in pedunculibus <sup>paucis brevibus</sup> lateralibus longis ramosis aculeis  
rectis armatis. Calycis aculeatis in collo extus villosa

fili folium meum hinc petinet  
aculeis recurvis  
~~fruticosum~~

in mea culta folia tenella tantum subtus  
tomentosa adulescentia glabra laciniis folis  
non oblongo obtusissimo irregulariter angula  
to recta  
~~fruticosum~~



specimeni meo est Sol. bahamense *Trochiloides aculeata* caul ramosa et foliis  
differt tantum ut videtur foliis calycibusque inermibus floribus majoribus  
ambo dum figura Pluken: conferunt ab Herm. differunt ab specie. Desfontain:

mea planta cum figura Hermanni Monf. et Plukenetii ta 6226 fig 9.  
et ab vero 3/6 fig 4. Plukenetii uti et ex parte Desfontainis hujus

planta in <sup>desfontainis</sup> flora Zeyl. hii indica diversa. aculei enim in  
caule non ~~reperiuntur~~ <sup>reperiuntur</sup> sed reperiuntur folia subtus tomentosa et mea

~~herbaceae~~  
caule foliis calycibusque aculeis

aculeatum, aculeis rectis compressis foliis pinnatis serratis pinnatis  
glabris latius obtusis angulatis

*Codoneanthus*

*pinnatifida* L. herbarium glabrum <sup>calycibus</sup> acis caule folisque pinnatifidis aculeis rectis  
fructu <sup>demum</sup> laciniis foliolum angulatis obtusis

Habitat

ex horto Parisensi habui

Caulis erectus herbaceus crassitie penno cygneo purpurascens adpa  
armatus aculeis compressis pluribus validis flavescens basi  
purpureis, glabris. Folia longe petiolata <sup>repeta</sup> per petiolum parum  
decurrentia obtusa, glabra, juniora pulverulenta tomentosa  
pinnatifida laciniis 5-6 remotis obtusis extusum angulatis  
sape utrinque sinu lobatis alternis. Invis obtusi utrinque uti  
petiolus <sup>per</sup> aculeis ut et in petiolo cauleni pumillimis armatis  
racemi laterales breves. Calycis aculeati aculei conopossumi validio  
res in primario laciniis ovatis vellosis vixidibus. Corolla tomentosa  
maxime convenit cum *Sodomeo* at nostrum herbarico nec fructuosa

est *Sodomeum*?



Inflorum S. foliis lanceolatis sinuato subpinnatifidis angustis  
glabrescentibus pedunculis trifloris

Solanum bahamense Fosberg

Habitat in Arabia

Species per lobata: folia profertim juniora bipeda pinnatis  
minuta stellatis aculei subtrecurvi parvi in costa  
foliorum subtrecurvi

*Nepenthes Solanum* caule aculeato suffruticoso foliis oblongis acutis  
pinnatis pinnatifidis tomentosis, aculeis levis suboccidentis  
La Mart. P. En. 2. pag. 21.

Habitat in Madagascaria

folia pithamou vel longiora, ut nunc aculeata

promiforme et indur.



humile, solan. frutescens aculeatum, foliis ovatis obtuse pinnatis aculeatis  
subnatis, aculeis natis albidis La. Mart. T. E. 2. p. 23.

An *S. capense* Lam?

Habitat 5

Caulis ramosus, erectus squamulatis floris violaceis

Capense. f. caule aculeato fruticoso tereti, foliis sinuato-pinnatifidis  
aculeatis nudis: laciniis alternis integris obtusis Lin. Suppl. p. 147

S. V. p. 226.

Habitat in Cap. b. p. 5.

Copia aculeorum horrida. Lin.



<sup>olanum</sup>  
Totianum fruticosum valide aculeatum, foliis lobato-angulosis tomen  
topis basi oblique emarginatis, aculeis utroque fraxis, racemis  
sesquibus, laciniis corolla lanceolatis Act. bot. h. n. par. 1. pag. 107  
Habitat in Amer. merid. herb. Kunt.  
Guinea per Tenor. P. v. Bot. lib. Cap. 1.

naudi

Inlobatum L. caule aduleato fruticoso, foliis cuneiformibus subtrilobis  
glabris obtusis inermibus *Plin. Sp. pl. p. 270* (Burma fl. Ind. 57. 7. 22. fig. 2.  
rx) L. V.

*Solanum spinosum jamaicense glabrum, foliis parvis minus profunde  
laciniatis Plin. 35. 1. 7. 316. fig. 5.*

Habitat in Jamaica, ad P. b. Speitz

Caule sub frutescente altius, angustus. Folia parva, glabra obtusa, subtri-  
f. quinqueloba, raro etiam ad basin lobata. <sup>vel bifloro</sup> Auriculae reflecti in caule  
petioli, foliis pedunculis. Pedunculi uniflori. Calycis minimi, iner-  
mes aut sculeati. Bractea parva sambucii. Stylus adscendens tra-

— lanceolato <sup>ine</sup> subcuneiformibus <sup>in</sup> sculeatis



lobatum L. <sup>glabrum</sup> ~~fruticosum~~, folius angulato subquinquelobis <sup>oblongis</sup> cauleque aculeis recur-  
vis, pedunculis uni flori, calycibus ~~que~~ inermibus  
Solanum trilobatum Burm. fl. ind. p. 57 tab. 22. fig. 2.  
Habitat in India orientali;

Caulis fruticosus: rami tenues subherbacei glabri aculeis compressis flava  
frequentibus recurvis. <sup>pesque pollicis aequo</sup> Folio petiolata longitudine ~~ad~~ latitudine aequa  
lobis basi subinaequalia quinqueloba juniora venella triloba: lobis rotun-  
datis obtusis, glaberrima utrinque aculeis unus vel alter ut in costa  
brevis recurva. Petioli <sup>longitudine</sup> aculeis plerumque recurvis pedunculif-  
eris petioli filiformes solitarii glabri inermes raris aculeis soli-  
tariis minuto, uniflori longitudine petiolorum. Calyx parvus  
laciniis acuminatis Calyx glabri. Corolla magna campanulata  
villosa extus, laciniis ovatis acutis.

ex mente Solandri a trilobato haec differt.

procumbens Solanum caule aculeato <sup>huf</sup> fruticoso, procumbente, flori-  
bus terminalibus congestis Lour. fl. Cochine h. pag. 132.

Habitat in Cochinchina.  $\frac{1}{2}$

Caulis longus dens aculeatus, ramis folia ovata 5 loba  
utroque villosa, sparsim aculeata. aculei breves, curvi  
acutissimi. floris albo violacei pedunculatis. Cal. 4fidus.  
Corolla 4partita rotata. Baccis subernis, nitida.

non vidi



Quinquelobum.

aculeatissimum L. fruticosum aculeatissimum aculei caulini <sup>recti</sup> ~~recti~~ <sup>curvi</sup> foliis  
oblongis quinquelobo ~~fructu~~ <sup>fructu</sup>, pedunculis uniflori  
Habitat <sup>5</sup>

Species mihi obscura ideoque ~~huc~~ <sup>huc</sup> citi non descripta traditur  
Caulis fruticosus ramosissimus ramulis tomento flavescientibus, uti petioli  
folia utroque pedunculi calycis que adpressi aculei flavescienti  
bus <sup>subrecumbentibus</sup> ~~conspicui~~ longi caulini ~~recti~~ <sup>recti</sup> reliquis ~~recti~~. Folia petiolata  
sesqui polliciana utroque apice stellatis pubes <sup>sericea</sup> ~~sericea~~ profertim  
pubes pubescentosa obtusiuscula basi subacuta <sup>summa</sup> ~~summa~~ si vel 7 lobata  
lobi integri obtusi. Pedunculi laterales breves solitarii uniflori  
tomentosi uti calycis. Lacinis calycis lacinolata Corolla ~~extus~~  
tomentosa.

a. aculeatissimo Jacq. Diversum nomen Triviale non videtur

~~Straminifolium L. caule aculato, fruticoso, foliis cordatis acute lobatis  
aculeatis pubescentibus, calycibus inermibus L. V. p. 226. Hægn. mif.  
n. p. 290.~~



cornutum Solan. aculeatum, foliis pinnato-pinnatifidi aculeati  
antheris declinatis corneiformibus infima maxima productis  
fina la Mart T. E. 2. p. 25.  
Habitat in Brasilia?  
flores lutei subinaequales

Infoliatum S.