


Solidago

odora. Edw. Richard



Soldado

f



conacea Solidago foliis cuneiformibus conacis integerrimis, corymbis fastigiatis

Habitat in Montserrat In Nyart

Caulis fruticosus. Rami <sup>fastigiatis,</sup> teretes, glabri, inferne dicotylati, cinerei: ramuli

floriferi, axillares, superne angulati.  
Folia frequentia, <sup>ramulorum</sup> alterna, <sup>in pinnis</sup> bipinnatis, <sup>sub pinnatis</sup> basi versus attenuata, subsessile  
obtusissima, submarginata, integerrima, conacea, teretia, avenia, enervata, glaberrima.

Corymbi terminales, supra decompacti, fastigiati. Folioli sub omnibus  
ramificationibus, sensim minoribus

Calyx imbricatus, pauciflorus: squamae lineari lanceolatae, apice coloratae  
laevi.

Corollula radii

Pappus rupestris

Convenit modo florendi cum Solid. graminifolia, conspicienda foliorum ad  
Solid. medicam accidit ideoque huius potius retuli quam vis Pappo  
rupestris a reliquis speciebus huius generis recedit, propterea cum nec habi  
tu nec ex caractere cum nullo alio genere ejusdem ordinis consistat.



Solidago

Habitat in America boreali herb Desfont.  
Caulis erectus, ramosus, rugatus: rami longi ternes

herb no 1

Aster manianus foliis rigidis, floribus parvis umbelliferis Act. philof. no 246.  
pag 400. tab. 16.

Habitat in America septentrionali herb. Desfont.

Caulis levis, glaber. Folia petiolata, pollicaria, superiora sessilia, remota, oblonga, basi attenuata, medio serraturis nonnullis, glabra, margine <sup>inferne</sup> ciliata, acuta, avena. Corymbi superne, simplices, 4 flori. Pedicelli breves. Calyces parvi, obovati, imbricati: Solida oblonga, viridia et villosa apice. Columna ad papam pedicellorum. flosculi radii angustissimi.  
an Solidago an Aster.



Solidago

Habitat in America boreali, herb. Desfont

Caulis erectus, ramosus, glaber, virgatus, subangulatus a folii margine decur  
rente. Folia linearia

habes

arborescens Solidago

Forster

Habitat

Herb. Musci

Rami teretes, flexuosi. Folia petiolata, alterna, pollucana, oblongo subrotunda,  
tenuifove venosa, integerrima. Corymbi laterales, decompositi



*Solidago*

Plum. v. Tab 154

Habitat in Am. merid. herb. tus.

Caulis erectus sulcatus, angulatus, glaber, crassitie penna cygnea. Folia petiolo  
4, alterna, 5-6 pollicaria, elliptico-ovata, serrata, glabris, supra arena, ob  
scurve nervosa, subtus venosa. Corymbi ex alis supremis et apicis, compositi:  
pedicelli subvillosi. Bractea linearis ad basin pedicellorum. Calyx simplex,  
foliola 8-9 lanceolata. Flores radii 4, Pappus villosus. Receptaculum nudum.





Scabra Solidago foliis lineari-lanceolatis scabris integerrimis, pedunculis raris  
corymbosis foliosis.

Habitat in America Septentrionali? Rarum est hodie parvo

Caulis sesquipedes simpliciter villosus scabriusculus striatis teretibus  
folia copiosa alterna sespita <sup>subtili</sup> Trinervis, villosiuscula hypoleucanina  
Pedunculi versus apicem tripollicares alterni, fasciati unguiculati  
flori adpressi foliis numerosis lineantur rari canescentibus. Flores  
magnitudinis fol. variae. Calycis foliola lineana. Pedicelli  
unguiculares etiam foliosis.

Cambrica l. caule simplicissimo pubescente, foliis lanceiformibus lanceolatis  
Lanceolatis serratis pilosiusculis, Legulis elongatis Hort. kew. 3. p. 210  
Virga aurea cambrica, floribus conglobatis Dill. Elth. 413. t. 306. fig. 393.  
Solidago minuta Mill. Dict.  
Solidago cambrica Hudf.  
Habitat in Cambria 7



virga aurea L. caule erecto tereti pubescente superne ramoso, foliis inferioribus  
ellipticis pilosulis serratis, cingulis elongatis Hort. Kew 13. p. 210

multiradicata L. caule villosiusculo, foliis sessilibus lanceolatis, glabris ciliatis: inferioribus apice serratis racemis terminatis, ligulis elongatis numerosis H. Kew. 3. p. 210  
Habitat in Labrador &



minuta L. caule simplicissimo piloso, foliis lanceolatis acutis serratis glabris, racemo  
terminati simplici, legulis elongatis Hort. kew. 3. p. 40

*petiolans* L. caule erecto villoso, foliis ellipticis scabriusculis petiolatis, ligulis elonga-  
tis Hort. Kew. 3. p. 216.

Habitat in Amer. septentr. 2.



bicolor L. caule foliisque ellipticis pilosis: inferioribus serratis, ramis foliolosis,  
foliulis calycinis obtusis Hort. Kew. 3. p. 216.

*Solidago alba* Mill. Det

rigida. l. caule foliisque ovato-oblongis pilosis scabris: Caulinis integerrimis; infimis  
serotinis, ramis floriferis paniculatis, radicibus compactis, ligulis elongatis

Folia oblonga scabra



*Copa* L. caule teri recto, foliis lanceolatis serratis glabris  
ligulis medio-nibus Hort. kew. 3. p. 217

flexicaulis l. caule flexuoso glabro angulato, foliis ovatis acuminatis serratis  
glabris, ~~radicibus~~ ligulis medio cimbis. Hort. Kew. 3. p. 217

Solidago latif. hinc spectat



ambigua L. caule subflexuoso glabro angulato ramoso, foliis oblongo lanceola  
tis dense serratis subtus pilosis, ligulis elongatis Hort. Kew. 3 p. 217.

Habitat.

4

*Senecio S.* caule erecto glabro, foliis caulinis lanceolatis integerrimis glabris margine  
scabris; radicalibus serratis, racemis paniculatis, pedunculis glabris Hort  
New. 3. p. 216.

Habitat in Am. sept. 2



mexicana f. caule obliquo glabro, foliis lanceolatis subaristatis integerrimis undique  
cerviis, racemis paniculatis, pedunculis squamosis glabris, legulis elongatis Hort.  
New. 3. p. 215

Corrigata L: caule erecto teri, foliis lanceolatis canosis integerrimis undique coribus,  
racemis paniculatis ~~canis~~, pedunculis squamosis villosis, ligulis elongatis Hort.  
New. G. p. 215.

mon. hist. 3. p. 124. n. 15.

Habitat in am - sept. 7



\*\* *Racemis erectis*

lanicolata L. caule glabro ramosissimo, foliis lanicolato-linearibus integerrimis trinerviis glabris, corymbis terminalibus; ligulis altitudine difsi Hort. kew. 3. p. 214

*Chrysozona graminifolia* huic pertinet.

*Adora* l. caule erecto pubescente, foliis linearibus canaliculatis integerrimis glabris margine  
fiabris, racemis paniculatis Hort. Kew. 3. p. 214

Virga aurea americana Tarradonis facie et sapore, panicula speciosissima Pluken  
alm. 309. t. 116. fig. 6.

Habitat in Am. sept. 7



semper vivens. S. caule erecto glabro, foliis lineari lanceolatis subaequalibus lobis integer  
rimis margine scabris, racemis paniculatis, pedunculis pelopis Hort. K. 3. p. 214.

viridula L. caule erecto subpubescente, foliis linear-lanceolatis membranaceis basi attenuatis glabris margine scabris: inferioribus subserratis, racemis erectis, ligulis elongatis  
Hort. Vind. 3. p. 213

Solidago integerrima Mill. Dict.

Habitat in am. sept. 24

elliptica. caule erecto glabro, foliis ellipticis cuneatis serratis, racemis paniculatis, ligulis  
mediocribus Hort. Kew. 3. p. 214.

Solidago latifolia Mill. Dict.

Habitat in am. septentr. 4



*Juncea* L. caule erecto-glabro, foliis lanceolatis glabris margine scabris: inferioribus serratis, racemis  
paniculatis Hook. kew. 3. p. 213

Habitat in Am-sept 4

aspera L. caule erecto densi pilos, foliis ovatis subellipticis scaberrimis rugosis serratis  
enerviis, racemis paniculatis secundis Hort. kew. 3. p. 212.

Serga aurea americana aspera foliis brevioribus serratis D. C. Ell. Cat. 411. V. 305. f.  
392.

Habitat in Am. sept. 7

arguta L. caule erecto glabro, foliis glabris argute inaequaliter serratis: caulinis ellipti-  
cis; radicalibus ovato oblongis, racemis paniculatis, legulis elongatis Hort. Kew. 3.

p. 213.

Habitat in Am. sept. 7



nemorali L. Caule erecto tomentoso, foliis caulinis lanceolatis hispida integerrimis,  
radicalibus subcuneiformibus serratis, racemis paniculatis Hort. Kew. 3. p. 213.  
Habitat in Am. sept. 7

albissima L. caule erecto hirsuto, foliis lanceolatis scaberrimis rugosis serratis enerviis, paniculis secundis Hort. kew. 3. p. 213  
Silya aurea nova anglia, rugosis foliis crenatis Dill. Elth. 416. t. 300. p. 396

- α Caule quinquepedali piloso serraturis profundis inaequalibus, racemis divariatis  
Solidago albissima Mill. Dict.
- β caule tripedali hirsuto, serraturis profundis subaequalibus, racemis ascendentibus  
Solidago pilosa Mill. Dict.
- γ caule tripedali villosa, serraturis profundis subaequalibus  
Solidago recurvata Mill. Dict.
- δ caule quinquepedali villosissimo, serraturis magnis, racemis vix divergentibus  
Solidago virginiana Mill. Dict.
- ε caule tripedali villosifuscula, serraturis parvis subaequalibus, racemis divariatis  
Solidago rugosa Mill. Dict.



Cateniflora L. Caule erecto pilosissimo, foliis lanceolatis subtriplicinerviis glabris margine  
scabris: inferioribus subserratis, racemis paniculatis subcylindricis hort. kew. 3. p. 211

vandae caule rubente. vix pilosae et caule viridi piloso



prosera f. caule villoso erecto, foliis lanceolatis serratis triplicinerviis scabris subtus villosis, racis  
missipiciformibus erectis; innuptis nutantibus, legulis abbreviatis Hort. Ker 3. p. 211.  
Habitat in Am. sept. 7

provera S.

*Serotina* L. caule erecto tereti basi, foliis linear lanceolatis glabris margine apicis serratis  
triplinerviis, racemis paniculatis secundis Hort. Kew. 3. p. 211.  
Habitat in Am. septentr. 4



gigantea l. caule erecto glabro, foliis lanceolatis glabris serratis margine scabris, racemis pani-  
culatis, pedunculis hirtis, legulis abbreviatis Hort. kew. 3. p. 211.  
Habitat in Am. sept. 4

reflexa s. caule erecto villoso, foliis lanceolatis subperovatis triplinerviis scabris reflexis, racem  
is paniculatis subsiccundis Hort. Kew. 3. p. 210

Habitat in Amer. Sept. 7

*Racemis fecundis*  
Canadensis. S. caule villoso erecto, foliis lanceolatis serratis triplinerviis scabris, racemis paniculatis recurvis, Ligulis abbreviatis Hort. Kew. 3. p. 210

- a foliis nudis & scabris: serraturis paucis, racemis terminalibus elongatis  
Solidago canadensis Michx.
- b. foliis scabris: serraturis paucis, racemis suboppositis patentibus  
Solidago humilis Mill. Dict.
- V foliis subtus villosis: superioribus integerrimis, racemis elongatis patentibus