Margine altero parum incurvum umbilicus linearis externus in medio seminis, integumen externus membranaceum laeve nitidum intenus tenuiss. ~~semine~~ arctissime adnatum. Corculum supra umbilicum

Spiculo squamoso vellosa ~~squamo subdito~~ ~~ei~~ concava arista Vermi nata

corymbosa

Fuirenia, corymbis axillaribus, terminalibus qq. lato folii lanceolatis elongatis, ~~folii~~ om
~~nibus margine~~ ~~medis~~, spicis ~~brevibus~~ oblongis umbellis compositis spicis
aggregatis oblongis
Habitat in Ind. occidentali v. Rohr no 36.
Gramen altum erectum. Culmo inferne subcompresso superne articulat.
inter folia compresso ~~triquetra~~ altero latere sulcis 2. profun
dis. Glabro, folioso pallide virens. folia spithamae et ultra internodiis long
inferne remota superne ~~confertiora~~ magis approximata
pollicem lata sensim attenuata striata, vix scabra, ciliae
nullae in margine vaginae bipollicares sursum sensim ini
nores internodiis breviores, inferiores glabrae superiores pilosae
ligula ferruginea membranacea, subciliata. Pedunculi axillares
et terminales plerumque gemini alter longior raro terni villosi
vagina 2plo vel 3 longiores erecti. pedunculi partiales terni
~~bifidi~~ cum capitulo sessili in centro. flores oblongi acuti squarro
si villosi cinerascientes. foliola sub ramis cinerariis infimae corym
bo parum longiores
ab umbellata differt folii longis latis, spiculis minoribus copio
~~spa~~ sioribus confertis
Spiculae 5–6 conferti
pedicelli lateralis gemini. ~~flores~~ in centro
sessiles in capitulo in ~~divisoris~~ pedunculorum partialium

tetragon angulis exstantibus

pedicelli villosi

lateralis ~~duae villosae~~ plerum gemini ~~intra vaginas~~ ~~duabus~~ squamis duabus parvis ferrugineis inclusis intermedius solitarius ~~lateral~~