

Spigelia

1. anthelmia l. caule herbaceo, foliis summis quaternis ovato-lanceolatis
2. manlandia l. caule tetragono, foliis omnibus oppositi ovatis

Rh. qu. germen disco insidens. Stigma truncatum leviter concavum.
Receptaculum seminis globosum

Fruticulosa Spigelia caule fruticuloso. foliis ovatis petiolatis summis qua-
ternis ha Mark T. Enc. pag 74

Habitat in Cayenna

Caulis erectus sesquipedalis

non vid.

1. Anthelmia L. caule herbaceo foliis summis quaternis Len-Am acad. 5. p. 133.

7. 2. x Spec. pl. pag. 213. x

Amabaraia brasiliensis Duto planta Martz. bot. 46.

Boacul-paslis Pet. gar. 7. 59. fig. 10

Spegeleia quadrifolia, specie terminalibus Brown. jam. 146. 7. 37

fig. 3.

Habitat in Cayenna Brasilia C.

Caulis erectus, simplicis summi erectus, glaber, basi interdum rami gemini
oppositi. ^{intra ramum, lobis} folia 4 or in apice cauli quorum duo petiolata, duo
sessilia, ^{in ramis majoribus} omnia ovato-lanceolata attenuata, tenera, nervosa
subtus pallidiora, glabra, integerrima tri-pollicaria. folia
caulina saepe alia duo opposita. Ramus ex ala pagula folii
caulini solitarius terminatus foliis ~~quod~~ ut in caule. Flores
subspicati secundi. Racemus terminalis solitarius simplex. Capsula
globosa ~~in~~ punctis minutis exasperata

anthelmia caule herbaceo foliis summis quaternis ovato lanceolatis

2 manlandia L. caule tetragono foliis omnibus oppositis Lin. Mant. 338. Flora
in Act. Acad. 3. 1771. p. 151. t. 1.

Peniclymeni virginiani flore coriineo planta manlandia, fructu
erecta, foliis conjugatis Raj. deindr. 32. Cat. bot. carol. 2. p. 40. t. 1.

^{78.}
Lonicera manlandia, foliis ovato oblongis acuminatis distinctis
sesquialteris Lin. Sp. pl. pag. 249

Habitat in Virginia, ~~manlandia~~ Carolina &

Rami tetragoni glabri. Folia sessilia ovata acuminata, sesquialteri
canà nervosa glabra. Racemus terminalis simplex, flores
secundi multo majores quam in precedente inferiori pedicello
8. superiores sessiles

manlandia L. caule tetragono foliis ovatis omnibus oppositis ovatis