

Spilanthus

1. usens L. foliis lanceolatis integerrimis, caule repente

2. pseudoacmella L. foliis lanceolatis serratis, caule erecto.

3. acmella L. foliis ovatis serrato-dentatis caule erecto

4. ^{parviflorus} ~~triplex~~ foliis alternis deltoideis petiolatis dentatis ^{repulatis}, caule panicu

5. ^{lato} latifolia L. foliis subcordatis dentatis, caule erecto

6. atrombens L. foliis ovatis crenato-denticulatis, petioli basi subciliatis, floribus

7. ^{globosis} oleracea L. foliis subcordatis serratis caule procumbente

8. ^{acris} insipida L. foliis obovatis subdentatis pappulibus

9. filiformis L. foliis oblongis obscure crenatis glabris, pedunculis filiformibus caule

10. ^{decumbente} repens L. foliis ovatis crenatis cauleque repente subulosis floribus radiatis

11. julivaria L. foliis ovatis subintegerrimis, cauleque obliquo flexuoso paniculato

12. ³ ~~14~~ indiginosa L. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis terminalibus, floribus radiatis

parviflorus Spilanthes foliis petiolatis lanceolatis argute serratis; floribus radia-
tis, caule erecto.

Habitat in Mont.errat. de Ryan
Caulis herbaceus, erectus, teres, a piliis raris labris spiculis
Folia petiolata, opposita, bipollicaria vel parum ultra, lanceolata
attenuata, obtusiuscula, basi acutiora, serrata, venosa, subtin-
nervata, glabra.

Petioles unguiculares, utraque utraque ciliati.
Peduncululi primarii terminales, ^{at} rami utraque utraque ultimus
et crescens in dichotomia ramorum, solitarii, foliiformes, bipollicari
pollicares, uni flori. Flores ovati, magnitudine pisi

Calyx simplex: folioli ovatis
Corolla rotunda calyce parum longior
(Valde affinis Sp. pseudovaimella et flore radiati)

No 22.

Devoniata ^{Silvest}

23 *Ocipitula martinicensis*

25 *Erythroxylon squamatum*

acris Spelanthus foliis oppositis ovatis utrinque acutis dentibus alatis, caule ramoso.

Habitat in India occidentali ab V. Rohr

Caulis herbaceus, erectus, glaber, striatus, ramosus.

Folia opposita, petiolata, pollicaria, ovata, utraque glabra acuta, remote denticulata. Denticulis apice crispioribus, albidis; glabra, obscure venosa.

Petioles unguiculares. Foliola duo breviora in axillis.

Peduncululi ex apice ramorum, elongati, ^{angustissimi} sursum versus sensim crispioris, apice squamis duabus distantibus, linearibus; ope lentis pubescentes. Capitula magnitudine perosi.

bracteae calycinae lineari lanceolata, obtusiuscula.

Corolla radiis nullis

(Urticae ore ~~hab.~~ ab V. Rohr)

Pseudogonum musci Splachanthus

Boissier

Habitat

herb musci

Cauli angulatus, glaber. Sola petiolata, obovata, nervosa, arena, pollicana,
super glabra, subtus pallidiora, villosa. Pedunculi ex apice ramorum

1. *Urens Spilanthes* foliis lanceolatis integerrimis, caule ^{repente} ~~prostrato~~ L. S. V. pag. 731 Falcig. Amer.
pag. 214. tab. 126 fig. 1. plant. sel. pag. 275*

2. *Tantolima pyrethri* sapore humifuso Plum. spec. 10.

7+ Habitat in campis arenosis Carthageno 4

Caules teretes, glabri, ramosi, repentes. folia ^{opposita} angustis lanceolata, acuta, integerrima, utrinque glabra, subtus pallidiora, triplicinervia, sesquipollucaria Falcig. C. C.

¶ *Peratocephalus* foliis lanceolatis serratis sapore ferrido Vaill. ait. bot. nos

Cotula Spilanthes foliis oppositis lanceolatis integerrimis trinerviis Lin. Mant. 116.

Cotula pyrethraea foliis oppositis ovatis crenatis petiolatis Lin. Mant. 116. * hujus generis est.

2 Pseudoacmella Spilanthes foliis lanceolatis serratis, caule erecto L. Mart. 475 * L. V. pag
731.

Bidens zeylanica, flore luteo, melisso folio, C. mella dicta Seb. Thes. t. p. 19. tab.

10. 11.
Vesvesina pseudoacmella foliis lanceolatis serratis, pedunculis flore longioribus
C. Flor. zegl. * Spec. pl. 1270.

Habitat in Zeylona.

Caulis erectus, teres, fusus, rigidulus, scaber, pilis albis, sparsis. Rami oppositi

Folia opposita, petiolata, ex tripulata, ovata, trinervata, venosa, necnon
profunde serrata, opaca. Petioli subcirculari, vix pubescentes.

Pedunculi e dichotomia cauli, solitarii, uniflori, teretes, erecti, nudi
longi. Flor. una cum calyce, ovatus, luteus; a byque radio; Corollu
li 5fidis. Calyx arctus foliolis 4 fr. extensis paulo brevioribus
L. Mart. l. c.

non vid.

uliginosa L. foliis ovato lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis termi-
nalibus, floribus radiatis Sw. prod. p. 116
Habitat in Famaea O

Definit quod re inter amos

albus

8 Filiformis *Splachnis* foliis oblongis ^{obtusis} crenatis glabris, pedunculis filiformibus ^{decumbentibus} ~~caulis~~
Habitat in Brasilia Thauri, Commerçon.

Caulis decumbens glaber uti reliqua planta floratus, tener, superne subramosus.

Folia opposita, petiolata, oblonga, trinervi, crenata ^{obtusis} crenata, obtusa.

In flore sicentia ut in reliquis. Pedunculus filiformis, Flores radiati parvi.

Calycis foliola ovato-lanceolata. an variet

An varietas ~~infructu~~ ^{infructu} per frequentis

9 repens *Spilanthes foliis ovatis crenatis caule que repente villosi sub petolis floribus radiata*

^{tu}
Habitat in Insula Granio

Caules ^{inferne} repens, demum ascendens; striatus, sub foliis prope hinc plus paululum pilis
superne raris uno alterove. Folia petiolata, opposita, ovata, utrinque crenis 4-6.

Strobilus ^{superior} subtus vasis villosa; Pediculi in divisa caulis vel terminales
cum ramulis ^{superioribus} extensius exsertente sic etiam laterales, elongati, solitarii, uni flori.
Flores minores quam in reliquis ovati, radiati. Siliola calycina ovato-conica
ta. Semina triquetra

10 *Salicaria* *Spilanthis* foliis ovatis subintegerrimis, caule obliquo flexuoso paniculato Mexico
vix in Pom. Gött. 1783. Tab. 1. 75. V. pag. 731.

Habitat. in Peru ☉

Caulis sulcatus quadr. Rami apice pubescentes
Folia opposita, breve petiolata, ovata, integerrima vel obsolete serrata, trinervia
glabra, margine sic abro pellucida et ultra. Pedunculi terminalis et exdivi
sionibus ramorum, solitarii, uniflori, elongati. Flores primum glo
si demum ovati. Calycis foliola linearia

Spilanthis alba foliis ovatis subintegris: imis alternis summis oppositis, caule
paniculato L'Herit. Supp. nov. p. 7. Tab. 4.

radicans Spilanthes

Spilanthes radicans Jacq. coll. 3. pag. 229
Habitat in America meridionali ☉

Tota planta acris. Radix ramosa. Caulis unicus teres; crassitie calami, vix
bis, tripedali, et oculo armato. Pili pauci sparsi breviter hirsutuli; pani-
culatus es actus, exapertus inferne ramuli carnosus in infimo radice
subeunter. Rami alterni et oppositi rami terni. Folia omnia opposita
indidem verna ad ramos ternata, ovata acuta obsolete serrata venosa
subaspera, ad lentem partem pubescentia 3 pollicaria. Pedunculi unis-
si folii. Flores cernui calyce villosa ciliato. Corollulae albi. Semina alba
ciliis albi. Palea pallida, pellucida Jacq.

non vid.

pyrethroni *Spilanthes foliis ovatis crenatis*

Colula pyrethronia foliis oppositis ovatis crenatis Lin. Mant.

noy 116

2 *Aemella Spilanthes foliis ovatis serrato-dentatis, caule erecto*
2 *Senecio Indis orientalis crismi majoris folio profunde crenato Pluk. alm. 343.*
tab. 315. fig. 2.

1 *Chrysanthemum Bidens* f. *Bidens zeylanica*, flore luteo, lamii folio, *Aemella*
Duta. Breyer. prod. 3. t. 40

Pentaccephalus Ballotes folio Vaull. ad. 600.

Bidens zeylanica flore luteo, melisso folio, *Aemella* Duta Seb. mus. 1. p. 19.
tab. 9. 10.

~~Verbesina~~

A. B. Diana Rumph. Amb. 6. p. 145. t. 65.

Verbesina foliis oppositis, lanceolato-ovatis petiolatis serratis, pedunculis
uni floris dichotomis caulis L. Fl. Zeyl. 309 * Mart. Med. 406.

Verbesina Aemella Spec. pl. 1271.

Spilanthes Aemella foliis ovatis serratis, caule erecto, floribus radice.
mant. 475. S. V. pag. 731.

Habitat in Zeylona

Caulis et tota planta glaber, erectus fruticulus, dichotomus. Sola petiolata
superne
folium d. lateri *superne* *opposita, ovata, grosse serrata, acuta, trinervia. Calyx pentaphyllus*
Pedunculis diam. *foliis ovatis. Radius in meo speci minibus attamen spontanei. Semina*
cationibus ramor. *foliolis ovatis. Radius in meo speci minibus attamen spontanei. Semina*
uniflori solitarianscipitia, angulis ciliata, biseriata.
Josqui polliciar *Semini pseudoaemella, sed magis magis ramosa et multiflora, diplo*
fulis praecipue 4fidis, rarius immixtis 2fidis Lin.

4 *Atriplicifolia Spilanthes foliis alternis deltoideis dentatis petiolatis stipulatis, caule panicula*
to L. S. V. pag. 731.

*Bidens atriplicifolia foliis alt. Am. ac id. 4. p. 329 * Spec. pl. p. 1160.*

Habitat in America Meridionali.

Caulis levis, herbaceus, paniculatus. Folia deltoidea (Chenopodii) tenuia, denta-
ta, nuda, in petiolo desinentia, alterna. Stipulae pares, reniformes in partem
axillarum. Flores solitarii, terminales, oblongo-ovati, absque radio. Paleae
longitudine flosculorum apice villosae. Stemma tetragona. L. Am. l. c.

5 *Latifolia* *Spyranthus* foliis subcordatis dentatis, caule erecto
Habitat in Brasilia

Caulis semipedalis, erectus, striatus. ^{Sesquipedalis} folia opposita, petiolata, ^{sub}remota cordata sive
lanceolata ^{striatus} dentata, glabra, trinervia, subtus pallida. Petiolus apice dilatatus
Peduncululus erectus, terminalis, uniflorus. Flores magnitudine nucis Conyi
ovati

Ab ~~rombens~~ *Spilanthis* foliis ovatis crenis denticulatis, ^{petiolis basi subrotatis} lobibus globosis.

Habitat in Peru?

Caulis crassitie pennis an pennis, teres, striatus, erectus, superne ramosus. Rami
oppositi patentes. Folia opposita, petiolata, peltata, basi subtransversis.
glaberrima, oleosa, trinerviis, ^{subtarpulis pinnatis in venis} crenatis, crenis apice denticulo minuto.
Petioli marginati, subtus striati basi subciliati. Pedunculi axillares
et terminales uniflori. Flores globosi, Calyxes atropurpurei uti anthera

Quam flores non ovati an igitur potius *Bidens*

6 *Aletrisca Spilanthes* foliis subcordatis ^{caule procumbente} serrulatis petiolatis L. L. V. p. 736. * Jacq. hort. 2. t. 135.
Bidens Arnelloides Berg: Act. Holm. 1768 p. 247. t. 7.

Habitat.

Caule procumbentes, pedales, teretes, striati. Folia subcordata, obtusa, serrata
petiolata, opposita. Flores solitarii longis petiolati omnino lutei. L. L. V. c.

~~*Colula pyrethrae* foliis oppositis ovatis crenatis petiolatis Lin. mant. 116. *~~

7 infipida *Spilanthes folius obovatis subdentatis sessilibus* Jacq. Amer. 215. pl. fil. pag. 276* L.V
731.

Habitat Haabano in rupibus maritimis. 5

Caulis fruticosus teres, ramosus, procumbens. ^{sessifolia, opposita, sesquipollicaria}
Folia obovata, basi attenuata, glaberrima
crenato-dentata, acuminata, sapore salso, minime urcas. Pedunculi et flores
in sp. uranti Jacq. l. 6.

non vid.

dedt { Inelanthus a bonaria
Fuj { 1 minuta
2. caule repente
3. ara gle de franca 1-2
repens Michaux dedt Richard