

Spinifex

1. Squarrosus L. rachide folisque fasciculorum rigidis pungentibus glabris
2. inermis L. rachide folisque fasciculorum flexilibus inermibus  
hirsutis

Squamofus ~~Spuniflor~~ <sup>mont. 3004</sup> Suppl. pag 432. S. V. pag. 903.

Flu mulla Rheed. mal. 12. p. 75.

Anudo arborescens tabaxifera Mont. hist. 3. p. 219. f. 8. v. P.

Gramen dactylon pumilum malabaricum, spicis colicibus in  
adutam spinam terminatis Rheed. pag. 112

Stipa spunifera capitulorum bracteis fasciculatis maximis  
involutis mucronatis, floscules matris lin. mant. p. 34

Lin. Mant. 3004

Rachide foliisque

fasciculorum

rigidis pungentibus,

glabris

Habitat in India arenosis montibus <sup>glabri</sup>

Palmi maxime crassitie digiti glauci, articulat, ad genicula  
acerni foliorum, laxis, fasci. <sup>glabra</sup> Colica convoluta, recurvato  
patentia, rigida apice spinesca, palmanam vaginam ampliatam  
strenuatis. Ligula lanata. fasciculi tres sive quatuor, termi-  
nales et plumbis fasciculis compositi; propriis fasciculis  
et folioli (ubique vaginam) aliquot lanceolatis, brevioribus  
inter quo spicis squamifloris. Spica singula digitali. Rachis  
triquetra in spinam desinente. Flores 5 alterni, laterali-  
bus sessilibus remotis. Florum tubo oblongo latere rachin  
respiciente.

occi Dentali P

Squarrosus Spinifera rachide foliis que fasciculorum rigidis pungentibus glabris  
Spinifera Squarrosus Lin Syst. V. p. 903.

2 *Tiliifolia* G. foliis cordato ovatis acuminatis glandulose serratis racemis Terminalibus pubescentibus

*Gouania Tiliifolia* Lamour.

Habitat in Insula Bourbonia f. Quiseu

Rami purpurascens flexuosi, Vertices etate glabri. Folia petiolata  
albescens, Cate ovata oblique nervosa, scaberrima, venis obscure  
la, obtuse remotissime serrata subtus punctum fissum ad apicem  
lingula serratur, basi sine parvo excipio obtuse acuminata obtuse  
bipollicaria et ultra. Petioli pollicaris pilosi. Flores microp.  
Pedunculis palmatis villosis. <sup>in hirsutis</sup> Flores sparsi copiosi. Corchus inter  
pedunculum et petiolum axillaris nupurascens. Fructus  
obovatus glaber magnitudinis <sup>pepi</sup>

an folia glabra

inermis Spini flex rachide folisque <sup>olis fasciculatis flexilibus</sup> inermibus herpatis  
axalium inermis Loefl. quod n.

Habitat.

Geniculi inferne approximati, foliis plerumque articuli superne altero latere con-  
<sup>recti, altero plano herpatis</sup>  
folia ad genicula coarctata, involuta pelis longis mollebus vestita,  
pedalia et ultra. Vagina fratata, glabro. Ligula barbata.

Clor Spica cum foliis in fasciculis <sup>herpatis</sup> terminalibus <sup>bus plantis</sup> collectis: folia subulata,  
Spica longioribus flexilibus. Spica fratata digitalis. Rachis triquetra  
herpata iniana in subulata in Spina flexilem non pungen-  
tem desinent. Clor plures alterni sessile quam in Squarrosi  
artidit 12. confertis superne fer imbricati

Calycis valvula fratata, marginis pelis copiosis ciliata, biflori: Clor

<sup>alter masculus</sup>  
<sup>alter hermaphroditus</sup>  
Corolla valvula canaliculata acuminata

(Species omnino Sp. Squarrosi ut dentata villositas, longitudine  
foliorum et Rachide non Sp. flexili inermis, eadem ferè est)