

Spina

Spina. foliis lanceolatis serratis, umbellis lateralibus terminalibusque pedunculatis.

Habitat in Anfula francico Comnes. herb. Guelf.

Rami glabri, teretes. Solia petiolata, pollicaria, glabra, in aqua liber serrata, basi versus integerrima, utrinque acuta, subtus pallidiora, subtus luteo venosa. Umbella multiflora.

callosa. foliis lanceolatis acutis serratis subvillosis, panicula decompota
subfastigiata Thunb. fl. jap. p. 207 t. v. p. 471.

Spina japonica fruticosa, caule pubescente foliis lanceolatis acutis serratis
natis, corymbo terminali composito Lin. Suppl. pag. 262.

Habitat in Japonia herb. Royeni

Caules fruticosi. Rami alterni subtus villosi presumpente
folia petiolata alterna elliptica acuta inaequaliter serrata
nervis profertem villosa. Petiolus basi extri calli utraque
glabra nitente. Panicula terminali supra decompota
flores rubri presumpente et presumpente villosi Thunb
folia subsessilia, glabra, lanceolata, subaequaliter serrata, basi
versus integerrima. Corymbi terminales compositi.

Cantonensis Spinesa foliis lanceolatis apice mucro; umbellis pedunculatis Vermic
natis Lous-fl. Cochin. pag. 322.

Habitat Cantone Sinasum. ?

Affinis Spur. mucro Thunb. Caulis fruticosus quadripedalis erectus. - Folia
ad apicem serrata petiolata alterna. Flores albi. P

longata S. foliis lanceolatis integerrimis subsplibus, racemis compositis
Linn. Mant. 244. x S. V. Pall. se. ins. tab. 23
Spiraea altaicensis Laxm. in act. petrop. 1770. p. 555. t. 29. fig. 3.

Habitat in Siberia

Rami teretes glabri uti tota planta. Folia plura est
ad eam gemma demum in ramo elongato alterna
remota subsplibus simpliciter obtuse te venosa in
tegemina obtusa cum ^{multis} ^{interioribus} ^{simpliciter} glanduliferis
bipollicari racemi ^{et} ^{supremis} axillis vel
apice ~~per~~ pedunculati multiflori flores gl.

— cuneato lanceolatis integerrimis subsplibus
racemis simplicibus compositisque

Salicifolia foliis oblongis serratis glabris, ^{obtusis} racemis de eorum proptis Lin. 1.

V. p.
Spiraea theophrasti forte Clus. hist. 1. p. 100.

Tridax sicut ut foliis serratis salicinis Bauh. pin. 475

Spiraea salicis folio longiore serrato, floribus rubris.

o carnosa petalis amm. ruth. 265

Spiraea salicifolia foliis lanceolatis obtusis serratis
carnosis ramis luteis antibus nudis, floribus duplicato racemosis Lin. 1. V. pag
foliis lanceolatis nudis, floribus duplicato racemosis Lin. 1. V. pag
racemis subspica 471. Pall. fl. ross. 1. p. 36. tab. 21. 22

13
tis paniculata foliis lanceolatis racemis paniculatis divari
catis, petalis albi cortice ramorum rubro

Spiraea ^{foliis lanceolatis acute serratis, floribus}
Habitat in Siberia, Tataria ^{caulis triticofo} Mill. Diet. ii. 171. 172
^{B. v. in America boreali} 257. fig. 2

Tridax ^{tripedalis} vel aliorum rami teretes glabri

~~nutans~~ ^{brachy} ~~scandens~~ folia petiolata glabra inaequali
ter serrata sesqui pollicaria peritani apice subglobo
Dilopi. Racemus terminalis ^{primus subspicatus} in compositis
~~nutans~~. Calyx citi pedicelli glabres Stamina com
nam longiora

V. latifolia foliis ovato oblongis, racemis paniculatis, petalis
albis corollae rororum rufescente

tomentosa L. foliis oblongis inaequaliter serratis subtus tomentosis
racemis compositis
ultima pentacarpos, integris serratis foliis parvis subtus
unicaris, virginiana Plukh. Alm. 393. & 321. fig. 5.

~~Spirea~~ ~~Spirea~~ ~~Dulcis~~
Spirea tomentosa foliis lanceolatis inaequaliter serratis
subtus tomentosis, floribus duplicato micropis
Lin. Sp. pl. pag. 701.

Habitat in Philadelphia &
Rami teretes tomentosi. Folia breviter petiolata supra densius
pube praedita venis lineata. ^{racemus raris subquatus} calyces tomentosi. flores
parvi. flores rubri

opuli folia l. foliis lobatis serratis, corymbis Verminalibus Lin. P. V.

Euonymus Virginiana, rubri folio, capulis elegantes bulla
Hort. Comm. hort. 1. p. 169. T. 27.

Habitat in Virginia, Canada &

Rami teretes glabri cortice fusco. ^{ovata} ~~folia~~ ^{petiolata} ~~triloba~~ ^{polluciana et ultra} triloba inaequaliter obtuse serrata, obtusa, utraque
glabra subtus glauca viridi demum siccitate venos. pedunculii
terminales capillares in corymbo hemisphaerico prin-
cipii fastigiat. bractea ferrugines lineares

— staminibus corolla longioribus

Antiloba L. foliis lobatis crenatis, umbellis terminalibus Lin Mant-244. y

L. V. pag 472.

Sperma ramosissima, parvo subrotundo opulifolio Amm ruthm
p. 271.

Habitat in Sibiriâ &

Frutex. Ram. teres. Folia petiolata, subrotunda obtu-
salvici. Pedicelli numerosi aequales uniflori. Stami-
na corollis breviora

staminibus corolla brevioribus

non vidi

betulifolia Spinea foliis lato ovatis serratis, corymbis terminalibus compositis flosculis
gratis Pall. fl. Ross. 1. p. 46. 16.

Spinea foliis ovatis crenatis Gmel. fl. Sib. 3. p. 109. n. 40.

Habitat ad flum. Lenam 4

foliis suborbiculatis, brevissime petiolatis, obtusa, inaequa
lites serrata, glaberrima.

non vid.

incisa ^{ipartita} P. foliis ovatis inciso-^{ipartita} serratis, umbellis terminalibus Thurb. fl.
pag. p. 217. l. v. pag. 472.

Habitat in Taponia t

Caules fruticosi erecti ramosi summi. Rami alterni rami
ei filiformes capillares flexuosi unedi glabri. Folium
petiolata acuta subtus pallida villosa unguiculata
petiolus capillaris, folio quadruplo brevior umbella sim-
plex. Pediculi cincti 12. unguiculati. Corolla albi-
ca Thurb

argentea L. foliis cuneiformibus sericeis lineatis apice serratis subplicatis,
racemis compositis Lin. Suppl. p. 261. & S. V. p. 472.

Habitat in nova Granada;

Inter. Ramis striatis erectis ramulis brevibus. Folia petiolo
+ canaliculata cuneiformia lineata apice serrata
utrinque albo sericea. Racemi terminales. flori-
minores cymae & reliqua germina villosa

Thalictrum descurva foliis oblongis lobatis, umbellis sesquilevis Pall. fl. Ross. 1. p.

Tab. 10.

Descurva foliis variis per fasciculos congestis Ann. Agr. rith. p. 100. n. 267.

Descurva aquilegifolia Pall. A. 3. app. p. 734. no 94. Tab. P. fig. 3.

Habitat in rupibus Dauno;

Fruticosa s. venata. Ramis rectis; testaceo lutescente, epidermide rimosa.

Folia supra, saepe congesta, glabra, glauca, ovato-lanceiformia, subtilissime

trinerviâ, inferiora subintegra saepe oblonga, plurimâ et horum latiora

4-loba lobis obtusis, Umbella ad apicem ramorum, 4-12 flora.

non vidi

crenata L. foliis oblongis sculis apice serratis, corymbis lateralibus Lin
Spec. pl. pag. 701.

Spersea Hispanica, hyperici folio crenato Barr. u. 564.

Spersea hyperici folio ampliore, modo integro modo denta
to Anam. meth. 270.

Habitat in Sicilia, Hispania & Italia Gallia &
Francia Caxus, ramis ramulosis ~~ternibus~~ ~~ternibus~~ glabris
foliis petiolo^{ta} unguiculata dextra vel sequipollicaris un
quem lato oblonga pet. basi acuta glabro int. egerrime
vel apice serrata. Corymbi ex apice ramorum albico pici
sua totum fructum nigrum reddentes. Peduncululi capilla
ri.

alpina *Spinea foliis lanceolatis sessilibus serrulatis glabris, corymbis terminalibus*
Pall. fl. Ross. 1. p. sub. 20.

Habitat in alpibus Sibira 5

affinis sp: venata differt foliis non lanuginis, glaberrimis tenerris basi ve-
sus attenuatis non petiolatis, pedunculis longioribus; capsulis majoribus
fructu saepe bicubitali cortice fuso. folia 3-5. fasciculata congesta vel
alterna, basi valde attenuata subtilissime serrulata vel ciliata
Corymbi terminales, subglobosi.

Chamodrifolia L. foliis ovatis inciso-fenatis glabris, umbellis pedunculatis
Linn. S. V. Jacq. hort. 27. 140.

Sperda Chamodrifolia Amm. neth. 289.

~~Habitat in Sibiria & alibi~~

Sperda ulmifolia Scopoli flora Carn. in 600. tab. 22.

Habitat in Sibiria et Carnioli ⁵ ^{ramis ramulosis} ^{venibus}
Caulis fruticosus ^{offic.} ramis flexuosis, purpurascens. Solia vix
pollicana a medio ad apicem serrata, breviter petiolata
alterna, acuta vel obtusa basi saepe acutius subtus pallida
umbello multiflora

aliud specimen dicitur a Thonin (ex Insula Francis capite calami)
Rami pro pedunculis calycibus purpurascens

— oblongis

hymeniifolia L. foliis obovatis integerrimis, umbellis sessilibus. Len. L. V

Prinosylvestri affinis canadensis Bauh. pin. 517. Plukn.
alm. 300. t. 210. fig. 5.

Habitat in Canada

Rami teretes utriusque tota planta glabra. Folia subsessilia
unguiculata apice obscure indentata, venia subtus
nallidiora obscure serrata venosa. Pedunculi filiformes polli-
cari 2-5 ex eadem ac plura foliis parva ciliata
ti uniflori. Calycis foliola ovata.

integerrimis apiceque subindentato

— lateralibus

Sorbifolia L. foliis pennatis folioli uniformibus serratis, caule fruticoso, floribus paniculatis. Lin. S. V.

Syringa sorbifolia tenuiter crenato, floribus in thyrso albis
amm. nith. 264.

Syringa foliis pennatis Lin. Am acad. 2. p. 3528

Habitat in Sibiria uliginosis

Caulis pedalis et ultra glaberrimus. Folia petiolata
alterna pennata cum impari supra spithamea vel ultra
demum. Foliola opposita sessilia ovato-lanceolata
obtusata inaequaliter serrata, acuta utroque. Nervis glabris
supra leviter per undam nervos lineatis subtus pallidioribus
Præterius terminali pedali decompositis, pedunculis
et pedunculi leviter pubescentes. bractea linearis, pedicelli
longiores serrulati subgladulosi. Stamina corolla longiora

Decompositi

ovato-lanceolatis, raris

Aconitum L. foliis supra decompisitis, spicis paniculatis, floribus divinis
Linn. 1. v.

Barba capra Cam. hort. 26. 1. 2.

Barba capra floribus oblongis Bauh. pin. 163.

Habitat in Austria, Alverno montanis + glabra

Rami sulcati angulati glabri. Folia petiolata
suprema minus composita, folia bipinnata. foliola
petiolata opposita basi inaequaliter inciso serrata
attenuata tenera nervosa venosa. Spicis racemosis laxis
tri pollicariis in floribus compositis parvis

Filipendula L. foliis interrupte pennatis: foliolis linear-lanceolatis inter-
rupte serratis glaberrimis, floribus cymosis *lin. suppl. p. 262. P. V.*

P. 472

Filipendula Can. *epit. 600*

Filipendula *virens* *Bauh. pin. 163*

Spongia filipendula foliis pennatis: foliolis uniformibus serratis, caule
herbaceo, floribus cymosis *lin. spec. pl. p. 702. Fl. Dan. tab. 635*

B. Filipendula minor *Bauh. prod. 85. pin. 167*

Habitat in Europa &

Amplex

Caulis erectus sesqui-pedali vel parum ultra: teris glaber
striatus folia petiolata ^{resiliens} remota pennata cum impar
circiter 12. pinnis albis lanceolatis inciso serratis
terminali alternis minoribus terminali trifida. Petiol
auriculati auriculis semiovatis serratis utriusque cyma
terminalis pedunculis parvis 3-5 per bifida
flores racemosi alterni stamina longitudine corollae

ulmana L. foliis interrupte pennatis: foliolis ovatis bifurcatis subtus canis
floribus cymosis Lin. Suppl. p. 262. S. V. p. 472

Regina prati God. perst. 57.

Barba capra floribus compactis Bauh. pin. 164

Spina ulmana foliis pennatis: impari majore lobato, floribus cymo-
sis Lin. Sp. pl. p. 702. fl. Dan. Tab. 547.

Habitat in Europa pascuis pratis uliginosis, umbrosis &

Caulis erectus simpliciter purpurascens, sulcatus angulatus
glaber. Folia remota pinnata ~~foliis pinnatis cum un-~~ ^{perist. 57.}

pinnis foliola opposita sessilia supra glabra lineata, acuta
terminalis petioli auriculati auriculis incisis. Cyma si- g. radiata
infra ramis pedunculorum reflexo divaricati demum dichotomi
pedunculi, pedicelli et calyces tenuissime villosi.

Lobata L. (palmata). foliis pennatis impari lateralibusque lobatis bifematis,
floribus cymosis. Lin. Suppl. p. 472. ²⁶² N. p. 472. *
Spiraea lobata. Gleditsch. Hort. 1. p. 30. V. P. P.

~~Habitat in Sibiria &~~

Spiraea foliis impari majore multifido Gmel. Sib. 3. p. 192.

Spiraea palmata Pall. D. 3. p. 735. V. G. fig. 1. Syst. veg. edit. 13.

Habitat in Sibiria & Finlandia

Caulis altus fere stratus glaber folia ^{magna} petiolata
remota pennata. Foliole petiolata ^{interna sessile, minima} opposita
~~terminale maximum~~ utraque glabra venis pinnatis venosa lateralibus 3-5
terminale maximum ^{erecta} septemlobatum lobis lanceolatis
acutis Cyma erecta pedali pedunculi 7-9 inaequali
rami ultimi dichotomi flos sessile induratum
pedunculi angulati uti calyces glabri flores purpurei
Folia radicalia pennata, pedalia: foliola subsessile 5-que part-
to, auriculata lacinis lanceolatis serratis infima infida indurata
alterno semum squamula foliaceo remoto herb. de f.
liberque glabro glabro

Camtschatica Spissa herbaea, foliis simpliciter palmatis petiolis appendiculatis
caule hispido floribus cymosis Pall. fl. Ross. 1. p. Tab. 20.

ulmana fructibus hispido Kraschenin. camtsch. 1. p. 202

Spissa foliis multifidis angulatis, fructibus rectis hispido, petiolis appendi-
culatis Gmel. fl. sib. 3. p. 142. n. 55.

Habitat in Kamtschatica et America septentrionali transsylvatica

Caules 2-3. ^{subducenti, pilosi} ergyales. folia radicalia amplissima 3 pollicares pedem lata
subtus pilosa albida, quinqueloba. lobis acutis duplicato serratis.
petioli vespis foliis stipulis aliquot minutis: superiora caulium triloba
summa hasta vel lata. stipulae lanicolatae vel semiorbatae.
Cyma terminalis. Flores ulmani majores.

palmata L. foliis palmatis serratis; panicula supradecomposita Thunb
fl. par. p. 212. S.V. p. 472.

Habitat in Japonia

Caule herbaceo erecto striato, totum glabrum. Folia petiolata
uni-5que lobata vel 7loba glabra subtus pallida venoso reti-
culata palmata. Lobi oblongi acuminati dentate dupli-
cato serrati. Petioli striati folio quadruplo brevior. Flores
terminales rubri vel albi Thunb.

non vidi

Trifoliata L. foliis ternatis serratis subequalibus, floribus subnunciatati
L. V. Mill. u. 4. 256.

Ulmanâ major Trifolia, flore amplo pentapetalo virginiana Pluken
alm. 393. 4. 236. fig. 5.

Habitat in Virginia, Canada'

Caulis tenuis simplex pedalis caepe glaber inferne teres
superne angulatus pilis purpurescens. ^{brevis} Collea petiolata
alterna remota. Foliola petiolata oblonga attenuata
utroque acuta inaequaliter acuta serrata utroque
glabra nervosa venosa, pollicaria intermedium
nonum longior. pedunculi axillares ^{solitarii} filiformes
glabri longitudine folii saepe uniflori ^{supra} medietate
bracteati Calyx campanulatus pubescens petala
alba majora quam in reliquis

les- tres vel
plures

pedunculi subuniflori

de inflorescentia adhuc inquirenda

~~Eugenia~~