

Spondias

1. monbin L. foliis pennatis: folioli oblongis obtusis, petiolo communi compresso
2. myrobalani L. folioli lanceolatis acuminatis, petiolo communi tereti

Cytherea Spondias

Spondias Cytherea La Mark.

Habitat in India orientali herb. Fus.

Folia pennata cum impari, 7 pinnis, pediculis, alterna. Soliola petiolata,
inferior alterna, superior opposita, 3-4 pollicaria, interiora minor.

Glabra, canaliculata, attenuata, remote acute serrata, subtus transversim
nervosa, lateribus more generis

amara Spreng. rar

Bot. malab. 1. tab. 50

Habitat in insula Borneo

Rami crassi. Folia pennata: foliola ^{netolata} 5-6 pollucaria, opposita, elliptica,
acuminata, acuta, glaberrima, utraque & nervo resp. nervo, subtus
venosa, integerrima, lateribus aequalibus. Pedunculus terminalis, erectus,
crassitie pennae aequus. Flores in racemo compacto, sessiles, aggregati;
rami patentes. Pedicelli glabri. Calycis fructiferi unicolati, sessiles, brev.
calyculo cincti.

Spondiodes

Habitat alta in insula francie herb. Fus. 4

Rami teretes, glabri, apice submentosi. Folia superne, fruticosa, pennata cum pari, 5 paja, alterna. Foliola opposita, bipollicaria, interiora minor, oblonga, attenuata, integerrima, utrinque glabra, altero latere parum angustiora, altero basi obliqua, obscura venosa. Petioli infra foliola teretes, dein utrinque margine elevato canaliculati. Peduncululi ad apicem ramorum, plures, sparsi, approximati, subarcei, sesqui pollicares, post caput florum tuberculati.

Calyx minimus, 4 lobus. Pet. 4 oblonga, canaliculata, ungue lato. Stamina 0 uti petala disco hypogynis inserta. Anthera subrotunda. Filamenta brevia, cum petalis alternantia. Germen superum. Stylus 0. Stigmata 3. Fusca

1. *Mombin* *Spondias* foliis pennatis foliolis oblongis obtusis petiolo communi compresso

Myrobalanus minor folio fraxini alato, fructu purpureo osculo magno fibroso Sloan hist. 2. p. 126. t. 219. fig. 3. 4. 5. Rai dendr. 43.

Spondias diffusa, foliis plurimis minoribus pennatis, penna compressa sulcata, floribus proceris Brown jam. 200

Prunus americana osculo magno ex filamentis lignosis reticulatim conflato Pluk. alm. 307. t. 210. fig. 3.

Spondias Myrobalanus, ramis sparsis, foliis multo brevioribus saepe amer. 139. t. 80.

Spondias mombin foliis petiolo communi compresso. Lin. S. V. p. 420.

Spondias purpurea Lin. Spec. pl. pag. 613. Coeff. A. 209.

Habitat in India occidentali

Rami peretes pallide fusci albedo punctatis, folia alterna
venoso sparsa pithamea pennata cum impari & 9 juga foliola bre
reticulati ve petiola oblonga obtusa retrospum subrenata pollicaria
infer extus versu semper majora. Petioli purpurascens floro
axillares paniculati parvi

2 myrobalanos *Spondias foliolis lanceolatis acuminatis* petiolis communi Texti
ovata:
Aiaya et Bametara Marip. braf 124

Panus americana Mer. jurta. 13. 7. 13

Myrobalanus folio fraxini alato, *fructu luteo ospiulo magno*
debrosi *Loan* hist. 2. p. 425. t. 219. fig. 12. Kai dend 43.

Mombin arbor, folio fraxini, flore luteo ^{mo} racemoso Plum. gen
44. ^{ovata}

Spondias folus plunnais ovatis racemis terminalibus, cortice
interno rubente Brown. jam. 229.

~~Spondias~~
Hobo Loef. d. 209. *

Spondias myrobalanos petiolis teretibus: foliolis nitidis
acuminatis Lin. S. V. pag. 420

Spondias mombin racemis terminalibus longitudine
folia squantia Fairya hist. p. 130

Spondias lutea Lin. Spei. p. 613.

β *Spondias folus paucisobus pinnatis ovatis nitidis* Brown
jam. 229.

Habitat in America meridionali 7

Tota glabra folia pennata cum impari quadrijugis foliicola lan-
ceolata acuminata bi-^{tr}ipollicaria aequalia undulata, vix crenu-
ta, opposita subsessilia transversim nervosa, avenia. Pedua
flos paniculati ~~paniculati~~ pedic plus quam pedalis
pedicelli parvales capillares flos patentissimi ~~et~~ alternim
ramulosi flos profus alterni minuti.

Dulcis I. foliis pinnatis: foliis sexjugis serratis costatis Toft. fl. Austr
p. 34. Sonner: N. 2. V. 123

non est