

Stohelina

1. Gnaphalodes S. foliis filiformibus tomentosis, squamis calycinis apice membrana
cei reflexis
2. Dubia S. foliis linearibus denticulatis integrisque, squamis calycinis lanceolatis;
pappo calycibus duplo longiore
3. arborescens S. foliis ovalibus subtus argenteo-sericeis
4. fruticosa S. foliis lanceolato-cuneiformibus utraque glabra
5. hastata S. fruticosa; foliis hastato-subrhomboides ^{reticulatis} incana
6. multifolia S. arborescens foliis oppositis brevissimis cordatis ^{reticulatis} dentatis supra lucidis
subtus tomentosis
7. corymbosa S. foliis cuneatis pinnatis, floribus corymbosis
10. chemopene S. foliis linearibus confertis longissimis
11. umbriata S. foliis subulatis erectis tomentosis
12. spenosa S. fruticosa, foliis subulatis pinnatis basi utraque spinula acutis

fasciculata Stakelina foliis fasciculatis tersti cubulatis tomentosis Thuab. prodr.

143.

Habitat in Cap. b. spec. Ex herbario Royenii §

Habitus Gnaph. ^{Stypticulo rigidus} ~~Stypticulo ramoso~~: Rami sparsi, vix frequentes,
forti, teretes, cinerei. Folia minuta, saepe tridecim ex eodem puncto,
patenter, acuta, inano. Flores terminales, vix pedunculati, plerumque
politari, raro terni. Calyx obovatus, pino duplo major, umbicatus.
Foliola ~~ext~~ ~~extrema~~ exteriora dubitata, interiora linearia ^{retusa} spinula acumi-
nata, intima inermia.

Centorea Gordonii de Sem. Feb. 1774

Habitat in America boreali herb. Ruhl.

Caulis herbae eius erectus, glaber, superne ramosus. Folia sessilis, alterna, pollicaria, lineari-lanceolata, integerrima. Cymbi ternariae ramorum et caulis, simplices, patentes. Calyx glaber, simplex: foliata linearia, mucronata: Sprema pauca ad basin. Flores 8. Semina teretia, levia. Pappus sessilis plumosus.

trinervis

*Stachys foliis oppositis oblongis basi acutis trinervis, pedunculis laterali-
bus terminalibusque.*

Rhaphanoides fruticosa, cappendis folio trinervis, insularum Sto-
echadum Vaill. in Act. par. 1719.

Habitat in insulis Stoechadibus. Ex herbario Vaillantii 5

Caulis ramosus: Rami teretes, glabri. Folia petiolata, unguiculata,
avenia, ope tantis villosula. Pedicelli tres in singulo pedunculo; la-
terales uniflori, intermedius dichyllus, triflorus. Calyx cylindricus: folio-
la oblonga, obtusa. Floresculi quinque. Semina villosa. Pappus caly-
ce longior, dentatus, reflexus.

~~Stachys foliis oppositis oblongis basi acutis trinervis, plani-
bus terminalibusque~~
~~Eupatorium fruticosum cappendis folio insularum Stoechadum Vaill.~~

Pentstemon ^{lanceolatus} fol. rad. interrupte pinnat. pinn. ^{lanceolatus} serratis. caul. pinnat. ^{lanceolatus}

Habitat in oriente? ^{Cilii & pinnis} Hort. Paris. herb. Du font

Caulis herbaceus, erectus, angulatus, ramosus, scaber, villosus. Folia radicalia ^{vel minoribus} interrupte pinnata, pinnis lanceolatis, dentibus nonnullis majoribus ~~notatis~~ subpinnatifida remote serrata ^{pinnis} ~~lanceolatis~~ terminatis remote serrata integerrimis. ^{massa} laciniis terminalis remote serrata, acuta, villosula: alia pinnatifida laciniis oblongis integerrimis. Caulina pinnatifida, villosa: laciniis lanceolatis mucronatis integerrimis, terminalis remote serrata. Capitulum eodem C. orientali. Flores sulphurei. Squama ovata, spina unguiculari terminata, margine spinoso ciliato ut et basi spinescentium

Gimbrata Stolhelia

Dorster.

Habitat. ~~in~~

herb. musci

Caulis herbaceus, erectus, simplex, superne canescens. Folia plurima radica-
lea, 2-3 in caule, remoti, ~~erecta~~, ~~integerrima~~, villosa, margine incano
tomentosa, caulina amplexicaulia. Capitulum terminale

in Dorst. prod. non inventus

Strobilina
Spinoza Cassiopea

Strobilina

fruticosa, foliis subulatis pinnatifidis, basi utrinque spinula utrinque

Sub nomine in sequenti in herbario Petiveri ^{qui eam a Micheliis habuit} videtur. Tacca aegyptiaca spinosa
7 Chrysozona mucronata; foliis teretibus mucronatis Boiss. Desir. pag. 147.

Caulis fruticosus, rigidus, ramosissimus, ~~ramis~~ ^{ramis} alternis, teretes, striati, glabri.

Folia alterna, sessilia, teretia, subulata, rigida, pungentia, remota, patentisfi-
mer, subternata, basi utrinque spinula aucta.

Flor solitarius in apice ramorum, ^{bot.} solida bina, minutis ~~sub~~ ^{sub} ~~longis~~ ^{longis} ~~flor~~ ^{flor}

Calyx ante anthesin cylindricus, demum turbinateus, embriatus glaber, ~~saqua~~
mis linearis oblongis, mucrone terminatis

Semina linearis pilosa, triquetra; Pappus simplex ~~fructus~~ ~~pelosus~~ ~~longi~~
tudine calycis, griseus, ovulo armato subtilissime dentatus.

Receptaculum nudum brevissimum: palis brevissimis fetacis

~~Tacca Petiveri ob Receptaculum nudum Chrysozomae associari~~

(Ob calycem cylindricum, Pappum denticulatum, et receptaculum subpalea
cum faciemque alienam a Chrysozomae potius ~~est~~ ^{potius} Strobilinae
associari

4 Ponyra aegyptiaca Funiperis foliis tricuspidatis longius annulato, floribus aureis.
Saillant Act. Paris. 1719. pag. 397. Tab. in 8^o

Stachys ~~Stachys~~ ^{Stachys} hastata fruticosa foliis basi hastatis incanis
 Chrysocoma quadrulata; foliis oblongis dentatis, subtomentosis sessilibus; floribus terminis

Libri 8. Orth. descr. pag. 147.

Onites humilis, rigidus ramosissimus. Rami teretes, incanis, obtusi.

Colica oblonga, ^{sessilis} versus medium lobulo horizontali utrinque dilatata, obtusissima
 basi acuta, incana profertim subtus, semunqui lania, interdum denticulata
 minutis in axilla lobulorum.

Floras versus apicem ramulorum, solitarii, sessiles.

Calyx imbricatus, figura spinosi; ligamentis linearibus, carinatis

Limbo villosa; Pappus homogoneus, simplex, extra calycem, ^{sub villositate denticulatus} ~~est~~ obtusus,
^{subrigidus.}

Receptaculum nudum sive paleaceum

10 Chamopeneae *Hellebina* foliis linearibus confertis longissimis Lin. S. V. p. 739

Taraxacum capitata rosmarinifolia Pons. Ital. 75.

Chamopeneae Alp. exot. 77. t. 76

Taraxacum fruticans pinifolium Bauh. Pin. 271. Pluk. alm. 190. t. 94. fig. 3.

Stoebe cretica fruticans, pinica angustifolia Monf. h. 3. p. 133. f. 7. 7. 26. fig. 8.

Serratula Chamopeneae foliis linearibus fraxis revolutis caule fruticoso
Lin. Spec. pl. p. 1147.

Habitat in Creta

Rami tomentosi. Folia fraxa subtus tomentosa. Pedunculus terminalis
aggregatus
foliis uno alterove. Calyx ovatus, Squamis ovatis subtomentosis squar-
nisi. Corolla purpurea. Pappus uterque reliquus

" imbricata Stohelina foliis subulatis erectis tomentosis L. mant. ~~739~~²⁰¹ J. V. p. 739

Stohelina calycibus tubinatis, foliis ovatis acuminatis imbricatis Berg. cap. 233.

Habitat in cap. b. p. p. t.

Rami conferti ^{sub} verticillati. Stigma bifidum. Receptaculum un-

icum, foris colis excavatum.

elegans

*H. foliis linearis lanicollatis, caule erecto tomentoso
floribus spicatis, calycibus squarosis Swartz ob
prodr pag 202*

Habitat in America meridionali

non vidi

4 *Corymbosa Strobilina* foliis cuneatis promosis, floribus corymbosis L. Suppl. 759* S. V. p. 739

Habitat in C. b. p. t. y.

Stem ramis prolixis; micans erectis. Folia alterna, subpetiolata, distantia, cuneiformia s: lanceolata, promosa, apice obtusa, reflexa aut tridentata, subtus subtomentosa-alba. Corymbus compositus terminalis. Calyx squamis brevissimis imbricatis; carens. Pappus albus, calyce longior L. Sup. l. c.

non vid.

4 ^{ispa}
~~frutescens~~ *Stokelena* foliis lanceolato-cuneiformibus utraque glabris.

Cyanus minimus repens Cob. ic. 545.

Cyanus repens angustifolius Bauh. Pin. 274.

Sacca frutescens, plantaginifolia, flore albo. Tournef. ~~Fl. Fr.~~ Cord. 32.

Rhaphanistrum frutescens, ~~fr~~ oleo folio Vaill. art. 179.

Centauria frutescens Lin. Sp. pl. p. 1286

Stokelena frutescens foliis lanceolatis obtusis Lin. L. V. pag. 730.

Habitat in Creta, Oriente

Affinis procedenti ~~et~~ ~~ita~~ glabra. Rami vix villosi. Folia lanceolata, apice rotundata inferne attenuata semiamplexicaulia, sparsa, glabra, concolora arena sesqui pollicaria. De Pedunculi axillares ultimi foliosi uni flori, folia breviores. Calyx cylindricus apice purpureo squamis oblongis obtusis apice purpurascens. Pappus ut in antecedente

3 arboreus *Strobilina* foliis ovalibus subtus laniceo argenteo-sericeis.

Cyanus fruticosus Candolle Pona

Cyanus arboreus altera, *Styracis* folio Alp. Enc. 33. t. 32.

Endem rotundo argenteo folio, *Cyanus* flore Bauh. Pin. 452.

Gaiea arboreus *Styracis* folio Tournef. F. R. H. 445.

Rapontia vides frutescens, *Styracis* folio Vahl. act. 179.

Strobilina arboreus foliis ovalibus Schreb. dec. 1. tab. 1. Lin. Mant. III. x. 65.

Habitat in Creta, in sella Boeckhadum. in rupe Victoriae G. provinciae

Rami teretes, tomentosi. Folia petiolata alterna, approximata, ovalia supra
glabra aversa subtus laniceo pulchre nitentibus polliciana et ultra.

Petiolus supra canaliculatus subtus carinatus. Squama calycina ovata
acuta apice tenuis sine tomentosi. Pappus verticillatus albus calyce cylindrico
eoduplo longior. Paleae basi connatae. Paleae setae longitudine calycis
nyida

Tricifolia *Hokelina* arborea, foliis oppositis brevissimis petiolatis cordatis dentatis supra luteis
subtus tomentosis. Lin. suppl. p. 350* S.V. p. 730. Smith ii. 3. pag. 71. tab. 71

Habitat in America meridionali &c.

Rami rigidi, tomentosi, teretiusculi. Folia ovata, cordata, obtusa, remote dentata, supra
glaberrima venis & quasi illinita, subtus tomento crasso alba, pelliciana.
Panicula terminalis, composita, tomentosa. Calycis hemisphaerici, imbricati: squa-
mis lanatis. Flores lutei. Semina tetrayona. Pappus calycis longior: setis hispidis.
Difficile ad proprium genus reducitur. Calyx enim *Chrysopsis*; sed receptaculum
paleaceum: paleis minutissimis subramosis L. suppl. l. c.