

Stapelia

- 1 variegata l. Denticuli ramorum patentibus, floribus pedunculatis, Corollae glabrae supra rugulosis: laciniis ovatis planis
2. <sup>neonis</sup> hirsuta l. Denticuli ramorum erecti, floribus pedunculatis, Corollae supra rugulosis centro hirsuti marginibus ciliatis planis
- 3 4. <sup>incarnata</sup> mammillaris l. Denticuli ramorum <sup>subhexagona erecta</sup> obtusi mucronatis, <sup>dentibus</sup> <sup>opato aculeis</sup> horizontalibus truncatis
- 5 6. <sup>callosi</sup> <sup>incarnata</sup> quadrangulari l. <sup>callosi</sup> quadrangulari Denticuli ramorum patentibus obtusi truncati callosi, floribus sessilibus aggregatis, corollae laciniis planis lanceolatis
- 6 7. pilifera l. caule tereti mammuloso tuberculato: mammellis aquae piliferis
- 7 8. articolata l. Denticuli ramorum oblongi teretibus reticulatim obsolete verrucati, floribus subsessilibus, corollae supra papilloso
- 8 9. nulla l. <sup>subhexagona erecta aculeis patentissimis</sup> aggregatis, corollae laciniis lanceolatis supra holosericeis reticulatis

quadrangula s. ramis quadrangulis denticulis ramorum potentibus & mucatis

Staphelia quadrangula folliculis subulatis, conjugatis Forst. d. p. v.  
Habitat in Arabia

Caulis ascendens ramis <sup>et germinales</sup> sparsis attenuatis crassitie carnosae  
Folia nulla. Pedunculis lateralibus brevissimis foliatis confertis  
Calycis foliola subulata parva minuta. folliculi glabri subulati  
4 pollicares

Staphelia confer differtur in Manusc. et Muon. deser.  
affinis incarnato Lin. adde adhuc modum florum in differentia

*Soleiopa Stapelia*

Habitat in Cap. 6 spec. herb. Royenii

Corolla laciniis attenuato punctato, pollicariis. Corolla glabra

ciliata St. corolla fundo papilloso pedunculis longioribus, caule tetragono canoso  
Decumbente radicante supremo florifero.

St. ciliata

Thunb. prod. pag. 46

St. ciliata

maxon. Strep. pag. 9. no 1. tab. 1

Habitat in cap. b. spei

non vid.

revoluta

Stapelia rami tetragoni erecti denticulati: dentibus  
patentibus Corolla glabra laciniis ciliatis acutis revolutis  
Mason Stapel. pag. 12. n. 10. tab. 10  
Habitat in Cap. 6 spec. 5

nisi nota

herpeta l. denticuli ramorum erectis l. v. p. Mill. w. 7. 250  
Aplepias africana aizooides, flore pulchre fimbriato Comm. var. 19.  
t. 19. Brodt. fasc. 3. p. 5. 123.

Habitat ad Cap. b. p. i. 4

herpeta St. Denticuli ramorum erectis, floribus pedunculatis, corollis supra  
rugulosis, centro herpatis margine ciliato. laciniis ovato oblongis  
acutis planis bot. New. 1. p. 309

Laciniis corollae latae & sine nuda margine pili cespitosis sumis  
longis. Caulis carnosus tetragoni ramis rami inferne, ad speciem  
venter dental anguli dentatis. pedunculi laterales solitarii  
uniflori nutantes folia nulla.

*Porrona* Hop. ramulis quadrangulatis: divaricatis, angulis remote acutis  
dentatis: dentibus incurvis: laciniis ovatis ciliatis  
pedo villosi Masf. *Step* p. 23. no 39. tab 39  
Habitat in cap. b. p. 5

prope huj: non videt

integrifolium Pers. foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, scapo unifloro apice  
squamoso.

Habitat in monte video

Folia lanceolata basi attenuata in petiolum vaginantem canaliculatum  
pollicitana, dente uno vel altero obtuso alia integrissima

Scapus foliis vix longior inanis apice adpressus squamis plerumque  
lanceolatis subulatis <sup>Pers. Panhach</sup> glabris Calyx <sup>Pers. Panhach</sup> glaberrimus imbricatus foliolis  
lanceolatis. Pappus nullus calyce brevior



grandiflora Stap: corollis villosis laciniis lanceolatis acuminatis  
nec unguibus basi incisatis corolla brevibus; ramis erectis  
tetragonis clavatis basi floriferis Willden. spec. pag  
1270.

Stapelia grandiflora Masson Stap. p. 13. no 11. tab 11.  
Habitat in cap. b. spec. 4

non vidi

ambigua Stapel. corollis hispida: laciniis ovato-lanceolatis acu-  
tis margine villosis, pedunculis multifloris, ramis erectis  
tetragonis, pedicellatis basi glomeratis Welden. Spec. pl.  
reg. 1279.

Stapelia ambigua Masson Stap. p. 13. no. 12. tab. 12  
Habitat in Cap. 6. spec. 5

non vidi

Alfonia

1. theoformis A.

*pulvinata* Stap. lacinis corollae spissis subrotundis rugosis ac  
minatis margine fundo elevato villosi, caule tetrago  
no decumbente, ramis adscendentibus & conferti

Walden. spec: pl. pag 1279.

*Stapelia pulvinata* Marson Stap: p. 13. no 13.

tab. 13.

Habitat in Cap. b. spec 5

non vidi

*astenas*

Stap. corolla laciniis ovato-acuminatis nigosis, m  
gine revolutis villosis, pedunculis longitudine corollae,  
ramis erectis tetragonis attenuatis basi floris Wied.

Spec. pl. pag. 1280

*Stapelia astenas* Masf. Stap. pag. 14. no 14. tab. 14

non vidi

*Pseudotschoua Astragalus caulescens procumbens; Leguminibus subcylindricis rectis  
glabris, foliis obcordatis subtus villosis*

Habitat 4

officinis ramis foliis rotundiora, legumina recta, flores plures in spica

gemmiflora Stap. corollis pabris: laciniis ovatis acutis & scatis  
superne squae nervis, pedunculis longitudine corollae  
ramis erectis tetragonis inferne glomeris Wilden  
Spec: pl. pag 1200

Stapelia gemmiflora Mas: Stap. pag. 14. no 15.  
Tab. 15.

Habitat in Cap. b. spec 5

non vidi

*divaricata* Stap. corollis glabris laciniis lanceolatis  
acuminatis revolutis pedunculis corollae. Conglobatis  
ramis tetragonis attenuatis divaricate patentibus  
medio floriferis Wild. Spec. pl. pag 1280  
*Stapelia divaricata* Mas: Stap. p. 17. no 22. tab.

22

Habitat in Cap. b. Spec. 5

non vidi



Inflo. Stapel. corollis rugosi, laciniis lanceolatis acuminatis  
pedunculatis. <sup>culi</sup> ~~longitudine pedunculi~~  
Lis ~~longitudine~~ ramis tetragonis erectis basi  
pedunculatis. Clavicornis Weldenov. huius pl. pag. 120 p. 1.

Stapelia rufa maxima. Stap. pag. 16. no 20  
tab 20

Habitat in cap. b huius 5

non vidi

acuminata St. corollis rugosis pedunculo longioribus  
laciniis ovatis cuneatis acuminatis, ramis tetragonis  
adscendentibus medio floris Wild. spec. pl. naxos,  
Stapelia acuminata Masson Stap. p. 15. no 17.  
tab 17.

Habitat in Cap. b. spec. 5

non vidi

microrospon Cuscuta foliis ternatis oblongis serratis glabris membranaceis.

Siti trifolia, vera ~~Cuscuta~~ <sup>non 2780</sup> acinis minoribus rotundis Plum  
Catal. pag. 10. fc. Tab 259. fig 4.

Habitat in India occidentali <sup>non</sup> ~~A. v. Prokr~~ 5

Rami angulati, glabri.

Folia petiolata, ternata. Foliola lateralia fusilia, bipollicaria, lanceolata  
elliptica, obtusiuscula, mucrone brevi terminata: interdum  
tripollicaria, petiolatum, ellipticum, interdum utrinque adnatum,  
lateralebus duplo latius; omnia serrata: serraturis mucronatis,  
glaberrimis, venosa: nervi et venae subtus respicientes.

Petiolus sesquipollicaris, margine ~~non~~ <sup>non</sup> membrana

Cyma pedunculata, axillari, primum quadriradiata: <sup>radiis</sup> ~~radiis~~ <sup>inanis uno</sup> ~~radiis~~ <sup>nilis raris adpressis</sup>  
qualibus, unguicularibus, divaricatis bis bifidis: ~~pedicelli~~ <sup>pedicelli</sup> ~~ultra~~  
mi umbellati 11-13. brevis. ~~in~~ <sup>in</sup> dichotomia pedicellata

Flores minuti, dichotomii  
pedicellati

Fructus oblongus, parvus, obtusus.

Calyx brevis brevis subquadrilobus

Petalia 4 oblonga

Stamina quatuor longitudine corollae

no 5 A. v. Prokr

Germen ovatum, glabrum. Stylus longitudine corollae

reclinata Stap. laciniis corollae lanceolatis fundo elevato, pedunculatis  
corollae longioribus, ramis patentibus Yestazonis, supra basin florum feris

~~Stapelia reclinata~~ Willden: spec. pl. pag. 1202.

Stapelia reclinata Neesforn: sup. p. 19 no 20 tab. 20

Habitat in cap. b. spec. 5

non vidi

elegans Stapel, corollis hispida pedunculo brevioribus: laciniis  
lanceolatis fundo pentagono, ramis diffusis oblongis ~~tertia~~  
~~subrotatis~~ subtetragonis medio flonferis Wild. spec. pl.  
pag 1202.

Stapelia elegans Musson stap. pag 19. no 27. tab

<sup>27.</sup>  
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

cespitosa Scop. laciniis corollae lanceolatis acutis margine revolutis,  
pedunculis longitudine corollae, ramis procumbentibus tetragonis  
supra basi flouferis Wild. spec: pl. pag 128 2.  
Stopelia cespitosa Maxon Scop. pag 20. no. 29. tab 24  
Habitat in Cap. spec: 5

anda Stapelia corolla laciniis oblongis acuti apice ciliatis  
fundo unilobis, pedunculis corolla longioribus, ramis tetra-  
nis erectis apice flompani Willden. spec. pl. pag 1203.  
Stapelia anda Masoni Stap. pag. 21. no 33. tab 33.  
Habitat in Cap. b. spec 5

non vid.

A. Boyer was at present Medici.



parviflora Stap. Corolla laciniis lanceolatis obtusiusculis, pediculis  
culis corolla longioribus, ramis tetragonis patentibus medio  
extra dentes floriferis Welden. Spec. pl. pag 1203  
Isopelta parviflora Masson Stapel. p. 22. no 35 tab  
35.  
Habitat in Cap. b. p. p. 5

non vidi

*pubulata*

*Styelia pubulata* Torff. Cat. pl. arab. p. 100. no 193. Feb. 7

Habitat in arabia

*Concinna* Stap. <sup>longitudine pedunculati</sup> corollis hispida; laciniis ovatis acutis, caule  
tetragono erecto superne ramoso, ramis patulis simplicibus,  
basi flouferis Wild. ~~fl.~~ <sup>fl.</sup> ~~spec.~~ <sup>pl.</sup> pag. 1204  
*Styelia concinna* Mespr. Stap. p. 15. no 10. tab 10  
Habitat in Cap. b. ~~spec.~~ <sup>fl.</sup>

non vidi

glandulifera Scop. corollis apice pilis glanduliferis longi pedun-  
culo brevioribus. laciniis ovatis acutis, ramis  
patulis tetragonis basi flomferis Willden. spec. pl.  
pag 1204

Stapelia glandulifera Murrison Stapel: p. 16 no 14. tab

<sup>19</sup>  
Habitat in Cap. 6. spec 5

non vidi

pedunculata Stap. corolla laciniis lanceolatis acuminatis basi mar-  
gine glandulis pedicellatis, pedunculis ramis duplo longioribus  
ramis tetragonis apice subdentatis, medio floufens  
Walden. spec. pl. pag. 82. 84.

Stapelia pedunculata Masf. Stap. p. 17. n. 21. 7. 21.  
Habitat in Cap. l. spec. 5

non vido.

aperta Stap. corollis rugosis: laciniis ovatis obtusis, pedunculatis raris  
Dupleo linguatis ramis tetragonis apice subtridentatis, basi flori-  
feris Wedd. Proc. pl. pag. 1205.

*Stapelia aperta* Maspm. Stap. p. 23. n. 37. v. 37.

Habitat in Cap. b. p. 5

non vid.

Deposito in

Gordoni Stap. corollis rotatis pedunculo corymbosi, ramis apice  
glomeratis tuberculatis: tuberculis spinosis Wed.  
Spec. pl. pag 1205.

*Stapelia gordoni* Masf. Stap. p. 24. No 40. tab. 40.

Holotypus in Cap. 6. Spec. 5.



pilifera *Aspidia* caule tereti mamillato tuberculato: mammillis apice piliferis.

Lin. Suppl. p. 171 \* S.V. p. 260.

Habitat ad C. bonopaei

Caules simplex rarius ramosus, crassus tuberculis vestus. Tubercula apice  
acuta, pelo simpliciter terminata. Flores inter tubercula, parvi, purpurei.

L. L. P. C.

non vidi

caudata Stap. caule folioso, foliis linearibus oblongis, flore pedunculato,  
laciniis corollae linearibus Thunb. prodr. fl.  
cap. 1. pag. 46  
Habitat in Cap. 6 spec.

non vidi

articulata Hay. corollis papilloso pubescentibus: laciniis canaliculatis  
vomis teretibus apice glomeratis tuberculatis: tuberculis  
mucronatis Wild. spec. pl. pag. 1207.

Hay. articulata Masf. Hay. pag. 20. no 30. Tab 30.

Hook. Kew. 1. pag. 310

Habitat in Cap. b. hui

mammillari Stapelia denticulis ramorum obtusi mucronatis Lin f. V. p. 260 Mant. 216  
Stapelia aphylla adnodos mammillari, foliulo rubello, filiquis pendulis Barm  
apr. 27. Tab. 11.  
Habitat in Cap. bonae spei.  
flor. minutus.

non ~~vidi~~: vidi

puberula Hap. corollis pubescentibus, pedunculo longioribus,  
laciniis ovatis acutis, ramis erectis tetragonis medio  
glomeratis Wied. spec. pl. p. 120 n.  
Rapezia puberula Marten. Hap. p. 24. n. 41. 744.  
Habitu Pop. l. spec. 5

non vidi

ramosa Stap: vultu planis pedunculato longioribus: laciniis lam-  
bentibus margine revolutis, ramis erectis in pube tetragonis  
medis extra dentes glomeratis Willd. spec. pl. pag. 1200.  
Stapelia ramosa. Musc. Stap. p. 21. no 32. tab 32.  
Habitu in Cap. 6. p. 5

non vidi

*Loficulata* P. caule aphylo sub hexagono: denticulis patentibus acutis  
flores pedunculato. Thunb. prod. fl. Cap. 1. pag. 46  
Habitat in Cap. b. pr.

non vidi

pulla Stapelia subhexagona erecta aculeis patentissimis, floribus sessilibus aggregatis: corollarem laciniis lanceolatis supra holopneicis replicatis. Hort. Kew

1. p. 310.

Habitat in Cap. bono spei



ascendens Stap. corollis pediculo longioribus, laciniis linearibus  
acutis margini reflexis, caule tetragono ascendente  
apice florifero. Wed. spec. pl. reg. 1200.

~~Habitat in P. b. p. p.~~

Stapelia ascendens Roth. Pl. rariorum. 1. p. 207-30

Habitat in Tida orientali 5

non vid.

quadranzula <sup>tetragona quadranzulani</sup>  
S Dentibata ramorum patentibus, flo obtusi truncati callosi  
floribus suspensibus terminalibus confert

Stapelia quadranzula foliis utriusque subulatis, conjugatis Forst.  
Deser. pag 52.

Habitat in arboribus

Caulis subulatis ramosis. Flori parvi vix flavescerent  
Calyx dentatus. Folliculi saepe pyramidi subula  
tri subulati aqueus

Differentia vide in Syst.

quodammodo

micarnata *Napelia quadrangulans*, dentibus horizontali truncatis callofis Lin. Suppl.  
p. 171. 4 S. V. p. 260.

*Euphorbia erectum quadrangulare, spinosum, ramis lateraliter rotundis*  
foliis Burm. afr. t. 7. fig. 1.

Habitat in Cap. bonoppei

Flores parvi, micarnati. Lin

punctata Kap. corollis campanulatis pedunculo duplo brevioribus  
laciniis patentibus lanceolatis acutis, ramis decumbentibus  
oblongis subtetragonis medio floris Wed. Sp. pl. pag. 1204  
Kap. punctata Masp. Kap. p. 100. no 24. & 24.  
Habitat in Cap. 6 p. 5

non vidi

geminata H. laciniis corollae lanceolatis margini revolutis  
pedunculis geminatis longitudine corollae, ramis decum-  
bentibus verticillis apice flomferis Wild. Spec. pl.  
pag. 1290.

Stapelia geminata Masf. pag. 10. no 25. v. 25.  
Habitat in Cap. b. frei 5.

non vid.

Decora

Stap. corollis fund. o pentagonis pedunculo brevibus  
laciniis ovato-lanceolatis margine revolutis, ramis obli-  
quis decumbentibus sessilibus obfoliatis tetragonis basi  
floriferis Willd. Proc. pt. pag. 1240.

Stap. Decora Masson. Stap. pag. 19. No 26 tab 26.

Habitatio Cap. L. p. 5

non vidi

putchella A. corollis <sup>2</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>1</sup> <sup>2</sup> fundis circulan, pedunculis multifloris  
laciniis ovatis acutis, ramis tetragonis decumbentibus  
supra basin florum Wied: Sp. pl. pag. 1291.

Stapelia putchella. Masf: Stap. pag. 22. no 36.  
Tab 36.

Habitat in Lib. per 5



Petitia

Setula Stap. laciniis corollae ovatis acuminatis superne  
trinerviis, pedunculatis corollae breviter, ramis tetra-  
gonis erectis basi floriferis W. & A. <sup>15</sup> <sup>16</sup> pl. pag. 1291.  
Stap. pulchella Masf. Stap. p. ~~no~~ ~~tab~~ ~~16~~  
Habitat in Cap. b. p. 5

non vid.

*Serruciops* Stap. corollis serrucio? pedunculis brevibus:  
laciniis ovalis acutis fere subpentagonis  
fiatru, ramis tetragonis adscendentibus basi  
glanferis Wild. Sp. pl. p. 1291.

*Stapelia serrucio?* Nees. Stap. p. 1291  
H. no. 1. t. 1.  
Habitat in Cap. l. p. 1. t. 1.

non vid.

emotata H. corollis nigris pedunculata brevioribus: laciniis  
ovatis acuminatis, ramis erectis patulis tetragonis basi  
filiformis Wild. Proc. pl. p. 1291.

*Asyria emotata* Macq. Flap. p. 12. no 9. tab. 9.

Habitat in C. 6 part 5

non vidi

mixta Stap. corollae nigrosae longitudine pedunculi: laciniis ovatis  
acuminatis, fundo circulari elevato papilloso, ramis tetra-  
gonis adscendentibus basi floriferis Wild. spec. pag 1292

*Stapelia mixta* Masson Stap. p. 23. no 3. n. tab 30

Habitat in Cap. p. spec.

nomen vidi

Alca

varegata H. dentuulis ramorum patentibus Linn. l. V

Entellana crosta prom. b. frei Kap. theophr 335.

Apleuras airoides aphylla, flore Entellano, siliquis longis angustis  
erectis Monf. hist. 3. p. 610 f. 15. t. 3. fig. 4.

Apleuras airoides africana Brod. juic. 3. p. 3. t. 22.

Aporinum humile airoides, siliquis erectis africanum Herm.  
Leydb. 52. t. 53.

Habitat in Cap. b. frei

varegata H. dentuulis ramorum patentibus, floribus pedunculatis  
corollis glabris supra rugulosis: laciniis ovatis acuminatis  
planis Hort. Vind. t. p. 309

Caulis adscendens striatus rami frequentibus spicis, caespitibus  
digitis aphylli trigoni, pedunculus adpressus dentium pedunculatus  
solitarius digitis brevior.

Formaloi varegata spec. a forte differet mihi  
ignota.

campanulata Stap. laciniis majoribus lanceolatis fundo cam-  
panulato, pedunculis trifloris, ramis erectis & dia-  
gonis basi & pteris Wieden spec. pag. 1293

Stapelia campanulata Masson Stapelia p. 11. no 6.  
tab 6.

Habitat in Cap. 6. spec. 5

non id.



Althoa

pedunculo longioribus  
barbata Stap. corollis campanulatis: laciniis majoribus lanceolatis  
acuminatis foliis clavato-barbatis, ramis subtetragonis ere-  
ctis basi floriferis Wilden. spec. pl. pag. 1293  
Stapelia barbata Masf. Stap. p. 11. no. 7. tab. 7.  
Habitat in Cap. b. spec. 5

non vidi

venusta Stap. corollis glabris pedunculis deflexis brevioribus: lacini  
maioribus ovato-acuminatis fundo concavo  
orbiculo elevato cincto, caule subtetragono erecto super  
ne ramoso, ramis basi floriferis Wild. spec. pl. pag. 124  
Stapelia venusta Mart. Stap. pag. 10 no 3. Tab. 3  
Habitat in Cap. b. spec. 5

non vidi

guttata Stap. corollae longitudine pedunculati: laciniis majoribus  
ovatis acutis, fundo concavo scabro orbiculo elevato inci-  
to, ~~pedunculo longitudine corollae~~, ramis subpatentibus. sub  
tetragonis basi flonferis Willden: spec: pl. pag. 1294

*Stapelia guttata* Mart. Kap. p. 10. no. 4. Tab 4.

Habitat in cap. b. spec 5

non vidi

humilis

Stap. Calicis corolla majoribus lanceolatis, pedunculis  
solitariis corolla brevioribus, ramis subtetragonis patentibus  
basi floriferis Wilden. spec. plant. pag. 129 5.  
Stapelia humilis Masf. Stap. pag. 10. no 5. tab. 5  
Habitat in Cap. b. spec. 5

non vidi

reticulata Stap. laciniis majoribus ovatis acutis fundo barbato or  
bracteolato elevato cincto, pedunculis binis corolla brevioribus  
ramis pentactyoneis patulis basi floriferis Wilden: spec: pl.  
pag. 1295.

*Stapelia reticulata* Masf. Stap. p. 9. no. 2. tab. 2.

Habitat in Cap. b. spec: 5

non vidi

clavata Stap: caule simpliciter crasso clavato obsoleto verrucos  
apice fructifero Wilden. spec. pl. pag 1295  
Stapelia Paterf. it. ed. germ. p 57. Tab. 0  
Habitat in Cap. b. spec. 5

non vidi

chinae si Stapelia foliis lanceolatis congestis, corollis rotatis Lour. fl. Port.

pag. 165

Habitat prope Cantonem Siamum 5

Caulis simpliciter semis, procumbens. folia integerrima, carnosae, glutinosa. flores albi axillares. Umbella magna simpliciter.  
Calycis ruber uti pedunculis. Corolla margine 5-pinnata.



Cochinchinensis Stapelia repens, foliis ovatis oppositis, corollis infundibuliformibus Lour. fl. Cochinch. pag. 165.

Habitat in Cochinchina

Caulis longus teres subsimpliciter spinosus. Folia carnosae, integerrima glabra. Flores albi. Umbella magno simpliciter pedunculo communi longior crassa. Corolla tubus gradalis: lacinae lobis genitalibus sequantibus. Nectarium stella radiis sepe. folliculi subulati

an hujus generis non id.

*S. umbellata* } 13.  
*Ciliata* }

*chinensis*

*(horakichinensis)* Loureiro