

Statis

nyda L. scapo per simplicem capitato squamis et tenoribus oblongis obtusis
calycibus sive anfractis foliis lanceolatis rigidis

Habitat in montibus circa Sequenzam Hispania

Radix apice crassa squamosa nec setosa. folia lanceolata pollicaria
obtusius nervosa glabra acuta sessilia (nec petiolata ut in
Scorfonen foliis - Scapus tenax striatus vix striatus pedalis
capitulum magnitudine cerasti

an Ranunculus montanus major flore globoso Baubum

Statice græca bellidis folio minor et canicolato Tournef. Cor.

Habitata Græcia de J. Desfont.

orientalis T.

~~Tamariscus atle Prosp. Alp. Egypt 14~~

~~Tamariscus ^{egyptiacus} Bauh. pin. 4 Ps.~~

~~Habitat in oriente Pers. herb. Jusq. et mus.~~

Limnium graecum minimum foliis hysopae subhirsuto Tournef.

Cor.

Habitat in Graecia. Dedit Desfont
Scopi sub simplicis. Flores solitarii ad pressu

Spidegens T. pedunculis axillaribus, solitariis, foliis lanceolatis serratis

Aubl. fl. Gu. pag. 290. Tab. 43. fig. 2.

Habitat in Guayana

alliaica Radice scapo junco capitato foliis linearibus acutis inferne an-
gustatis. Caran. ut² pag. 6. Tab. 109.

Habitat in regno valentibus 4

Scapi radicales pedales glaberimi teretes. Folia lineata
glaberrima. Squamula sub capitulo ovata. Calyx squaeden-
tatus dentibus subulatis. Caran

affinis armeni. Folia linearibus lanceolata. Scapus inferne
scaberrimus. herb. Revelles qui a Caran. habuit

an lionomenifolia

Scoparia Stolue fraxo paniculato verti, foliis oblongo-ovatis conacis
mucronatis subtus punctatis Willd. Spec. pl. pag. 95 211
Habitat in Libria 4

Gmelini *Habice* prope paniculatis angulatis, foliis oblongo-lanceolatis emarginatis
planis cartilagineo marginatis subtis mucronatis Wilden. spec. pl. pag.
1524

Habice caule nudo ramoso, floribus paniculatis, corollis minimis Gmel.
fib. 2. p. 220. t. 90.

Habitat in Siberia 2

Incana Statice. caule tereti aphylo, spicis cylindricis, foliis pinnatis
Willd. spec. pl. pag. 1532.

Statice caule nudo simplicissimo, spicis elongatis sessilibus alternis
foliis radicalibus et pinnatis Gmel. bot. 2. p. 224. tab.
41. fig. 2.

Habitat in Persia

Dichotoma *Statice* caule aphylo dichotomo, foliis spatulatis glabris, ? petal
cis basi coalitis Cav. ii: 1. pag. 37. Tab 50
Habitat circa Madagascarium ?

armenā Statice scapo simplici capitato foliis linearibus planis inermibus flexilibus Len. N. Gray. 300

Caryophyllus montanus major, flora globosa Bauh. Pin. 211.

Limonium aphyllocaulon gramineum globosum Monf. hist. 3. p. 601. f. 15. t. 1. fig. 29.

13. Caryophyllus minor² montanus. Bauh. Pin. 211.

Gramen Polyanthemum minus Dodon.

Habitat in Europa et America septentrionalis campis 2

Folia radicalia bipollicaria, utrinque plana obtusifuscula leviter margini pilosa, costa
infra punctata. Scapus palmari vel pedali erectus versus laxis, glaber. Capitulum
terminalis hemisphaericum. Spatha aphylla. Bractea obovata, hyalina longitudine floris
Calyx binatus, quinque dentatus uniflorus.

Sequamis calycinis subrotundis obtusifronis

Armenia Natice

Statice

1-2. juniperifolia Statice scapo simpliciter capitato, foliis linearibus triquetris rigidis purgativis
bus.

Statice maritima humillima, folio capillares, rigido, Tournef. F. R. H. p. 341.

Habitat ad littora maris Hispania et Lusitania &

Co. frigida, glabra.

Folia triquetra, rigida, apice mucrone albo pungentia, semi-pollicaria minus

glabra et impunctata
capus foliis duplo altior, striatus.

Capitulum, flores et reliqua ut in Stat. Armenia squame columnae ovato acuto

(Si varietas Armeniæ certe notabilis et maxime memoratu digna est, cum per
plures annos in horto culta habitum retinet, nec quantum novi alibi obser-
vata nisi ad littora maris mediterranei nisi Hispania et Lusitania

12. *Saniperina* *Stal*

Scorzonifolia S. scapo simpliciter, capitato squamis extensoribus oblongis obtusis
calycibus ^{5 quibus} ~~tridactylis~~ foliis lanceolatis trinerviis.

Habitat in Tingida 74

Radix perpendicularis tuberculata longa superne fetis plurimis
longis ferrugineis. Folia plura, radicalia lanceolata basi acuta
basi attenuata, semipollucem lata trinervia, glabra. Scapus
teres sesquipedalis, striatus. Capitulum magnitudine pibuni
calycis albi nivescentibus mucronibus sive parvis terminatis.
a pseudoarmeria differt squamis obtusis

pseudarmena. *Statice* *Rosa* simpliciter capitata, squamis calycinis externis ovatis acuminatis, calycibus
quinque aristatis

Statice pseudarmena (*armena major*) *Rosa* simpliciter capitata, foliis longe lanceolatis
in V. pag. 350. *Statice* *Rosa* V. 1. p. 164. *Statice* *Rosa* V. 1. p. 164.

Statice *lustraria* *Rosa* Tournef. *G. R. H.*

Habitat
Similis *armena* et differt foliis quadruplo latioribus lanceolatis utrinque attenuatis
margine cartilagineis. Spatha tubus pollicaris in parte margine inferne laciniis
Squamis externis ovato acuminatis, margine tenui scariosis, internosis latioribus
ut in *armena*. Calycis dentes in fetas quinque productas nec longitudine ipsius
calycis nec tantum auctas. Calyx basi pubescent. Folia obscure truncata

scapigeræ Statice caule scapigero, foliis linearibus, floribus capitatis involucriatis
Statice hispanica fruticosa montana magna flore Tournefort *aph. 2. 4. p. 341*
glabra ^{Habitat in hispania} suffruticosis
Caule ~~ramoso~~ simili Statice armeniæ at caule ^{suffruticosis} scapigerus folia multo longiora
latiora ~~capis~~ ^{nallise} duplo angustiora tamen quam in pseudoarmeniæ. Fructus
oblongo ferrugineo margine lato hyalino Calyx integer.

graminifolia Statice sicapo paniculato: ramis triquetris, foliis linearibus canaliculatis
Kort. kew. t. p. 303.

Habitat

?

non vidi

Echinus Stachis capo paniculato, foliis subulatis mucronatis Lin-Spec: 395* P. V.
pag. 301.

Limonium orientale frutescens, canyophylli folio in aculeum rigidissimum abeunte
Tournef. Cor: 25.

Limonium cespitosum, foliis aculeatis Buxb. cent. 2. p. 10. t. 10.

Limonium foliis caulinis subulatis pungentibus Royen. Lugd. b. 192

Limonium grecum, juniperi folio Tournef. corol. 25.

1 *Echinus* f. *Tragacantha alba* Alp. exot. 57. t. 56.

Habitat in grecia et medio oriente

Folia imbricata, subulata, supra plana, margine scabra, apice mucronato-
spinosa; inferiora reflexa Lin. Sp. L. C.

a Dedit Josephus Sprenger herb. Vahl. yaudet caulibus pluribus ad spec-
tantibus

Limonium *Statice* scapo paniculato verti, foliis ellipticis enerviis lobis mucronatis
floribus lateralibus spicis erectis floribus distinctis

Limonium *Matthioli*

Valeriana rubro-purpurea Dod.

Limonium *maritimum* majus - Bauh. Pin. 192.

Habitat in Europa maritima

rami angulati

Scapus semipedalis glaber uti tota planta alterne ramis ramis filiformibus
nubus ramulosis. Paleo scabulata. Folia radicalia bipollicaria apice
retusata mucronata, basi attenuata. Petioli ad apicem ramulorum
basi, ramum remoti. bracteis ovato acuminata nitida.

varietas β . et γ . distincto specie

tetragona

S. fraxino paniculato tetragona, foliis obovatis. Thunb. prodr. fl.

Cap. pag 54

Habitat in Cap. b. p. v.

non red.

oleifolia Statice capro ramoso, specie secunda imbricatis patentibus foliis cuneiformibus margine cartilagineis

Limonium parvum ambornense oleifolium Abel. adv. nov. p. 123. Poir. h. pl. 1. p. 395

Limonium minus oleifolium, Πικυλινκζορ, Band. Pl. rar. 790

Limonium maritimum minus oleifolium. Bank. Pa. 192

Statice oleifolia. foliis lanceolatis subserratis; margine albo, caulibus dichotomis, flexuosis subnudis Scop. del. fl. Inf. 1. p. 24. t. 10.

Habitat ad littora maris Hispania in pra. Barbaria 4

Folia radicalia, opposita, mucronata glabra pollicaria coriacea, Capus pithameus erectus, flexuosus dichotome ramosus, strictus. Spica pollicariae sive fusi glumis fusi margine albidis bifloris. Calyx 5 dentatus. Squama ad ramos ovata acuta

globularis folio Statice foliis scapo paniculato, specie imbricata distichis, foliis spatula-
tis coriaceis obtusis

Linonum medium globularis folio ^{major et minor} ~~minor~~ Barrel. Icon 793-797

Habitat ad littora maris mediterranei

Folia radicalia, bipollicaria crassiuscula glabra. Scapus erectus, inferne
ramosus teres. Rami altero ~~com~~ ^{com} plani, pedalis. Paleae ovato acuminatae
conspicue plumosae

Spica in apice ramulorum erecta teretifida, bifloram imbricata
~~Spica~~ ^{glauca} ovato fusca margine albicantibus, biflora

^{forte}
an varietas oleae folio flores enim sensim secundum fuerit ut in variis

4-5 auriculo folio Ratiae scapo ~~simplici~~ tereti, spicis lateralibus terminalibusque secundis, ^{pedunculatis} ~~non~~ ^{pedunculatis} foliis spatulatis ~~ovatis~~ mucronato sulcatis, venis
Limonium lustranicum, auriculo usque folio Tournef. F. R. H. p. 342. f. 2
Cop. ad littor. maris Barbaria 4 Herb. Tournef
Habitat in Hispania maritimis Bonsfont 4.

Radix superne divisa ut in affines

Solia omnia radicalia, plura, spatulata, crassa, nervosa, mucrone rigido terminata, semipollicaria.

Scapus erectus, teres, lavis, spithameus. Rami nulli nisi pedunculi simplices, teretes, patentes, laterales et terminales.

Spica solitaria, interdum bina, oblonga, pedunculata, patentes.

Flores confertissimi, secundi, erecti, duplici serie, quatuor a Vadem bracteis inclusi. Bractea iniqua ^{duo} ~~exterior~~ anteriores breviores, ovata

duo interiores majores, omnes glaucis fuscescente, margine membranae splendente. Lineaque marginali purpurascete. Bractea adhaerens bracteis binis teneribus ad basin singuli floretuli.

Aliam communicavit de Bonsfont in Hispania lecta, foliis latioribus brevioribus, scapo digitali, pedunculis fastigiatis spica vero vix diffusis

A Ratia cordata dissepit cui folia apice rotundata vel setula absque mucrone, scapus ramosus, spica alterna ^{plurima in pedunculo} ~~erecta~~, ~~flores~~ ~~alterni~~ ~~teretes~~ plures in pedunculo communi, flores alterni solitarii intra squamas. affinis H. oleifolia Cop. Delic. Fl. Et Tanno Ind. 1. p. 24. tamen diversa

conacea S. foarpo paniculato, spicis secundis, foliis lanceolatis acutis
in margine membranaceis

Habitat in Barbaria

Facies olea folia ad folia lanceolata acuta nec obovata
basi attenuata subconacea margine tenui glabra membra
naiceo glabra. Scapis plures sequi pedali glaberr
loves. Squamae in glumis oblonge fusio

ramosissima S. fiapo ramosissimo paniculato foliis spatulato-lanceolatis

Poir. N. 2. p. 142.

Habitat in Barbana

mibi haud nota

maxima Statice folio paniculato Vereti, spicis secundis, foliis ellipticis maximis utrinque
acutis

Limonium latifolium, Orientale, flore minimo Tournef. Corol. 25 ?

Habitat in Babiana oriente

Folia radicalia maxima hujus generis plusquam pedalia, pithamiam lata
sessilia, basi attenuata, superne non dilatata ut in reliquis sed angustata
in acuta, glabra, venosa in tegemina. Scapus sequipedalis erectus
Crassifolia perno columbinis, inferne tres ^{inter nodos} superne altero latere panum pla-
nus: rami patentes ramosi. stipula ovata. Spicis ad apices ramorum al-
ternis simplicibus vel divisis: flores alterni secundi panum: stantes gluma elliptica
longioribus gluma bifloris. Calycis limbus albus 5-dentatus

mana Natic

reticulata *Stachis* Scapi paniculatis prostratis, ramis ferilibus retroflexis nudis, foliis
cuneiformibus mutis Lin. P. V. pag. 301

Limonium reticulatum Raj. hist. 396. Boiss. pi. St. t. 44.

Limonium minus, virgulis retiformi ~~ter~~ p. in vicem implicatis Pluk. alm.
221. t. 42. fig. 4.

Habitat in melita

Limonium minus ^{cuneata vel semipollicaria}
Folia radicalia conacea apice rotundata, unguiculata glabra.

Scapi pyramidei flexuosi teretes glabri ramulis divaricatis
pubulatis raris flexis. Sepala pubulata

cordata *Statice* scapo paniculato, foliis spatulatis retuso Lin. L.V.p. 301

Limonium maritimum minus foliis cordatis Bauh. prod. 99. Pin. 192.

Limonium minimum cordatum s. foliis retuso Barrel. 4v. 805.

Habitat ad maris Mediterranei littora ⁱⁿ squamosi apice duri in scapo e-3 dichotome
basi reliquis foliolis s. scabi ab articulo ad articulum flexuosi

^{scapo} Caulis plures ex eodem indice ^{bi vel ter dichotome duri} ⁱⁿ ^{angustis} ^{aliquibus} ^{fortissimis} apice
foliis inferne squamis squamosis a basi foliorum persistentibus folia cuneiformia
crassifolia hu inferne valde attenuata apice rotundata vel retusa, vix unguicula
na glabra absque asperitate vel punctis micantibus. Siqui scapi erecti
habitu ^{sub} ^{capite} articulati ab h articulo hinc et inde flexi. Nam si Ram ramis alter

ramuli flexiles
rami subspergati
tes alterni
nis vel ad ultionibus dichotome ramosi. Flores sepe apicem ramorum
sepe distantes, secundi erecti alterni, p gluma parva incurva laevis
Limbus calycis integer quoniam albus fusoquinque radiatis

melius d-^{spingit} forte sequenti modo flonibus remoti
scapo paniculato, foliis cuneiformibus lobatis, ^{glumis} calycibus lobatis calycibus
integris
an *Statice* minuta diversa?

minuta Statice caule suffruticoso foliis confertis cuneatis glabris nudis, scapis pau-
cifloris den. Mart. 59. & L. V. pag 301

Limonium maritimum minimum Bauh. Prodr 99. pin. 192. Boic. fig. 26. t. 13. fig. 3.

Limonium siculum, folio cordato Boic. fig. 64. t. 34.

Limonium fruticosum minimum glabrum Pluk. alm. 221. t. 200. fig. 5.

Habitat ad mare mediterraneum t. d. d. & Aus.

Planta longitudo vix digiti. Flores pallide rubentes.

cauliculi plures, brevissimi. Folia conferta unguiculata, crassa
avenia, cernua. Scapi semi pollicares capillares hab. 4 us.

alio quoque ab illo habet
non vidi

echinoides *Haticae* *capo* *paniculato* *tereti* *articulato*, *foliis* *scabris* *den.* - *L. V. pag.* 201 *

Gouan illust. p. 22. t. 2. fig. 4.

Limonium minus *annuum*, *bullatis* *foliis* *Magn.* *Monspel.* 157. t. 156.

Habitat *monsipelii* \odot

Folia *lanceiformia* *emarginata*, *aspera* *puncta* *alba*, *elevata*, *scabra*
unquiculana *scapi* *erecti* *summi* *ramis* *filiformibus* *glabris*
tertibus *sope* *geminis* *vel* *ternis* *ex* *eodem* *puncto*. *floris* *lateralis*
solitariis, *remotis*. *Glomo* *municato* *calycis* *limbus* *quinque* *sedus*
laciniis *setaceis*. *Stipula* *lanceolata*

foliis *lanceiformibus* *emarginatis* *scabris*, *floribus*
prostratis *distantibus*, *glumis* *municatis*, *calycibus* *quinque* *angustis*

viryata Statice scapo paniculato lavi, foliis ^{petiolatis} lanceolatis cuneiformibus, pedunculis
paucifloris

Habitat ad littora maris Barbaris. 4

Radix superne divisa in ramis dichotomis lignosis. Folia radicalia, sesquipedali
cana angusta, tenuia petiolata salte attenuata basi in petiolum.

Scapi tenues erecti, ramosissimi dichotome divisi, rami ramulique filiformes
ramuli in ^{perles} mucronem inermem desinentes, flores in apice ramulorum, erecti
alterni, ~~et~~ maxime secundi 2-4. ante evolutionem ~~anthera~~ subulati, parvi
albica ^{gymis} ~~tribus~~ membranaceis, nitidis, major parum dorso fusa. Calyx ~~den-~~
tatus. Palae ovato acuto margine membranacea

caroliniana. S. frapo paniculato & varicato, folus lanceolato-oblongis

Walt. carol. p. 110

Habitat in Carolina

non vidi

Scabra Statice Scapo paniculato scabro, foliis linearibus lanceolatis, floribus capitato spicati

Habitat in Europa australi

Folia radicalia, linearia, extorsum paniculata, acuta, unguiculata & glabra
Scapus semipedalis ramifus rami divaricati per flexuosos; adpressi punctis numero
sis elevatis. palea ovata margine membranaceo nitido. ~~antheris & lodiceis~~
gloriosa spica brevis flores in spica brevi confectis. 13, antheris exterioribus sabrotuadi
membranaceis nitidis. Calyx albus

a botanicis australibus forte pro specie varietate Stat. Lemonian
scapo differt scapis habetur
municatis foliis diversis

pectinata Martii caule ramisque pinnatifidis triquetris, foliis obovatis petio-
latis, pinnis secundis Hort. Kew. t. p. 385
Habitat in Canariis t.

pinifolia Statice caule flexuoso ramofo fus. furcatus L. V. pag. 301.

Folia nulla nullis squamis ad genicula Boiss. Desf. pag. 66. p. 99.

Caulis ramis que articulatis: articuli sub ramis in squamam oblongam
erectis pertha glabram, margini membranaceo dependente. Ramulae
mouli tues ex articulis ramorum, bas. simili squamam infructi
uti rami punctis

Spica paniculata ex apice ramorum. lobes alterni
numeris spicis bracteis duobus, et tenoribus subrotundis Stat. coni avis
perthales in Linnaeo synonym Shawii delectatur cum ad Cylindropetalum
adpresus perthet

Synonymum Shawii, quod citat Linnaeus delectatur cum ad Stat. Cylin
drophyliam perthet

ferulacea Statice caule fruticuloso ramosisimo, ramulis imbricatis, paleis apice pilo ter-
minatis. Lin. Sp. pl. p. 396* R. V. p. 301.

Limonum ferulaceo folio Gmel. Luf. Monf. hist. 3. f. 15. t. 1. fig. 23. Pluk. alm.
221. t. 20. fig. 4.

Habitat in Lusitania, Hispania, Barbaria

Folia nunquam observari. Caules aegros, teretes basi Dei imbricatis, nudis, paleis
aeternis lanceolatis purpureis, paniculatis. Rami ~~maximosissimi~~
filiformes ramuli filiformes fasciculati, paleis lanceolatis purpureis
imbricatis. Flores apice ramorum imbricatis appendentes, sic ut
lutei. Bractea fructu non palearum

Scandens Viburnum

nunciat. Radice scapo paniculato scapo, floribus lateralibus terminalibusque solitariis, foliis
lanceolatis.

Habitat in C. bona spei

Folia radicalia, in petiolum attenuata sive pollicaria, angusta, enervia, glabra, acuta
scabra. Scapi fere pedales tuberculis minutis scabri, ramosi, ramis alternis ramis
femis ramulis brevibus. Pappi ovato ~~ovato~~ margine vix cartilagineo, flore curvato
solitarii remoti apicali. Humo glabra laves fuso. rudimenta ramulorum folia
mentiuntur

an si abra Thunbergii

aliam hinc simillem at flores in spica bifariam imbricata. Calyx 5 flos
undiversa

aurea *Statice fruticosa* scapo ramofo, ^{terminalibus} floribus subulatis, foliis ~~lineari~~
lineariibus

Statice caulebus fruticosi Verth. ^{sculis}, foliis subulatis caulinis, floribus ex corymbo
so fasciculatis Gmelin. ^{tab. 2. p. 210.}

Limonium maritimum humile, ephedra facie, calycibus florum aureis Amm.

nith. 132. t. 10. fig. 2

Statice aurea caule fruticoso folioso ramofo, foliis subulatis Lin. L.V. pag. 301.

Habitat in Saunia campis montosis &

Radix crassa magna ratione planta, lignosa ad terram ramofo. Scapi plures
e pagulo apice radicis exalti, vix strikhami foliiformes basi teretes ramofo
vix dichotome divisi hinc plani altero latere convexi. Squama ovata
margine membranacea. Folia radicalia parva scapo exascente evanida
caulina basi attenuata semiunguiculata. Flori terminalis solitarii sive tres
aggregati tandem distendi sessiferi. intra 3 squamas quorum major subrotunda
margine lato hyalino calycem includit. Calyx basi pilosis limbo campanu
lato flavo 5 quidentato.

~~cetera aphylla est ramuli juniores pro foliis proferant~~ ^{vel squama inter scapos} ~~lineae Arroman et Gmelina~~

flexuosa *Statice frapo ramo flexuoso* Comybis Terminalibus foliis nervosis her. L.V.

pag. 301

Statice foliis ovalibus mucicis nervosis, caule nudo alternatim ramo flexuoso,
Comybis Terminalibus Gmel. fl. 2. p. 217. t. 89. fig. 1.

Statice capitata Pall.

Habitata in Sibiria &

Folia radicalia lanceolata, glabra, mucronata, basi attenuata, nervosa nervi
versus medium evanescentes, bipollicaria. Capus exsertus inferne versis glab
coris, superne angulatus mucronatus super rudimenta ramorum inferne
Rami superiores fastigiati fructura caulis sequamo ad basin ramorum
Lanceolata acuminata. Spicae in apice terminales breves subcapit. flori
conferti, ante florescentiam curvati. bractea lanceolata margine lato hyalino
nitido. Calycis sepalis integer albus.

congestis sub capitatis

Lanceolata

floribus

incana Statice scapo paniculato, foliis lanceolatis trinerviis pubescentibus
apice mucronatis, panicula ramis triquetris Linn. Mant. 59. 513. S. V.
pag 300.

Statice speciosa Torkh. Cat. pl. Egypt. pag. 65. n. 192.

Habitat in Egypto ?

Bractea ovato-acuminata, amplectentes, margine membranaceo.

Gluma quadrata-oblonga, acuminata, inaequalis, concava, apice
patulo, margine membranaceo, intima trifida. laciniis linearibus, acu-

Plantae Torkh. in omnibus consentit cum specimen quod ab Ill.
a Turci habuit glaucis vix in glabra atomis albi

Colia radicalia margine cartilaginea, sesqui-pollicana
Lora scapi erecta versis lora superne dichotome divisi
Specie albena divisa pauciflora. Calycis limbus albus

Statice rubella Gmel. 2. p. 199. t. 34.

Cynoga Hall. h. fl. 531.

~~Tournefort 7372~~

~~con Generichy. 170.~~

~~*Cynoga flore* Coules Cluff h. p. 50~~

~~*Cynoga flore* Coules J. de lae Bauh. h. 1. p. 204~~

Tatarica Statice scapo dichotomo, foliis lanceolatis mucronatis nervosis, floribus alternis
dispartitis Lin. L. pag. 304

Limonium elatum planta gemis foliis procrementibus in aculeum terminatis, floribus albis
fructibus Ann. nith. 130

Statice tatarica: scapo dichotomo foliis lanceolatis mucronatis, floribus alternis dispartitis
Lin. L. V. p. 301

Habitat in Tataria

Rami folia radicalia, plana, glabra, ^{longe} magne longi, valde mucronata
basi attenuata. Spica alterno ^{emissione a bractea decurrente} rachi triqueter. glume ovata acuminata
Limbus calycis albus basi radiatus

_____ oblongis mucronatis planis

Synonymum Bocharii Leg. b. omisi ut note dubium

Speciosa *Stachis* *Scapo* *dichotomo* *anticipiti*, *foliis* *ovatis* *muironatis*, *floribus* *aggregatis*
Lin. S. V. p. 301.

Limonium *floribus* *elegantissimis*. *Kau* *hist.* 397.

Limonium *elatum*, *plantaginis* *foliis* *procumbentibus* *in* *aluleum* *verminatis*, *floribus*
albis *in* *capitulum* *congestis* *Umm.* *nith.* 129

Limonium *foliis* *lanceolatis* *muironatis* *radicalibus*, *caule* *anticipiti* *dichotomo*,
stipulis *simplicibus* *Gmel.* *fl.* 2. p. 221. t. 91. fig. 1.

Habitat *in* *Tataria* ♂

Scapus *erectus* *sesquipedalis* *glaber* *striatus* *terres*, *superne* *alter* *ne* *ramosus*
Rami *anticipites*. *altero* *latere* *paucis* *convestitur*, *ramulis* *alternis*
remotis, *floriferis*, *dichotomis*. *Quama* *ad* *basis* *ramulorum* *ovata*.

~~*Planta* *culta* *in* *terranis* *an* *lin.* *congruit* *fatis* *cum* *figura* *Queloni*~~

Folia *radicalia*, *petiolata* *glabra* *subarvensia* *obtrusa* *lanceolata*
oblonga *basi* *attenuata*. *Petiolus* *e* *margine* *folii* *decurrente* *margi-*
natus. *Flores* *in* *apice* *pedunculorum* *congesti*. *glomo* *oblongo* *margine*
membranaceo. *Stro* *calycis* *orculo* *armato* *relicis* *non* *illis* *radis* *dispersa*

— *Scapo* *ramoso* *ramis* *anticipitibus*, *pedunculis* *alternis* *dichotomis*
floribus *terminalibus* *congestis*, *foliis* *lanceolato* *oblongis*

purpurata Statice. caule foliato, ramis foliis cuneata obovato cuneatis trinerviis mucro-
tis Lin. Mant. 5. 6. * S. V. pag. 301.

Statice peregrina Berg. Cap.

Habitat in Cap. b. sp. 4

Tota glabra, laevi, caule ^{inferne} crassitie penne columbinae vaginatus. Petiolis. Folia
petiolata bipollicaria et ultra, venosa quam in rosea nervis 3 bus exten-
sibus. Petiolus ~~foli~~ in folium depressus nervosus longitudinali folii. Peduncu-
lus ramosus: Ramis alternis subrectis squamis fuscis margini hyalini
ad basin ramulorum inflorescentia, Bracteaque ut in S. rosea. Calycis pur-
purascentes radicis sive sanguinei

~~resurrecta~~
~~purpurata~~

^{anastasis} ^{mutilis}
Statice caule foliato, foliis obovato cusceatis ~~subternis~~ ^{mutilis} ~~invenis~~ ^{invenis} ~~limba~~
p. 59. L. V. pag. 90

Statice peregrina Berg. Cap.

Habitat in Cap. b. p. 4

Rami varietis arasptice pene non inferno inferne velti vagini petiolonum. Folia
petiolata sesquigollicaria coriacea, glabra rigida margine tenuiore subcasti
laevius basi in petiolum attenuata. Petiolus longitudine folii inferne
si dilatatus in vaginam caulem amplexante. Vaginis imbricatis. Pedunculus
terminalis scabripilus & punctis minutissimis albidis farinosi, dithotomus
Bractea ovata, acuta, margine hyalino ad ramificationes. Spica secunda
gradatissima flores erecti, 3. flantes simpliciteri rachi flexuosa. Bractea
bina subrotunda, margine hyalino, rigida ad basi floris albero interiore minore
tertia major sole femiunguicularis ~~et~~ calycis dimidio brevior Calyx. basi hirsutus
limbo purpureo campanulato integro sex radiato

Coryifolia St. caule paniculato subro erecto, foliis obovato-linearibus. Thunb

Prod. fl. Cap. pag. 54.

Habitat in Cap. b. frei

ovoid!

Suffruticosa Statice caule ^{lignatus} ~~fruticoso~~ ^{obtusis} ramoso capitulis sessilibus lateralibus et terminalibus
foliis lanceolatis vaginantibus obtusis

Statice foliis lanceolato-linearibus: caulibus basi vaginantibus; capitulis
alternis sessilibus Gmel. flor. 2. p. 216. t. 88. fig. 2. 3.

Habitat in Libia

Stem culis pedalis ramosis, ascendentibus ramis inferne et basi foliorum persistenti
squarosis, teretibus gracilibus. folia angusta unguiculata, crassiuscula
obtusis, ^{inferne} basi attenuata basi ^{oculo armato punctis margine} dilatata margine ^{et} ^{elongata} acido. Pedunculi
ad apicem solitarii interdum bini alterni, sursum parum crassiores
articulati, ~~flexuosi~~ alternati in tuberculis planiusculis bifidis i flores
in capitulis solitariis alternis sessilibus. rachis flexuosa a capitulis
stricta quasi margini tenuiflexo. rudimenta ramulorum ex axillis

monopetala Statice caule fruticoso folioso floribus solitariis lateralibus foliis lanceola
tis vaginantibus

Limonium lignosum Boeck. fr. 34. 35. t. 16-17.

Habitat in Sicilia Barbaria &

Caules fruticosi pedales (culti quoad non pedales) basi decumbens articulatus glaber
ramosus. Folia approximata, obtus^{ius} ~~inferne attenuata~~, basi dilata amplius
caulea, ^{crassa} pollicaria. Pedunculis ramosus, rami spica erecta tripartiti
caesi alterno. Flores laterales articulata articulis superne crassiusculis
hinc plani. Flores distantes. Bractea ut in congenerebus. Calyxis lumbis
parvis albidis fusco sive radiatus corolla calycis duplo longior limbo
obscuro laciniis rotundatis pallide purpureis. Tota planta ex
cens sequens minutis conopsea albidis adpressa

— Spici ramosi floribus solitariis remotis

axillaris Natiæ caule fruticoso folioso, flori paniculis ^{pag. a.} fructu axillaribus, ~~foliis lanceolatis~~ ^{marginatis} saginantibus Tab. 17. gluma et
~~calyx~~ ^{calyx} ~~caule~~ ^{caule} ~~axillaris~~ ^{axillaris}; caule fruticoso, folioso; paniculis axillaribus
 dichotomis; floribus erectis confertis. Herb. de Persi. pag. 5 & no 96.

Caulis ~~erectus~~ ^{erectus} teres; inferne rectus squamis, ramosus.

Folia lanceolata, conferta, lanicolata ~~conferta~~, intermedia, obli-
qua, glabra, crassa, senfim versis: basin attenuata, omnino seguo
Nat. monopetalis.

Spicis floribus paniculato, axillares. Pedunculus communis
 teres, ^{foliis} longior, pedicelli flexuosi, anticipites fructus convexi,
supra plani. Floris spicis minuti

Gluma quadri-valvis, valvulis oblongis, glabris, marginis membr-
natis, obtusis.

(affinis monopetalis diversa structura omnino N. monopet.
diversa vers inflorescentia axillaris

15-16. Cylindropolia Statis caule fruticoso folioso, dichotomo, foliis teretibus vaginantibus Tab. X
Fig. 2. gluma cum calyce majori ne quita
Limonum, gale perisperm., foliis cylindricis Shaw. pfr. 369

Statis cylindropolia, caule fruticoso, folioso, ramoso, foliis cylindricis
acuminatis Bohm. Descrip. pag. 59.

Caulis fruticosus, erectus, teres, dichotomus, crassitie pennae asperino,
undique tectus squamis imbricatis, ovalis, obtusis, anidis.

Folia versus apices ramorum, conferta, cylindrica, interdum parum
incurva, squamis fusis vaginantibus infidentia, laevia, coriacea
solida, obtusissima, mucronata, inaequalia, saepe pollicaria rarius

superne marginata crassiora
spiciuntur paniculata. Flores conferti.

Statis communis ex axillis supremis, bi-f. 3 pollicaris glumae
fus. calycem involvens

Gluma tri-valvis: valvulis inaequalibus, concavis, margine membranaceis,
calyce brevioribus: interioribus oblongis exterioribus subro-

Calyx ^{tunica} glaber, albidus, fusco quinque-radiatus

Cenigolia Rabie caule fruticose prostrato, floribus paniculatis secundis,
foliis lineari-bus Lin. Suppl. p. 107. L. V. p. 301.

Habitat in P. bonoprei 5

Scapus? erectus teres glaber, laxis ramosis. Folia linearia exstropium latiora
altitudine p. an. subtus convexa supra canalit. ^{tuberculis minutis asperata} ulata. Stipulae ut in cen-
genibus. Rami alterni di. flexuosi a flore ^{ad} florem. Flores sp. pl. s. p. un-
di remoti maximi hujus generis bracteis ^{tubulatis} ut in reliquis, major glaucos
pe. apice infra marginem andam purpureo-purpurea. Calyx albus 5 radi-
bus

pectinata Stahle caule ramisque paniculatis triquetris, foliis obovatis petiolatis, spicis
secundis Hort. Kew. 1. p. 305

Habitat in Panania &

Ramifiliiformes acule trigoni. Eolastriulati. Colia plera adgenicula obovato
vel cuneiformia emarginata fetae fini apicis inaequalia saepe polliciana
cum petiolo basi valde attenuati. Pedunculi laterales ^{secundarii} ramosi. Structura
ramulorum squama ovata ad articulos. Spica albena patentes unguiculari
duplex floris duplici serie. Bractea utriusque reliquis. Limbus calycis pallidus
radiis 5 purpurascens

— cuneiformibus petiolatis emarginatis

mucronata Statice caule alato crispo, foliis pectinatis undulatis, spicis secundis et
Statice mucronata caule terispro, foliis ellipticis integris, spicis secundis Lin. suppl.
p. 107. S. V. p. 301. Herbar. Koenig. nov. p. 25. tab. 13.

Limonium peregrinum appendixibus crispis dactylis Pluk. alm. 221.

Habitat in Barbaria 4

^{ovato}
Folia radicalia ^{glabra} petiolo elliptica in petiolum attenuata, subovata
subavenia margine scabra, mucronata, pollicaria ^{ve. major} aeternis albis apper
petiolis folio ^{trigalata} sa. Caulis articulatus, semipedalis (caetera) crispus et angulifoliosus
triplo longior decurrentibus undulatis, superne ramosis. Folia ^{tri} plura ad singulos
genitulum ^{tri} fructura radicalium. Spicis in ramis lateralibus et terminalibus
sa. flores conferti gluma purpurea picea marginibus hyalinis excepta.
Calices albi. Corolla rubescentes: laciniis emarginatis

sinuata. Stipulae caule herbaceo, foliis radicalibus alternatim sinuato-pinnatis.
Caulinis ternis Inguetis subulatis decurrentibus Lin. spec. pl. pag. 398 t. 5 v
pag. 301.

Limonii species Rauwolf. An. 313. t. 314.

Limonium Rauwolfianum Clus. cur. post. 33. t. 33.

Limonium peregrinum, foliis appressis B. aut. Pin. 192.

β. Limonium africanum, caule elato, foliis integris hirsutis, petalo pallide
flavo, calycis amove purpureo Mart. Cent. 40. t. 40

γ. Limonium caulibus alatis, appressis foliis minus appressis, calycibus acutiori-
bus flavescens Shaw. afr. 363.

Habitat in Sicilia, Barbana, Palästina &

Caulis ^{erectus} suthamoni & foliis decurrentibus triangulatis, angulifolia
ciliatis, simplicibus. Folia radicalia aggregata bipollicaria, lobis

stipula ovata nitida lobis rotundatis inferne versus sem. sim. minoribus. Caulis linearia
membranacea denticulata pollicaria. Pedunculi bipollicari alati alii in venis superne
ciliatis ex ipsi margine denticulato scabris ciliatis, apice in laciniis tribus
lanceolatis depresso lobis, foliis aggregati breviter duo exten-
sifemineo lanceolato ^{flenuato} ^{rebito}, inferior involuta viridis dorso, tandem
tota dentibus lanceolatis denticulatis. Calyxis limbus conules cens-

Corolla flava

Differet a caule inferne tereti β. foliis minus sinuatis. γ. Caulem alii mem-
branaceis integris & bracteis obtusis glabris nec acutis hirsutis

Lobata Statice caulebus teretibus aphyllis, foliis sinuatis Lin. Suppl. p. 1074 Lin. h. v.

pag. 301.

Habitat in Africa

Planta minor St. sinuata, sed caules ramique teretes. Bracteo similes sinuato
Calycis albi. Corolla conica Lin.

non vidi

an varietas Stat. sinuata in Madagascaria

Stat. graminifolia } Banks
verticillata }
arborescens }