

Flavia

radicata B. foliis linearibus triquetris, calyce radice: folioliis intimis coloratis
lin. p. v

Chrysanthemum ericoides coronatum C. B. I. Plukh. mant. 47. v. 454.
fig. 7. Bryn. Cent. 165. t. 02.

Phyllis radicata, foliis linearibus triquetris parvis, caule piloso, bract
veis apice glabris coloratisque lin. Am. Ac. 4. p. 93 p. 4

Habitat ad C. b. p. 5 Dicotoma ramosi

Rami terete exasperati. Bas. terni prolifera. ramuli piloso hirsu-
tissimi ramulopi: Folia brevia obtusa, apice callo fusco carnata
triquetra erecto patentia summa pilosa. Flores ternonales
sessiles. Perianthium commune imbricatum, squamis linea-
ribus obtusi apice calloso inferne piloso ciliatis adpres-
sis superne patentibus exterionibus minoribus interionibus
majoribus latioribus, subtus carnatis, albido lutescentibus
radicum mentientibus. Longitudine dupli obliqui

— linear lanceolato trigoni pabulis calyce radice
Colorado capitulo brevior Thurb. prod. fl. Ca p. p. 41

glutinosa B. foliis linearibus triquetris, calyce radiante: foliis omni-
bus coloratis Ren. Mant. 210 + L. V. p. 240 *

Brenna colorata Berg. foliis linearibus triquetris obtusis, radio calycis
colorato, disco glutinoso fusco duplo longiore Berg. cap. 57.
Musci Saravatus Ethiopius arborescens Plukh. mant. 149. t. 431. fig.

Habitat ad Q. b. p. 57

Smellina B. radiata, d. squarrosa disco flori ampliore
viscoso. foliis confertioribus sed profertim foliis omnibus
perianthii connatis elongatis in radium coloratum
nec tantum intimi ordinis radiantibus
folia triquetra. Rami proleseri. folia superiora saepe
pelosa. radii apice callo fusco longiora quam in radia-
ta

foliis linearibus trigonis patulis radio calycis colorato
capitulo longiore Thunb. prodr. fl. cap. p. 41