

Stellaria

1. nemorum L. foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis, capsulis oblongis
2. cordifolia L. foliis cordatis petiolatis acutis glabris, pedunculis terminalibus dichotomis, calycibus
brevibus pubescentibus, capsulis globosis
3. pubescens L. foliis oblongis acutis planis pubescentibus, pedunculis terminalibus ramosis
bifariam pilosis, capsulis globosis
4. radicans L. foliis sessilibus ovatis lanceolatis pubescentibus, petalis quinque partitis
5. dichotoma L. foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitariis, pedunculis fructi-
feris reflexis
6. holopea L. foliis lanceolatis ^{usatis} serratis, petalis bifidis
7. graminea L. foliis linear-lanceolatis integerrimis margine ciliatis, floribus panicula
8. hypericifolia L. foliis ovato-lanceolatis acutis subundulatis, pedunculis simpli-
bus ramosisque
9. pallida L. foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis simplicibus
10. undulata L. foliis linearibus undulatis, caule angulato decumbente, pedunculis
axillaribus unifloris

11. *Papavera* L. foliis lanceolatis subulatis, racis unifloris compressis
12. *humifusa* L. foliis oblongis, pedunculis lateralibus terminalibusque unifloris, petalis bispatis, caulibus diffusis
13. *cerastoides* L. foliis lanceolatis subpeltatis, pedunculis unifloris calycibusque villosis
14. *gemella* B. foliis subulatis, pedunculis terminalibus geminis calycibus acutis lobatis
15. *biflora* L. foliis subulatis, petalis emarginatis, geminibus oblongis, calycibus striatis, pedunculis lateralibus terminalibusque pubescentibus, calycibus obtusis
16. *arenaria* L. foliis peltatis, caule erecto bifido, ramis alternis, petalis emarginatis

hypericifolia Hellana

Alfna fontana Tabern. p. 1089

^{Hellana}
Alfna fontana foliis oppositis, ovali lanceolatis, petalis bipartitis; calyce brevioribus; pedunculis unifloris Faicu. coll. 1. p. 327.

glauca Stellani foliis linear-lanceolatis integerrimis glaucis, pedunculis
erectis, calyce trinervi petalis brevioribus Smith fl. Angl. 2. pag. 475.

Stellaria glauca With. 420.

Stellaria media Schtoph. 141.

Stellaria graminea B. Hudf.

Alpina floribus (foliis gramineis petalis bipartitis Gmel. Seber.
4. pag. 145. tab. 61. fig. 2.

Caryophyllus holosteus arvensis medius Ravi Lynceus. 347.

Habitat in Aggeribus fossarum pratisque humidis 21

affinis graminea, sed folia glauca margines omnino levia, uti et caulis
pedunculi axillares et terminales, erecti alterni, subinde paniculati
Flos duplo major quam in gramineo, calyx minus acute trinervi
petalo obcordata.

ciliata Stellana

Habitat in Sem herb Lus
Folia unguiculata, ciliata

Stellaria

Habitat
petala bifida

Sonnevil. Vall. La Marche

villosa Stellana.

Habitat in insula Bobonis Commenf. herb. Guss.

Caulis prostrumbens: ramuli, erecti, pubescentes, tenues. Folia sessilia, ~~opposita~~ ^{verticillata}?
peltata, lanceolata, acuta, villosa, venia, nervia. Pedunculi dichotomi. Ca-
lyx foliola lanceolata. Petala calycis parva longiora

rigida Hellana?

Alpne orientalis Vaillant

Habitat in oriente Herb. mas.

rami apice ^{se} dichotomi floupen
Caulis herbaceus, erectus, rigidus, alterne ramosus. Folia pollicana, lineari-lanceo-
lata, attenuata, subternata, villosa, inferne subciliata, basi connata, supra lora
lora in dichotomia et apice, solitarii. Calycis foliola lanceolata, striata, acuta.

Carinata Stellana

Habitat ad fectum magellan. Commer. herb. Guss.

Caulis filiformis, teretes, glabri. Folia sessilia, sexfariunguiculata, lanceolata, carinata, acuta, glabra, enervia: rudimenta ramulorum in axillis omnibus. Folia juniora congesta, folus oblongis obtusis, congestis. Pedunculus terminalis, solitarius, uniflorus. Calycis foliolo lanceolata, glabra, obtusa. Petala alba emarginata. Commer.

Stallani

Habitat in Bonania herb. musc.

Caules filiformes, ramosus: rami alterni. Stipulae membranaceae, lanceolatae

habes

gemella *Stellaria foliis subulatis pedunculis terminalibus geminis calycibus acutis*
lobis petalis emarginatis fructibus globosis ^{globosis}

Habitat in Gronlandia subaequator

Planta vix digitalis facie sagina caulibus simplicibus patulis foliis
formibus glabris uti tota planta. Folia ^{crassifolia} inferne aggregata cetera
in repitem fere collecta, in caule plerumque 4-6. remota
crassifolia: Pedunculi terminales gemini uniflori sepalla
res unguiculares altero brevior ^{bracteato} ferus florens.
foliola calycina ovata lanceolata. Petala calyce triplo
majora emarginata magna ratione plantae

Stellaria gronlandica caulibus decumbentibus subbifloris, foliis
linearibus basi pubescentibus, petalis emarginatis fructibus
globosis Rehb. prod. ed. 2. p. 107

~~ante notue biflora~~

biflora *Helleborus foliis subulatis*, ^{scariis} petalis emarginatis, germinibus oblongis calycibus
bracteis Lin. Flor. Suec. 395. * Spec. pl. p. 604 * S.V. p. 422. Flor. Dan.
Tab. 12.

Scypha ramis erectis bifloris Flor. Lapp. 150 *

Alpinae polygonoides, foliis brevibus, flore albo Segu. Vern. 3. p. 177. T. 4
fig. 1.

*Arenaria foliis subulatis, calycibus striatis, germinibus oblongis, floribus
corymbosis* Am. Acad. 1. p. 150

Habitat in alpebus Norvegiae Lapponis

~~an hoc veri biflori Lin. 290. Freyensis in alpebus Norvegiae facies arenaria~~

vel *Schlemmii* magnitudine vana a pollicari ad palmarem

Caules plures simplices, vel basi ramosi diffusi erecti superascentes
proferunt superne. Folia plurima radicalia aggregata subulata

semurquae ulanae glabrae rugulosa caulina minora remota
crassiuscula. Peduncululi laterales solitarii terminales gemini
vel terni laterales breviores bracteis geminis. Coleola calycina

lanceolata obtusa striata

biflora *Helleborus foliis subulatis, peduncululis lateraliibus terminalibusque
bracteis oblongis pubescentibus, calycibus obtusis striatis petalis emarginatis*

arenaria *Hellania* foliis spatulatis, caule erecto bifido, ramis alternis, petalis emarginatis Lin. Spec. pl. p. 604* S. V. pag.

Habitat in Hispania ☉

Radix fibrosa, caulis erectus, teres, spithameus, pilis patulis pubescens. Et subglaberrimus. Rami alterni, longitudine fere caulis. Folia sessilia, spatulata, apice ~~ovato~~, basi versus linearia angustiora, subtus et margine pilosa, supra vero vix manifeste. Primus flos e dichotomia caulis, reliqui ex aliis raporum alterni. Omnes masculi. Pedunculi recti, foliis longiores. Calyx viscosus uti tota planta, apicibus purpureis, uti etiam folia floralia. Corolla campanulata, calyce longior, alba, obtusissima, petalis vix manifeste emarginatis. Stamina alba longitudine calycis. Antherae conulescentes. Germen globosum. Styli tres, longitudine staminum Lin. spec. l. c.

Rapizera Stellana foliis ^{cinereis} lanceolatis ~~subulatis~~, ^{is} spicis unifloris compressis
Habitat Schumaker

Caulis Planta vix digitalis erecta caule pollicari simplicis ^{umbra} ^{statis} vertice
bipollicarum ^{partem} ^{superiorem} subvaginata. Folia lanceolata in decurrantia glabra
pollicaria. Pedunculi terminalis plures pollicares et ultra
erecti. Calycis folia lanceolata margine membranacea

Capsulis oblongis

nemonum *Hellaria folius cordatis petiolatis, panicula pedunculata* ~~var.~~ Lin Flor. Suec
391. & l. V. p. 422. Flor. Dan. 271.

Morus gallens major Brunf.

Alpine major Dodon.

Alpine maxima Lobel.

Alpine altissima nemorum Bauh. Pin. 250

β. Alpine montana hederacea maxima Col. Exphr. l. p. 209. t. 290

Alpine montana latifolia flore laciniato Bauh. Pin. 251.

Habitat in Europa nemoribus

Caulis pedalis. Folio petiolata acuminate, ciliata pollicaria et ultra
subtus pallidiora. Panicula terminalis ^{dentatissima}. Pedicelli glabri post flores pen-
tam penduli, Calyx glaber.

Mijofotis foliis petiolatis, cordatis, tubis Vernis Hall. h. P. 06. a. et b.

variat ~~caulis~~ foliis ^{margine} glabris et villosis et fere nudis

calycibus glabris capsulis oblon-
gi petalis calycis longioribus

2 cordifolia Stellana foliis ^{petiolatis} cordatis acutis, ^{glabris} Pedunculis terminalibus ~~duobus~~
~~longis~~ calycibusque pubescentibus capsulis globosis petalis calycis
^{brevioribus}
Habebat in Insula Bortonio

Caulis caesus nemori. Caulis Dichotome ramis glaber teres.
Folia petiolata patentissima pollicaria sursum sursum maxima
glaberrima venis petioli folio parum brevior pedunculus
terminalis bis vel ter Dichotome diviso. Bracteae ovatae
acutae ad ramificationis pedicelli capillares. Siliola calycina
ovata lanceolata acuta Petala calycis breviora bifida
Capsula globosa

3 *luteo-purpurea*

Hellaria foliis oblongis acutis planis pubescentibus, pedunculis terminalibus
lobis ramis villosis, capsulis globosis ^{intra} petalis profidis

Habitat in Insula Bourbonica

Caules herbacei appendentes semi-pedales sub simplicibus, pubescentes
uti tota planta. Folia sessilia indurissima unguiculata utrinque
acuta. Pedunculi terminalis gemini sub didotomi
pedicelli bifidus nam villosi uti Ver: Cham. piliferis mer. medio bracteati

4 radicans Stellaria ^{lesplibus} foliis ovato lanceolatis pubescentibus, ^{petalis quinque partitis} calycibus ^{sericeis} sericeis
calycibus tomentosis

Habitat in Siberia ^{superne divinis}

Caulis pubescens. folia ^{marginibus scabris} longipollicaria ^{superne} ^{fere} ^{semper} ^{minora}
Pedunculi terminales plures, solitarii in dichotomia uniflori tomentoso
sericeo pollicates, maturitate reflexi. Siliola calycina ovata
sericea

Stellaria radicans: foliis lanceolatis serrulatis, petalis quinquepar
titis lin. S. V. p. 422.
Alpine saxatilis, angusto et oblongo salicis folio, flore albo tenuispa
lacinateo Ann. nat. 183. t. 10.
Alpine foliis salicis marginibus scabris, petalis semiquinquefidis
Gmel. Sib. 4. p. 146.

5 Dichotoma Stellana foliis ovatis sessilibus; caule dichotomo, floribus
solitariis, pedunculis multifloris reflexis Lin. Spec. pl. p. 603
* L. V. p. 422. Smith. Gc. p. 14. V. 14 *

Habitat in Libia. C

Caulis erectus tota pubescenti villosus. Superne dichotomo
ramis semipedalis. ¹⁰ Folia ovata acuta sessilia semun-
guicularia vel minoria integerrima. Pedunculi
axillares longitudine foliorum capsula ovata oblonga

Nalmans

Holoptea Stellaria ^{Linnaei} foliis lanceolatis serrulatis petalis bifidis Lin. S. V. p. 422.

Leucanthemon Dod.

Holopteum Ruellii Rob.

Caryophyllus arvensis glaber flore majore Bauh. Pin. 210

Habitat in Europa nemoribus

Caulis striatus glaber. tetragonus angulis serrulato scabris
folia opposita lanceolata, ^{attenuata} acuminata, sequipollicana margine
subtilissime serrulata scabra. Peduncululi terminalis sive
terni filiformes uniflori lateralibus medio bracteis binis glabri
foliola calycina lanceolata

graminea Stellaria foliis linear lanceolatis integerrimis margine ciliatis floribus
paniculatis

Holostii Ruelli diversitas Lob. Ic:

+ Caryophyllus arvensis glaber flore minore Bauh. Pin. 250

Habitat in silvis juniperetis serebus ^{et roribus} ~~et roribus~~ ^{magnibus} ~~et roribus~~ Carpis
Caulis debilis frutus glaber uti tota planta. Folia angustiora quam
in antecedente pollicaria in stipula opposita, lanceolata hyali
no ad ramificationes. Flores ~~paniculati~~ terminalis paniculati
inferiores in dichotomia simplicis uniflori. bracteo fructu
stipularum sub ramificationibus pedunculati

pallida Stellaria foliis lanceolatis integerrimis, Pedunculis simplicibus
Caryophyllus holopteus alpinus angustifolius purpurascens Bauh. prod.

704. Pin. 210
Stellaria graminea G. Lin. Spec. pag. 604. Flor. Dan. 415
Habitat in Alpibus Norvegia, Gronlandia

Creita digitalis et patum ultra inferne ramosa ramos filiformibus
finitis. Folia pallide viridi uti tota planta. Folia sessilia lanceolata
semurquiculata inferne frequentia, superne remotiora. Pedun-
culi ^{uni} ^{flori} ^{pollicari} terminales solitarii vel terni. Bractea bina ovata acuminata
margine hyalino. Petala calyce longiora bifida

Hypericifolia ~~Stellana~~ foliis ovato lanceolatis ^{retundulatis} integerrimis, pedunculis solita
nis ~~Weber Panz. fl. Holf. n. 364~~ paniculatis ramis que
Anagallis aquatica IV Lobel. p. 467.

Alpine hypericifolia Vaell. Bot. pag. 9

Alpine foliis gramineo, angustiore, palustris Zell. append. ~~pro~~ Catal. Ges
p. 50.

Alpine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petalis unifloris Hall. h. P. P.
Stellana graminea B. Lin. Spec. pag. 6. 04 Flor. D. tab. 414

Habitat in uleynosis ~~sel~~ ^{sub} ~~nitiditate~~ ^{debilis} ~~causa~~ ^{sub} ~~terrena~~ ^{pallida} ramosa. Folia ^{glauca} ^{angulata} ^{sub} ^{repota} ~~superne~~ ~~remota~~ ~~qu~~ ~~ovato~~ ~~lanceolata~~
inferne ~~appropinquata~~ ~~superne~~ ~~remota~~ ~~qu~~ ~~ovato~~ ~~lanceolata~~
fenuisquidulana. Pedunculi terminalis ^{et} ^{lateralis} ~~terminalis~~ ~~uniflori~~
flor. ^{longi} ^{bracteis} ^{ovatis} ^{acuminatis} ^{marginis} ^{hyalinis} ⁱⁿ ^{multo}
lateralibus. Petala calyce ~~re~~ longiora Calyx ^{sub} ^{stratus} ^{floris} ^{mis} ^{mis}
foliis brevioribus, fructu ~~caule~~ ~~differt~~ ~~a~~ ~~graminea~~ ~~per~~ ~~quam~~ ~~in~~ ~~gram~~
folias latioribus brevioribus, minime attenuatis differt a graminea

paniculati

Stellana aquatica foliis lanceolatis petalis bipartitis calycem
longitudine ^o ^{quantibus} Poll. h. 422.

undulata *Hellania* foliis lanceatis undulatis, caule angulato decumbente,
floribus axillaribus

Hellania undulata foliis oblongis undulatis, caule angulato, floribus
axillaribus

Habitat in Japonia et novaezelandia

Caules tenelli filiformes palmato ramosi. Rami angulati erecti,
glabri. Folia sessilia acuta, glabra internodiis breviora semi
unguiculata. Flores axillares et terminales bini vel terni
pedunculati. ^{trijugis} Pediculi capillares ^{unijugis} foliis longiores

non Varietas *hyssopifolia*

humifusa Stellaria foliis oblongis, pedunculis lateralibus terminalibusque uni
floris, caulis petalis bipartitis caulebus diffusis
Stellaria humifusa caulebus pluribus in orbem spithis procumbentibus tetragonis foliis
oblongis, petalis ovatis apice connatis
act. Havn. p. 447. t. 4. fig. 14

Stellaria humifusa caulebus diffusis procumbentibus foliis ovatis
floribus solitariis breviter pedunculatis, petalis bipartitis, cau-
lebus diffusis procumbentibus Retz. Prodr. fl. Scand. 1. n. 480

Habitat ad littora maris Finmarkie in gramenosis

Caules filiformes ^{procumbentes} diffusi purpurascetes ramosi. Folia supra
glaberrima cuspidata utrinque acuta, integerrima vix fere
interdum connatis ^{utrinque sub flore imbricata} unguicularia. Pedunculi breves longitudine foliorum. Petala
ad basin usque fere diversa longitudine calycis

Stellaria humifusa foliis ovatis subpetiolaribus, caulebus procumbentibus
tetragonis, pedunculis solitariis abbreviatis Sw. in act. Holm. 1789. pag.
125. tab. 6. fig. 17

Cera stoides ^{linear} *Hellana* ^{subsecunda} *foliis lanceolatis, serratis pedunculis bifloris viscosi* ^{unifloris calyce busque calycisque villoso subnullo}
Hellana *cera stoides* *foliis oblongis pedunculis subbifloris* *Lin. Fl. Suec. 3947*
S. V. pag. 422 Smith. Ic. plant. p. 1. pag. 15. Tab. 15.

Hellaria

Flor. Dan. Tab. 92.
myosotis foliis glabris lanceolatis, petiolis infractis *Hall. herb. 890*
Cerastium retractedum *All. fl. Ped. n. 1720.*

Habitat in alpidibus Norvegiae, Lapponiae, in maritima

Caulis procumbentes, diffusi, saepe semipedales, ramosi, glaberrimi
folia lanceolata, ~~vel oblonga~~ ^{linear} secunda versus apicem parum incurva
glaberrima, integerrima remota. Pedunculi terminaliales plerumque
tres pollicares, villosi viscosi, laterales medio bracteis binis oppositis
lanceolatis. Soliola calycina lanceolata, margine membranaceo hyalino
basi villosa viscosi. Petala calycis majora tria semibifida. Styli 3 inter
dum 5. Capsula ovata calycis dimidio longior glabra

Cerastium trigynum *Villars prospectus*
retractum allioni

Stellaria

Cerastoides Stellaria foliis oblongis, pedunculis subbifloris Lin.
cum Synon. Haller
S.V. pag. 422.

Cerastium refractum Allion. fl. Piedmont. no 1720. Fide
~~et de Stellari~~
specimens ~~et~~ a Celeb. vno ~~et~~
~~et~~ ~~de~~ misum

Cerastium Trigynum. foliis linearis ellipticis hirsutis; caule suberecto
bifloro, flentibus Trigyni Vell. fl. Delph. 3. pag. 645. tab. 46.

1651
a. Sc. africana affat caule hirsuto
a Stellaria edulis munita papave extyphano maximo cupo fante
goffe vincta

2273.

Scabiosa *Scabiosa* ^{corollis rad. caulis} foliis inferioribus ^{coniciis} petiolatis oblongis serratis, caulis superioribus
~~lyrata~~ ^{lyrata} ~~pinnatis~~ ^{pinnatis} ~~caulis~~ ^{caulis} ~~herbaceo~~

Scabiosa *lyrata* foliis radicalibus oblongis ovatis; caulinis pennatis

Corch. descr. p. 203.

~~herbaceo~~ ^{herbaceo} ~~caulis~~ ^{caulis} ~~erectus~~ ^{erectus} pedalis simplex *stratus*, pilosiusculus

Folia caesepi pollicaria supra glabra subtus venis pilosa inferiora petiolo oblonga in petiolum folio dimidio breviora depraectis grosse obtuse serrata superiora sessilia pennatisfidia laciniis lanceolatis extrorsum latioribus dentato incispi terminali maxima oblonga

Pedunculi terminales solitarii elongati aphylli pilosi unisplon

Pentanthon commune octophyllum foliolis lanceolatis basi tomentosis longitudine corollae proprium sulcatum angulatum breve 12-14 dentatum ore purpureo interioribus quinque partibus laciniis sifetaceis corollatis parum brevioribus purpureis

Corollulae extus pilosa

Paleae lanceolatae longitudine calycis breves

Corona seminum multi-dentata

uniflora L. foliis subulatis oppositis, pedunculis alternis unifloris
calycibus subherpatis, petalis emarginatis Walt. fl. Carol.

p. 141.

Habitat in Carol.

non vidi

Dilleniana. P. foliis linear lanceolatis, caule flatido, pedunculis
terminalibus bifloris Moench. fl. har.

mehe yata

Crusifolia S. foliis ovato lanceolatis crassiusculis, pedunculis uniflo-
ris & dichotomia caulis, floribus erectis, corollis calycis longioribus,
capulis reflectis. Ehrh. her. magaz. 1784. n. 8. p. 117

non vidi

uleginosa L. foliis lanceolatis basi ciliatis angustioribus, caule diffusis proce-
bente ramosissimis pedunculis ternis intermediis unifloris, lateralibus
dichotomis paucifloris Roth-flor. Germ. 1. p. 191.

non vidi

bulbosa. foliis lanceolato-ovatis, caule subdichotomo, pedunculis
elongatis unifloris, radice repente bulbifera. Taiqu. coll. ?
pag. 21.

non vidi