

# Hemodia

1. montana L. foliis lanceolatis sessilibus ~~alternis~~ oppositis alternis que  
undique <sup>perpetuis</sup> nudis, utis brevissimis axillaribus
2. nederalis L. foliis oblongis petiolatis, floribus axillaribus oppositis
3. camphorata L. foliis ovatis petiolatis oppositis, floribus racemosis

Kamphorata Steenod -ymb. vol. 2.

lege Dodaria in via loco onestale  
eodem loco et filiatione <sup>lege</sup> aspicatione



aromatica *Opuntia foliis lanceolatis serratis sessilibus, pedunculatis unifloris*  
*caulibus fistulosis suberectis* La Mart. F. Enc. pag. 54  
Manga nani Rheed. mal. 10. tab. 6  
Habitat in India orientali

*Stemodia trifoliata* Michx.

Campestris. Hemodia

Wal ghona kola Zeyl.

Habitat in Zeylona Konig herb. Royeni

Caulis sesquipedalis, erectus simplex, hirsuto tomentosus. Folia sessilia, plerumque 4 no  
verticillata, superne terna. Ramuli axillares, simplicissimi, superne foliosi, foliis opposi  
tis. Flores terminales in capitulo.

Rain Yumbu Rheed. Mal. vol. X. Tab. 93.

Herb. Zeyl. no ~~412~~ 413 habeo



• *Duranti folia* Remod. foliis ternatis connatisque, floribus subternis subsessilibus  
Sw. obt. pag. 221.  
• *Capriana* *Duranti folia*

Trifoliata Hemodia foliis inferioribus multifidis capillariis super  
ioribus lanceo-ternatis lanceolato serratis

Habitat in agris India Orientali in Rottler.

Caulis pedalis articulatus teres glabris superne apice divisis  
in ramis quatuor aequalibus floris. Folia inferiora ~~causa~~  
3. ~~et~~ <sup>submersa</sup>, myrsophylli, <sup>polliciana</sup> approximata superiora remotiora  
inferiora minora superiora majora vix polliciana  
trinerviâ serratis minutis acuta basi versus integri  
ma serratis oculo armato utraque punctata. Flores  
speciatim parvi alterni lobis folium ovatum magis ne  
calycis. pedunculus angulatus

Procola malabonice aquatica foliis ternis serratis  
herb. Mus.



*amplexicaulis* Hemodia *amplexicaulis* foliis lanceolatis <sup>oppositis</sup> extorsum serratis

~~foliis~~ pedunculatis <sup>aristatis</sup> foliis longioribus

Habitat in India orientali

Caulis herbaceus, erectus, sesquipedalis tetragonus, glaber  
tenuis, compositus, rami alterni simpliciter, folia oppo-

sita *amplexicaulis* pollicaria lanceolata basi  
velata extorsum serrata acuta glabra avenia. Pedun-

culi axillares solitarii capillares longitudine foliorum uniflori  
calyx 5-partitus laciniis lanceolatis aequalibus bilobulatis. Corolla

lemnea *emarginata* stylus persistens. Stigma obtusum  
craspedulorum.

Mantima Stemodia foliis lanceolatis sessilibus

Stemodia mantima Lin. Lo. pag. 573. am. ac. ad. S. p. 399 + S. V  
pag. 573.

Scodum maritimum fruticosum procumbens Roan. hist. 41.  
p. 175. t. 110. fig. 2.

Stemodiaca mantima odorata, foliis minoribus sessilibus denticulata  
to hastatis, floribus solitariis alabris Brown. jam. 26. t. 22.  
fig. 2.

Habitata in Gamaria. ♂  
Caulis erectus tetragonus leviter pubescens apicibus  
rami copiosi alteri simpliciter erecto-patentes. Solia sessilia basi subfagittata  
viscosa frequentissima acute serrata unguiculata villosa. Pedunculi  
axillares brevissimi solitarii uniflori.



camphorata Stemodia foliis <sup>gratij</sup> ~~lanceolatis~~ <sup>reticulatis</sup>, floribus <sup>subpinnatis</sup> racemosis.

Ghorakola Her. m. mas. eyl. pag. 1.

Habitat in Regione Honey

Caulis herbaceus, erectus, pedalis, <sup>simplex</sup> pubescens, inferne teretis superius triangularis.

Folia opposita, sesquipedalana, in angulo attenuato angulo <sup>acuto</sup> superiore angulato <sup>anguste</sup> in aequaliter fenato, vel in aequaliter fenato, inferne basim integerrima, supra in pelosa in specimine basim in aequaliter fenato.

Racemus terminalis, erectus, sphaeromus. Flores oppositi, in alio specimine inferne alterni, superne conforti, breviter pedicellati.

Bracteae lanceolatae, infernes fenatae, superiores integerrimae, longitudi calycis longioris, pubescentes, ut reliquae.

Laciniae calycis lanceolatae, ut corolla explicata nequa.

Corolla in tribus sub trifida in Honey

varietas datur foliis angustioribus, basim integerrimis ut in aequaliter fenatis; specie non diversa secundum Ceb. Honey

Dodardi orientalis <sup>Linnei</sup> forte eadem planta

Niderialis Remodia foliis <sup>oblongis</sup> ovatis petiolatis floribus axillaribus oppositis

¶ Remodia niderialis Gardn. de fruct. pag. 243. ~~tab.~~ tab. 52.

Habitat in India Orientali. 3 1 2

Caulis herbaceus, erectus, squithamovus, pubescens; obscure tetragonus inferne ramosus; rami simpliciter semi-patentes s. p. longitudine caule breviores.

Folia opposita, petiolata, ovelliana vel minor, obtuse serrata, dentata, pinnosa, nuda, obtusa, basi acuta, integerrima. Petiolus filiformis, longior folio brevior.

Peduncululi axillares, solitarii, uniflori, lineari, pubescentes.

Calyx pubescens.

¶ Remodia niderialis, foliis ovatis serratis petiolatis Retz. obs. fasc. 5. pag. 25