

Sterculia

1. balangkai s. foliis ovatis integrerimi petiolatis, floribus paniculatis
2. plataniifolia s. hermaphrodita, foliis cordatis lobatis, floribus paniculatis
3. wira s. hermaphrodita, foliis ovatis trilobis ve, floribus paniculatis; capi
li quinque
4. foetida s. foliis digitatis

notata e Tava Commerci herb Phu Gia s. petala decolor

Canibus Herbulia

Habitat in America herb. Surinam

Rami crassiflò pollucis. Solca petiolata, alterna, fructuosa simplicia, oblonga,
basi orata, acuminata, integerrima, pubescens, utrinque glaberrima, subtenuis
sa, supra nitida, subtus glauca. Petoli 3-4 pollicares; apice incrassati. Flores in
apice. Calyx flavescenti, non erat op.

Sterculia

Guina pruriens Aubl. fl. Guanen.

Habitat in Guiana herb. Fiss.

Rami cicutariati, glabri. Solea versus apicem rameum fraser, Triplacana, ob longo, orata, acuminata, Trinaria, venosa, glabra, integerrima. Petiolis folio longior, Verete basi panum latere, versus folium canaliculati, ut rasore.

cordifolia *Pterocarya*

Habitat herb. Iuf.

Rami crassitiè penna ariennio, fodi de cinerei e tomento venuis firmis. Sola alterna,
distantia, palmata et ultra, venosa, supra glabra, subtus tomento venuis firmis, intima
vel obliqua vel loba. Petioli bipolluari, incani. Capitula bipolluari, den
se villosi, flavercentes.

anno folia Stiraria

Habitat in Tava Commerce. herb. fus.

Rami veretis; ferrugines tomentosi. Folia pediolata, alterna, spatulata, oblonga, basi ovata, inferne versu sensim panum angustata, acumine brevi obtuso acuminata, in cerasina, supra glabra, levia, obscurae venosa, subtus revoluta, venosa, ferrugines vellosa. Pediali vix pollicares. Racemi in apice. Pedunculi vix semi pollicares, crassi. Capsula bi pollicares vel panum ultra, ferrugines tomentosi, semi pollicem lata, acumine subhamofo vermifera.

nitida Sterilea

Habitat in Africa sub. Gus. 5

Rami teretes, glabri, ex striatis. Dolia peltolata, alterna, 5-6 pollicia, ellip-
tica, basi versi sensim angustata, acumine unguiculato. Terminata, integrer-
e, venosa, nitida, nitida, basi acutiora. Tuberulum spinosum in axille.
Racemi infrafoliaci biflori pollicares. Pedicelli unguiculares. Calyx com-
paratus: laciniae rotundatae, acutae vellosae, coriaceae. Petala nulla.

acuminata. Herula foliis elliptico lanceolatis, basi obtuso, racemis compo-

situs

Habitat in Java herb. Richoni.

Rami glabri. Stola petiolata, subpetiolata, interdum acuminata, acuta,
interdum absque acumine obtusa, uti basi, inferne rufa, parva angustata
serosa, supra nitida. Racemi infrafoliaci, composti, pedunculi & pedicelli sub
pulvrenti: pedicelli opposti, distantes, inferiores 3-5 florae, superiores uniflo-
ri, patentissimi, capillares. Calyx laevis lineatus. Flores parvi minores
quam in balanghas. am modo epo varietas

macrophylla *Harcinia* foliis cordatis subtruncatis velloso pubescentibus, capsulis interius
glabris

Habitat in India orientali? herb Rush.

Rami pollici crassiores, glabri, orbiculato confertim cicutinatis. Solia ad
apicem, fere pedalea, integerrima, obtusa, venosa, supra oculo armato vil-
losula. & nucleus oblongus, subquadrangularis, venosus sine vomento pice. Semina
rara, confit cum *Hari*: cordifolia

frondosa. Sterculia foliis ellipticis obtusis sumis nitidis, floribus paniculatis

Sterculia frondosa

Cat. Soc. Hist. Nat. Paris.

Habitat Rajanno hact. Richard.

Dolia pedicelata, & que pollicano, pollicet & lata, venosa, supra nitida, subtus
nervis nitidis, inde gemina, ut unque oblonga. Panicula erecta, terminalis tormento-
sa: Calyx laevis lanceolata, angustiularis.

nita a Sterulea

Habitat Capena heb. La Martre.

Rami Tereter, glabi, crispi, penne cyaneo, cicuticoli. Dolea versus apicem con-
fertus, petiolata, quadripollucaria, oblonga, simplicia, integerrima, utrinque oblique
mucrone brevi terminata, utrinque glabra, supra nitida, tenuissime obfusa veno-
sa, subcostata. Petioli sesquipollucari. Flores paniculati, uti pedunculi per
penne tenuissime tomentosi. Pedicelli sparsi. Calyx et Lacuna lanuginosata

macropyllea *Vestulca*

Habitat in Africa Beauvois Herb. Aus. 5

Rami ^{innervia} ^{tenuia} vestitus, glabri. Dolia versus apicis ramorum, longe pedata, pretiosa et ultra,
trifida, basi versus super angusta, obtusa; lobi laterales ovatis lanceolati, inter
medio oblongo, attenuati, grossi crenati, venosi, et rursum glabi. Racemis
moniles, prolixare, villosi. Flores parvi. Calyxis laciniis subciliatis.

graadiflora Sterculia

Habitat in insula Francia Pommer. herb. Guss.

Rami teretes, consistit perennis lignis. folia petiolata, alterna, pinnatisecta et ultra, elliptica, acuminata, fere pollicem longiora, inter gemina, puberula, venosa, nitida, supra coria, subtus venis et glandibus. Pedunculi laterales: pedicelles pellucido velloso. Flores paniculati: pedicelli versi apicem attenuati; bracteis duobus linearibus. Calyx laevis ovato-lanceolatus, puberulus, pulv. venulento, trinervia, acuta. Corolla semipollicem et ultra. Stamena non vidi. Germinal inconspicua. Style squame, recurvata, glabri

Avra Herc. hermaphrodita, foliis ovatis trilobis, floribus paniculatis, capsulis
quinq[ue] lvi. prod. pag. 90.

Avra pinniens Aubl. fl. Gu: 694. tab. 279.

Habitat in India occidentali;

arbor ex celsa ad summam tam ramosissimam. Tola alterna, ampla
ovata acuta superne vnde pubescentia tomentosa appara, rufescens
nigra, integerrima, longe petiolata. Stipulae breves, deinde
etrigono. Flores terminali, paniculati: Rami et pedunculi ad basin
quamula mutati, paniculo plures alternatum fit et infra gemman
foliosam Aubb.

Rami teretes glabri, consistit per uno cygnos. Tola superne approxi-
mat, petiolata 14 pollicana, orato oblonga, integerrima, acuta,
superne nitida, arcuata, subtus subtomentosa, subcostata, simpliciter
venosa. Petoli bipinnati aciculares, apice cuspides. Pedunculi superne
contigui, longitudine foliorum, ferrugineo tomentosi. Flores in ca-
dam complicit. Calyxas lanceolatis, tomentosis angustioribus.

Falanghas L. folio ovato integerrimo petiolato, floribus paniculatis
Lin. S. C. Zeyl. 350. Spec. pl. p. 1430 & L. V. 866

Pavalam Rheed. mal. 1. p. 89. tab. 49. Rajahst. 1794.

Clompanus minor Rumph. Amb. 3. p. 169. Tab. 107.

Habitat in India.

Rami cortece cinereo. Sola petiolata palmata glabra
ovato-oblonga. Pedunculi terminales ex ultimiis at illis
foliis breviori pubescentes flore paniculati. Raceme
coniciflora reflexa linearis purpureo-purpureo-erubescens revoluta est his
pulvinulento tomentosi canescens

Sola oblongo-ovata, ut unque rotundata, venosa glabra, 3-4
pollicaria. Pedunculi parvulari racemosi, tomentosi, 2-3 flori. Flori.
pedicellati. herb. Herm.

— oblongo ovata

oblongo ob-
frondosa Herculea foliis nra sumonitate prostrime congestis ~~conatus~~ ~~ova~~
~~si dentato~~ tis obtusissimi subrepens globis lucidis paniculis
atellanibus longe pedunculatis Act. Soc. h. n. Par. 1. pag. III
Habitat in Amer. merid.

non vidi

Caniolata S. foliis Caniolati integerrimi, femineis paucis Cavan.
Obs. f. 5. p. 287. n. 416. tab. 279.

non vidi

cordata s. foliis cordatis acuminatis septentrionali; capillis extus
tomentosis inter lippia Paran. Br. 5. p. 206. tab. 143. fig. 2.

non vidi

platani folia s. hermaphrodita, foliis cordatis lobatis. floribus panicula
lis Hen. Suppl. pag. 423. * S. V. p. 866 Symbolo Botan. pag
Quelhamia Dorth de pr. pag. 96.

Habitat in India, Arabia;

arbor folia ad apicem ramorum conseruo longe petiolata
integerrima, interdum integra species tri. f. quinqueloba
glabra nervosa, venosa. Panicula magna pulvrenacea
tomentosa. Flos Hen: foetido minor. Calyx laevis intus
glabra. Columna staminum calyce brevir, terminata anthe-
ris plurimi ovatis, que regunt basin quamvis columnas copias
germen angulatum canum. Stylus filiformis curvus

Platani folia *Herculea* *hermaphrodita*, *foliis cordatis lobatis*, *floribus paniculatis*
Culatta L. S. Vey. pag. 366

Culhamia *Torffii*. Defit: pag. 96. ~~us 100.~~

Polyem ut Corollam consideravit Torff. Panicularium
singularare est, madum longitudinaliter a se in vicem discedens
Circulariter quoque, quo in Volvem Capsulas horizontales
affabant figura folliculorum Asclepiadi, superne futura
longitudinaliter dehiscent, ora rotunda his peda, femina simpli
e serie ad latera futura affiguntur. Flores quotannis
sub die Patavio

Solia hujus sub nomine Hibisci simplicis in Herbario
Lennaei conservantur. Cum in locis botanicis Europeo
borealis florere ceperat, ob habitum ad Hibiscos rela
tis Lennaeus, flores enim nonqueam videt virgilius.
utique satatur in Speciebus plantarum pag: 977.

Hic claudatur igitur Hibiscus simplex in Syst. Vey.
et Speciebus plantarum cum eadem planta est ac Herc. platanifolia

foliis digitatis 8l. regl. 349. LV

Nant Rheed. malab. 4. p. 75. Tab. 36. Raj hot 1564.

Companus major Kramph. Amb. 3. p. 168. Tab. 107.

Habitat in India

Tolka septena Lanceolata ^{glabra transversim nervosa} ~~aduncata~~ subequalia integrer
n ^{attenuata} mag. bsp. acuta, spolia. Pedunculus apice inter folia hispida
flores ~~pro~~ racemosi laevis corollo lanceolato reflexo
extus pulvrenento inter hispi. Columna staminum
longitudine ferre corollo. Germen hispitosum, Cincta bsp.
anthers floris stylis hispitosus reflexus. Stigma acutum

new St. foliis quinque lobis attenuatis subtriangularibus,^{huc em. decomposito} panicula terminali
diffusa puberula et glabra florifera plana excurrente, glomeris
polygami Prothibgh. Plant. Peruviana p. 24. Tab. 24.

Habitat in India orientali 5

non vidi

~~Ulofo M. Tomento~~ sag foliis oppositis ovoidi venosi, paniculis terminalibus: pedi-
cello bif. trifloris len. Pepp. p. 342. & S.V. p 699
~~Lepidopeltis~~ Lepidopeltis celestum ~~dog~~
Habitat in Tahiti

colorata St. foliis squelobus vellosis lobis acutis, panicula terminali coarctata
rufescente pelosa georgius hermaphroditus
Habitat in Paroandal 5

non vidi

~~Cauda M. glabra, foliis oppositis ovatis venosis, paniculis terminalibus: pedicellis
oppositis bifloris Lin. Suppl. p. 342 +~~

~~Leyssnerium collenum Tost.~~

~~Habebat in Nova Zelandia 5~~