

Stipa

Stipa pennoides dedit Thunberg & Coll. Cinnamom. pithameum flos calis rubroscandis

barbata Stepa

Habitat in Cardina Reichard

habes

*juncosa* Schpa

Habitat in Carolina

Herb. no. 1.

Stipa

Habitat Herb. Thauri.

Calami geniculis infractis. Solia subulata, glabra. Panicula simplex.  
Calyces lanceolati, fovea longioris, dorso villosi. Semen oblongum, basi  
villosum, oculo armato punctatum <sup>reticulatum</sup>. Arota longa, inferne villosa.  
superne glabra.

*Jericea Stipa*

Habitat in Carolina Richard

Gluma exterior bisulvis valvula exterior longissima aristata: Arista  
cristis 2. laterebus.

habes

tenuiflora Stepa

Habitat in Monana herb Thonni

Culmi plures erecti, pedales, tenues, glabri. Folio lineari, glabro. Panicula terminalis subcompita. Calycis lineares, femine breviores. Lemina linearia basi villosa, apice hispita, austa femine duplo longior fere pollicari, nuda

*Stipa*

Germen speciatum aristis longissimis donatum Tournef. Cor. pag. 39

Habitat in Galata herb. Tournef.

Culmi teneri, glabri. Folia subulata, superiora bipollicaria, glabra, involuta, supra  
villosula. Ligula lanceolata, membranacea, panicula patens, aristis, uti corol  
la villosa tomentosa

*micrantha*. St. aristis feminibus glabris, calycibus longioribus ne feminum, panicu-  
li contractis

*Hypomicroantha*: aristis nudis: panicula spiciformi: seminibus glabris: foliis  
sternatis planis; geniculis rubro fuscis Cavan. Ic. 5. p. 42. tab 462. fig.

2  
Habitat in nova Hollandia

Culmus sesqui-pedalis, gracilis, erectus; geniculis 3-4 rubro fuscis. Folia plana  
inferiora tri-pollicaria superiora breviora. Vagina sternata. Panicula angusta  
4-pollicaria, ramuli breves inaequales. Calycis velut acuto albido, inaequalis. Corolla  
calycis aequalis. Cavan



eminens St. aristis nudis, seminibus tomentosis calycibus subaequantibus

*Stipa eminens*: aristis nudis; seminibus tomentosis: foliis striatis. Cavan. Ic. 5.  
pag 42. tab. 467. fig. 1.

Habitat in regno mexicano

Culmus tripedalis et ultra, glaberrimus, foliorum rugosis sp. scitis. Folia  
plana, pedalia. Vagina striata. Panícula laxa, pedalis: pedunculis plures  
et eodem puncto, inaequalis, capillares. pedicelli sparsi, uni s. biflori. Calycis  
valvulae inaequales corolla paucis longioribus. Anthera sesqui pollicari, versus  
medium flexa.

Humilis *H. flosculorum* <sup>sp.</sup>, calycibus femine longioribus, anthesis <sup>medio</sup> basi pennatis  
*Hepa humilis*: anthesis prope basin pennatis. floribus spicati pedunculatis  
calycibus femine triplo longioribus. *Barba* *9c. 5: pag. 41. Tab 466. fig. 1.*  
Habitat in insulis mactovianis  
Culmi plures, 4-6 pollicares, Tenues, glabri. Folia convoluta, radice  
plura sesqui pollicaria, 3-4 in culmo, supremum culmo altior. Vagina  
suprema spathacea. Pedicelli breves glabri. Valvula calycis angusta  
femine triplo longior. Anthesis longa inferiora ~~superiora~~ versus median-  
pilis albidis pennata. Germin. linear

barbata Stipa panicula. Cæva elongata, antheris longissimis totio: bar-  
batis, foliis rigidis Desfont. fl. Atl. pag 97. tab 27  
Habitat in collibus Barbano 4

*parviflora* Stipa panicula diffusis, aristis nudis capillaceis  
foliis radicalibus filiformibus rigidulis Desfont  
fl. atl. par. 4 p. tab. 29.  
Habitat in regno Tuncetano 4

Copenhag. *Stipa arctis basi pilosis, panicula spicata, foliis ensiformibus* Thunb  
prodr. fl. cap. pag. 19.  
Habitat in Cap. b. spi.

avenacea Stipa aristis nudis, calycibus fermen squantibus Lin. Spec. pl. p. 116x l. V.

pag. 121

Andropogon folio superiore praethateo, pedunculis lateralibus oppositis uniflo-  
ris, aristis flexuosis Gron. Virg. 133.

Habitat in Virginia

Culmi tenues. Eorum summum verticillatum longitudine panicula. Panicula  
pedunculis conjugatis, unifloris. Calycis gluma uniflora, pallida  
bivalvis aequalis. Corolla aristata terminalis, contorta basi articulata  
nuda, longitudine pedunculorum. Gramen hoc Avena Sativa minus  
est. Lin. l. c.

— contorta

non vidi

capellani *Stipa panicula* capillacea effusa, calycis  
lobis triplo brevioribus antheris nudis La Mart. P. Enr.  
pag. 158.  
Habitata Carolina

in his synoche

*Stipa panicoides* panicula angustata pauciflora, antheris nudis calycis  
triplo longioribus femine cartilaginea La M. T. Enr. pag. 158 e mente  
video eadem fort ac symb bot

*Stipa stricta panicula elongata angustata pedunculata arti-  
culata stricta pmi, aristis mediis subflexuosis La Mark*

Tab. Linc. pag. 158

Habitat in Carolina  
Favet Andropogoni

*avena sibirica species Krop. p. 2. In La Mark*



Utranea f. Hypo antheridi rectis, calycibus febrifis femine Congiombus. La Mark

T. Eni. pag. 157.

Tersa quett. man. 1. Tab. 1. 2.

Habitat in Utranea.

qua nota a juncea differt?

membranacea. S. pedicellis dilatatis membranaceis L. Spec. pl. p. 116.

Habitat in hispania

Gramen vix pedale facie avenae. Panicula simplex vix subdi-  
vifa laxa debilis. Pedicelli membranacei, anisopteri, obtu-  
siusculi. Calycis anthera longitudine antherae corollinae hinc

aristella Aya aristis nudis rectis calycis six duplo longioribus Linn. S. Nat. 3. p. 229.  
S. V. p. 121.

Habitat Monpelii <sup>in</sup> ~~in~~ involuta ~~sepalata~~ <sup>in</sup> ~~in~~ culms  
Palmi bipedales <sup>bi</sup>! ~~folia~~ angusta. Panícula subpinnata: Pedunculi bi  
f. triflori. Calyx longitudine seminis. Semen teres, raris villis pubescens  
Arista calycis longitudine. ~~haec dimidio longioribus~~

juncea L. antheris nudis rectis, calycibus semine longioribus, foliis inter lobos  
Linn. V

*Festuca juncea* foliis Bauh. pin. 9. Theatr. 143. Scheuchz. gram. 157.

Habitat in Helvetia Gallia &

Caumi sesquipedales erecti glabri vaginis foliorum rectis rigidis  
sicuti folia involuta pubulata. Panicula semipedalis  
erecta. Calycis valvula pubulata altera dimidio longior. Semina  
basi profertim villosa antheris tri vel quadripolllicariis capsula  
ica.

capitata s. antheris nudis curvatis, calycibus femine longioribus, foliis undasim-  
bentibus. Len. spec. pl. p. 1164

Testacea. Longispinis antheris Bank. pen. 10. Theatr. 153.

Habitat in Germania, Gallia

Similis s. penica, sed folia non vereta sulcis longitudinali, sed  
rigidiora breviora, minus fiabra, latere superiore magis ex plana  
ta et subpubescentia. Calyx non albidus sed spadiceus. Anthera  
brevior. Et adulescentes vixi curvato Len. solum supremum  
spathaceum Culmum tripedalis. Panicula pedalis

Spicata 1. aristis seminibus, floribus spicatis Lin. Suppl. pag. 111. 4 p. v.  
pag. 121.

Habitat in Cap. b. p. p. <sup>seguipedale</sup>  
Radix repens, Culmi plures folia graminea in pennis culms  
baria. Spica angusta, longitudine ut digiti. Flores sesquiflori ut  
nubescens basi vellosi. Antha terminalis ut digitalis tota  
velosissima extra torporem lani Lin

non vid.

arguens L. antheris nudis, bracteis basi barbatis, glabris, glabris, glabris  
rei. pag. 1174  
Gramen Ethiopicum panicula molli vespere Pluk. 176. t. 300

fig. 1.  
Gramen arguens Kumph. amb. 6. p. 15. v. 6. fig. 1.

Habitat in India

culmus filiformis erectus glaber. Sclea convoluta supra  
spathacea. Pedunculi <sup>et e vaginis superioribus geminis subis</sup>  
peltatis floris fasciculati masculi et foeminei solitarii  
vaginae basi vaginis spathaceis fasciculati peltatis  
antheris foemineis antheris longioribus  
facile ita convenit cum Anthipura & facile eadem crederem





4-5 paleacea Arya <sup>Arya</sup> aristis feminis, panicula simplici, foliis convolutis  
subulatis intus pubescentibus

Arista paleacea aristis contortis tomentosis, calyce multo longioribus,  
glumis subulatis Coir. et. 2. p. 145

Legi passim Tureti, in Aegypto legit Dorskalceus

caer Arya juncea

Culmi plures, sesquipedales, simplicissimi, erecti, foliis vagina  
ti.

Folia radicalia copiosa, ~~et~~ subulata, rigida, bipollicaria: Culmi  
terna, longiora, ultimum spatiaecum, culmo altior. Vagina  
frenata, ore barbata, margine ciliato.

Panicula spithamea. Spicula plures ad singulum dentem  
pedunculi communis

Calyx valde attenuatus, femine triplo longior, glaber

Corolla valvula exterior pilosa, ciliata. Arista palmari, ultra  
medium valde torta et pilosa

(Planta Dorskalcei differt modo vaginis et foliis radicalibus etiam  
estibus pubescentibus)

Stipa Tenacissima differt panicula contracta, aristis triplo brevioribus,  
<sup>in pennis, tortosis</sup> foliis rigidioribus longioribus, <sup>ut nunc glaberrimis</sup> vaginis subtilissime striatis, folio ultimo  
non spatulato, ore vaginarum lanata, ~~an~~  
~~differt a Stipa Tenacissima.~~

Seneciojma L. antheris basi pilosis, panicula pinnata, foliis filiformibus Loeef.

N. 110.

partum herba Plinii Plin. hist. 2. p. 220

Gramen spardeum panicula comosa Bauh. pin. 5.

Habitat in Hispania collebus arenosis &

Calmi plures sesquipedales erecti. Vertices vaginis foliorum

vehi tenacissimi vaginis subtilissimis fructi. Folia involuta

subulata, <sup>semine conyoni</sup> Panicula terminali pectinata coarctata

ta. Calycis valvula <sup>semine conyoni</sup> lamellosa & attenuata altera parva

longior. Semen villosum arista basi lanata geniculata

geniculatis calycibus semine conyoni

pennata l. aristis lanatis Len. h. V.

Spartum austriacum Clus. hist. 2. p. 221.

Gramen spartheum pennatum Bauh. pin. 5: theatr. 70

Habitat in Austria, Gallia, Sicilia &

Culmus bipedalis erectis panicula <sup>spithamea lobi glabra</sup> corymbata calyces lanceola  
to aristis longissimis basi toto toto lanatis folia involuta

alca sub nomine strapo uirgineae calyibus multo longioribus  
Coctenium simile ex horto Parisiensi

*Lemnaca* *S. panicula* <sup>semine congruente</sup> *coarctata* *calycibus* *scabulatis* *anthesis* *tortis*  
*basi* *villosis* *foliis* *setaceis*  
*habitat* *in* *Babona* *et* *oriente* *Torpha*  
*culmi* *flexi* *adscendentes* *pedales* *vagina* *foliorum* *seiti*  
*Folia* *plurima* *radicalia* *setacea* *bi* *tripollicaria* *culmi*  
*duo* *supremum* *vagina* *prothaca* *calycis* *foliola* *setu*  
*lata* *femine* *duplo* *longiora* *semen* *villosum* *anthesis*  
*digitalis* *in* *inferne* *valde* *contorta* *villosa* *superum*  
*glabra*  
*Stipa* *tortilis* *Desfontainii*