

Stratiotes

1. aloides L. foliis ensiformi triangulari ciliato-aculeatis
2. acrooides L. foliis ensiformibus planis glaberrimis, spatula apice barbata
3. alismoides L. foliis cordatis

graminifolia Stratiotes folio teretibus

Habitat in fundo maris Ceylanici prope littora ejusdem König

Radix repens, filiformis, articulata: articuli clavati. Caulis erecti, simplices
glabri, articulati, palmares, foliis vaginati. Folio ad articulos 3-5, alter
no, erecto, teretiuscula, glabra, acuta, inania, caule saepe longiora.

Racemi mares terminalis, dichotomi, pedunculati, basi foliolo involu-
crati. Flores singuli sessiles, alterni, approximati, bifarii. Calyx squa-
mae duo, opposito, oblongo, membranaceo, punctato, apice trifido:

lacina intermedia multo longior, similis foliis; laterales membra-
ceo, rotundata. Corolla nulla. Receptaculum prominulum. Seta-

menta plurima, monodelpha, calycis longiora. Anthera 4, lateraliter
columno filamentorum adnata, lineari-oblonga, parum flexuosa,
apicibus supra corollam conniscentes. Racemi foeminei longiores,
magis divisi, intra bracteolam squamam flores 2, approximati, sessiles.

Corolla nulla. Germen oblongum, parum obliquum, compressum, nitidum.
Styli 2, recurvati, setacei, germine parum longiores. Stigma simplex. Tri-
pa ovata compressa, glabra, castaginea. Nucleus unicus, lineari-oblongus

3 alismoides. L. foliis cordatis Lin L. V Mant 405

Ottel ambel Rheed. Mal. 11. p. 95. t. 46.

Habitat in India & Egypto.

Folia cordata subrotunda vel oblonga latitudine, et lon-
gitudine aequalia, spithamea, nervosa. Scapus foliis alteris
~~causatis~~ ~~causatis~~ ~~causatis~~ ~~causatis~~ ~~causatis~~ spatha monophyl-
lae angulis 5 membranaceis.

aloides l. foliis ensiformi - triangulari ciliato aculeati Linn. V
Fl. Dan. t. 337.

Gratiola militaris aizoidea Lobel. hist. 904.

Aloe palustris Bauh. pin. 206

Habitat in Europa septentrionali aquis pegni pini &

Solia foliis Agavei Am. glabra sepe pediculis attenuatis

Scapus compressus superne uncinatus. foliis brevior

2 acoroides l. foliis ensiformibus planis glaberrimis, spatia apice bor-
bata. Lin. Suppl. p. 260. & S.V. p. 506.

Aconitum manni. Rumph. amb. 6. p. 191. Tab. 75. fig. 2.

Habitat inter Insulas Zeylonicas.

Radix repens, parum ramosa, articulata, folia radiata
conferta linearia plana marginata, apice rotundata
integerrima, apicem sepius subtrivata, sibi opposita, qua-
drupedalia. Vagina membranacea, tenerius foliis
adnata. Scapus interfoliaceus, simplicissimus, solitarius
erectus filiformis, sepius florem unius sexus glaber, nudus
tri- quadrupedalis uniflorus. Spatia linearis, compres-
sa biphylla. foliola membranacea patenter compli-
cata obtusa, caetera sepius in bellis barbata. Calyx
triphyllus corolla tripetala filamenta vix ulla aetheris
12. Germen inferius. Fruita ovata hispida seminibus
plura ten.