

Stromia

gambolibusque pedicellatis

Cal. 4 phyllis. nectarium, ligulatum. Balaea coccinea pedicellata

1. farinosa l. foliis oblongis farinosi, floribus petaloides pentandri
2. tetrandra l. foliis oblongis mucronatis nudis, floribus petaloides tetran-
3. glandulosa l. ^{dris} pilosa viscosa, foliis subrotundis, floribus apetalis
4. rotundi folia l. foliis orbiculatis glabris, floribus apetalis

Stromia. Cadaba Torffholci Desf. pag. 67.

Characteres essentiatis

Calyx tetraphyllus. Nectarium flammis ligulatum staminibus receptaculo elongato infundis. Bacca coriacea pedicellata

Character naturalis

Calyx Calyx perianthium tetraphyllum; foliis ovatis, acutis, deciduis; venis concavis; intentionibus planis

Corolla Corolla tetropetala, vel nulla. Petala lanceolata, undulata, dependentia in unguis longitudina Calycis, interdiversis Calycis ad idem latus de floris.

Nectarium monophyllum, adpendens, Receptaculo elongato inferius taminibus flammis etque oppositum conari e regione opposito, ligulatum. Tubus venis, petalis longior. Camina lanceolata.

Stamina filamenta quinquaginta, filiformia, conqualia, Receptaculo infundis 2^o in medio, 3 inferioris, Nectario longiora

Pedicellus germen oblongum, pedicellatum: pedicellis filamentis longior ascendens.

Stylus nullus.

Stigma obtusum, sessile

Farinosa Stromia, foliis oblongis farinosis, floribus petaloides pentandris
Qadaba farinosa, foliis ovatis oblongis farinosis Trist. Desfer.

pag. 68. no 12.

Trutex ramis terditibus, junioribus pulvere glauco aspersis.

Solia Solia alterna, brevis sine petiolata, oblonga, integerrima
obtusissima, avenia, pulvere glauco farinosa, profertim
subtus. — Stipula nulla.

Racemi Racemi terminales, 6-8 flori. Pedunculi ante flores pen-
tam cernui.

2. Tetrandra Stromia foliis oblongis mucronatis nudis, floribus petaloideis

² Tetrandris
sicuti in Clome floribus gynandris tetrandris, foliis simplicibus, caule
funiculoso Lin. v. pag. 604

Folia oblonga, mucrone terminata.
Flores bractea filiformi sub pedicello brevior.
Flores 10-12 in pagulo caecis.

(Habitus alienus a Clome, fructus et nectarium ut in Cada
ba Torf. ideoque hujus generis

64

Cl. 65

3

glandulosa Artemia pilosa viscosa, foliis subrotundis, floribus apetalis
Radix glandulosa; ramis, foliis calyce, pistillo glandulosis
villosis Boiss. Desf. pag 68 ne 13.

Caulis Caulis fruticosis rami teretes, uti tota planta obfusa pelis
apice glandulosis.

Folia Folia pedicelata, alterna subrotunda, integerrima, mucrona
ta, sabra, arenaria, fragilia, femipollucaria.

Racemus Racemus terminalis, 4-6 florus. Flores nutantes
Capsula Capsula oblonga, unguiculans, hirsuta sericea.

6566
23.

21

rotundifolia Stromia foliis orbiculatis glabris, floribus axillaribus.

Cod. Ba. rotundifolia; foliis orbiculatis glabris Torffh. Desc.
pag 68. no 11.

Caules Caules fructuosis. Rami teretes glabri.

Stipulae Stipulae petiolatae, alternae, orbiculatae, integerrimae, interdum
emarginatae, glabrae, conaeae, aevae, pollicariae.

Petiolus Petiolus foliis duplo brevior.

Racemus Racemus terminalis, 8-10 floris; floribus erectis.

Capsula Capsula pendula, glabra, pollicaria

(cetera quo in descriptione Specimen desiderantur vide apud
Torffh. loc. citatis)

8667

62.

Inflorescentia Stromia foliis ternatis, floribus petaloidis pentandri

Habitat in Guinea West 5

Arbor. Rami erecti, terites, glabri. Folia longe petiolata, altera ca;
foliolo petiolata, lanceolato-oblonga, intermedium utroque attenua-
tum, 4-5 pollicare, lateralia interdum oblonga, basi altero latere obli-
quo, glabra, stipitata, arvenia. Petiol. longitudine folii intermedii.

Racemus terminalis, erectus: pedicelli sparsi, uniflori, solitarii, pollicares.
Calyx 4 phyllus, patens: foliola ^{sub} lanceolata, aequalia. Corolla sub
genu, 4 petala, duo multo majora, erecta inclinata, unguitularis, lanceola-
ta: duo lateralia minora, linearis-obtusa inclinata patentia. Nectarium
filamentis brevis. Emittit pedunculatus, cylindricus pollicaris, crassitie
penna cypree, obtusus: pedicello crasso, unguitulari. Hyma obtusum,
semine plura.