

Struthiola

ramis verticillatis D.D. Thoreau

~~tetragona~~  
~~purpurina~~  
~~erecta~~  
tetragona  
sumuli foliis im-  
bricati

S. <sup>rarius</sup> ~~caulis~~, corollis folisque linearibus <sup>imbricatis</sup> glabris, callo folii longiori  
Habitat in Cap. b. p. in Daldorph <sup>estherne ciliatius</sup>  
Rex Caulis Fruticulus totus glaber <sup>rami purpurascens</sup>, super  
ne tetragon. Folia sessilia opposita feminaqueulana inter  
nodis longiora, erecta supra plana subtus convexa utriusque  
acuta sul. flores axillares sessiles solitarii oppositi vel  
alterni foliis longiori basi bracteis binis subulatis videntur.  
Caevis limbi lanceolatis acuta saepe villosa  
an varietas? Erecta hinc an hoc potius vera erecta hinc

Stenothola tetragona foliis linear lanceolatis quod in partem  
imbricatis, corollis calycibusque glabris Retz. off. foss. 3.

pag. 13

~~Passerina dodecandra Linn foliis lanceolatis glabris acuminatis  
floribus lateralibus, staminibus 40 et involucris. Am.~~

~~ac. 4. pag. 270~~

~~Stenothola erecta, glabra Linn. Masd. pag. 41.~~

myrsinoides *Hutchinsonia glabra* foliis ovatis acutis planiusculis, costellis  
foliis duplo longioribus La Mart. T. En. pag. 315

Habitat in P. b. p. p.

foliis Royens glabra, costellis extus glabra

non vid.

villosa St. foliis lanceatis umbratis cinnatis, corollis calycibusque ciliatis, cotillis  
pubescentibus foliis longioribus

~~Fruticulus~~ ~~non~~ ~~cau~~ Habitat in C. 6. spec. spec. 5.

Fruticulus ramis teretibus glabris cinnatis ramulis sparsis foliis  
floriferis inanis <sup>imbricata</sup> folia <sup>imbricata</sup> pinnatifida nã pallide viridia ciliata  
supra plana subtus laeva elevata cinnatis. calycis foliola linea  
nã longitudine foliorum non coloratis. Corollis albis folus duplo  
longioribus extus pubescentibus tubo fideiformi. limbi lacini  
lanceolata

a Dr. montana mesia sub nomine Gnid. simplicis

tuberculosa Kruth. glabra foliis oppositis ovato-acutis canaliculatis  
Dorso pubescentibus, corollis foliis vix longioribus La Mart. T. En. pag 314  
Habitat in Cap. b. nei 5  
Corolla extus glabra

non vid.

erecta Si ramis corollis calycibus folisque lanceolatis acuminatis  
glabris corollis folis longioribus  
Passiflora Dodecandra foliis lanceolatis glabris acuminatis, flori-  
bus lateralibus, filamentis quatuor inclusis Lin. Am. acad

4 p. 270

Struthiola erecta: glabra Lin. Mant. pag. 41.

Habitat in cap. 6 p. 1 in Thunberg

Fruticulus totus glaber Rami purpurascens, elongati, inferne  
veretes superne tetragoni. Folia unguiculata, approximata  
avenia, internodiis parum longiora. Flores axillares solitarii  
oppositi vel alteri, tubo folii longiore apice evasione. Limbus  
lobatus lanceolatis, fauce vellis clausa. Calycis vndeis puber-  
tati foliis parum breviori

uniflora l. pedunculis simplicissimis lateralibus, fructibus hirtis, foliis subova-  
tis acutis. Lin. S. V. p. 161. Spec. pl. pag. 174 \*

alpine aquatica major reperit, foliis acuminatis, virginiana Pluk  
alm. 20 t. 74. fig. 5 mala

Oldenlandia aquatica, foliis obovatis oppositis, floribus singulari-  
bus ad alar Brown. Jam. 146.

Habitat in Virginia, Jamaica aquosis  
Caulis ramoso-subdivis, repentes. Folia opposita, lanceolato-ovata,  
subpetiolata, integerrima. Flores axillares, pauci, pediculi  
proprius germina hirsuti Lin.

*St. nata*. *St. huth. pubescens*, foliis oppositis ovatis subemarginatis serratis  
corollis tomentosis La Mark. T. En. pag 314.  
Habitat in Cap. b. spec. 5  
corolla extra hepata

an pubescens



angustifolia *Struthiola* foliis oppositis erectis lineariibus dorso triplicatis  
ramis compositis villosis La Mark T. E. pag. 314  
Habitat in C. t. p. 4  
habitus *Paspalum* filiformis

ad genus *Struthiola* revocat La Mark. *Paspalum* Ciliatum  
non vidi.

*Coryiflora* L. foliis ~~se~~ ~~longis~~ ~~subulatis~~ ~~canat~~ lanceolatis canaliculatis imbricatis  
nerviis calycibusque ciliatis, corollis foliis longioribus bracteis coloratis  
Habitat in cap. b. p. 5

Fructus ramis longis simplicibus foliis fere tectis inferne glabris  
superne tetragonis subpubescentibus. Folia sessilia opposita  
semiunquiculata vel parum ultra ramo appressa lanceolata  
subulata extus convexa nervis subparatis utraque cara margine cili-  
ata. Calyx foliis brevior folioli angustis ciliatis. Corolla extus  
sericeis pollicariis fere filiformis sensim inraspatis lumbis qua-  
drifidis laciniis lanceolatis

*Struthiola*

virgata S. pubescens Lin. Mant. 41. + S. V. p. 164

Habitat in Cap. b. p. 164

Caulis prolefer. Ramis simplicibus virgatis subvillosis. Folia opposi-  
ta lanceolata acuminata glabra striata canaliculata  
Flores axillares solitarii, sessiles longitudine folii exteri, pube-  
scentes perispermiales can. pubescentes.

ramis pubescentibus, foliis lanceolatis glabris, floribus longitu-  
dine foliorum.

an bractea colorata

*pubescens*  
*ciliata* S. foliis lanceolatis imbricatis calycibusque ciliatis, corollis extus  
sericeis foliis oppositis bracteis coloratis

*Anthola pubescens*: foliis linearilanceolatis erectis, bracteis  
calycibusque ciliato barbatis, corollis extus sericeis Retz. *obf.*

fasc. 3. pag. 26  
Habitat in Cap. b. per ad Duldorff 5

Rami inferne glabri super ciliati superne Vetrogoni pubescen-  
tes foliis imbricatis. Folia linearilanceolata striata glabra  
marginibus unguiculata erecta opposita, margine albedo ciliato  
Flores axillares solitarii oppositi foliis parum longiores. Calycis foliola  
linearia colorata ciliata corolla extus sericea

*ciliata* in herb. dicta

nana L. foliis linearibus obtusis pilosis, floribus terminalibus fasciculatis tomentosis

Lex-Suppl. p. 120. S.V. pag. 64

Habitat in Cap. b. spec. 5  
Bractea cernua spec. 5