

Styloanthus

1. procumbens. foliis ovato-lanceolatis lanceatis glabris, fricis multifloris, caule procumbente.
2. rufa. foliis oblongi-ciliatis hirsutis, fricis paucifloris, caule erecto.
3. elatior. foliis lanceolato-acutis glabris, fricis paucifloris, ruginis foliolisque ciliatis, caule erecto.
4. guianensis. foliis lanceolato-attenuatis petiolis longioribus, fricis multifloris villosis, caule erecto hirsuto.

herpetin Sylesanthes

Habitat in Guinea Bot 5

Trichularia duhotomus, ramosus. Sola canescens, extorsum subserrata
vul integerrima, minime ciliata. Vagina ore ciliata. Specie hirsuta

ultimus descendens - offici viscosa est

virosa Sylophthei folia vernatae ovatis calato hispatis, spicis paniculis floribus caule
erecto Iw. prod. pag. 100

Habitat in India occidentali

Tota planta pubescens rami verticillati.

Folia vernata, oblonga lanceolata, angustiularia, lateralia minora, mucronata,

supra obscure venosa.

Stipula vaginans, petiolo brevior, apice in setas duas dicitur.

Dr. v. Rohr

Funifus *Styloanthus*?

Ptychosperma funifis Plum. Econ. 114.

Habitat in America herb. Trop.

Rami teretes, flexuosi, glabri, cortice cinereo. Spinae duo stipularum. Sola Yerna
ta, breviter petiolata: foliola glabra, rigidissima, subarvensia, semi pollicaria
spine nula terminata. Racemi breves.

Styloanthus Sw. in Act. Holm. 1789 pag. 296

Calyx tubulatus, longissimus, corollifer.

germen sub corolla

legumen hamatum

root Ophioglossum collocanda

Syloanthus procumbens; foliis ovato lanceolatis cuneatis glabris, spicis multifloris,
caule procumbente Sw. prod. p. 108. Act. Holm. l. c. p. 297. Tab. 11. fig. 1. σ
Anonis non spinosa minor, glabra procumbens, flore cedro. Sloan her. 1. p. 127.
t. 119. fig. 2.

Trifolium procumbens; foliis nervosis, spiculis monospermis acuminatis
spicatis Brown. Jam. 298.

Hedysarum hamatum foliis vernis nervosis nudis, spicis sessilibus, legumi
nibus duplex mibus obtectis acumine uncinatis Lin. Sp. L. pl. 90. 1056

a.
Habitat in India occidentalis trifoliis

Burm. forte otio planta

Caulis semi pedalis versus radicem fructiferum tam opus, Andrus pubescens. Radice
adpendentes foliis sub pubescentiis. Solia petiola ternata. Petoli stylulis
vaginatis hisc apicantis bafi caulem amplexantes, bifido pubescens, foliole
subspatulae vel eroneae & brevi petiolato lanceolato vel oblongo, mucronata nervosa
vel glabra, nervis subtus albidis. Spica terminalis ramulorum ex stipulacibus
cylindrica congestis composta vaginando extenuata majori, petiolis foliis que
ternatis, intenorci minori, folioli simplicibus, intimo f. bracteo
lanceolato membranaceo, albido florem v. fructum includente
Rowlo luteo, carnis calycis apice pubescentibus. Vasillum venosum
Legumen articulatum

2 vrsicosa s. foliis ovatis ciliatis hispatis, spicis paucifloris caule erecto. Prod. 100.
(oblongi trecenti)

Tab. 9. fig. 2. Sw. in Act. Holm. l.. pag. 298. tab. 9. fig. 2 +

Loto pentaphyllo filiqueo famili, Anonis non synoja, foliis ciliatis infar
glutinosis et odoratis Sloan. Hist. 1. p. 106. t. 119. fig. 1.

Trifolium puberulum hisp. ^{sub}petum, foliis minoribus singulans Brown
Jam. 299.

Trifolium procumbens Leguminos. hisp. um Loti facie Baumzeyl. 226.

t. 106. fig. 2.

Habitat in Jamaica et India orientali &

Paulis sempedalei inferne glandulosis ramophyllo crassus, pubes
Rami hisp. apicali. Sola petiolata vernata. Petoli breves hisp.
vaginæ foliulari bidentata ciliata inflexa. Sola ut in precedente
et margine ciliata ut fore ferata, ciliis remoti apice glandulosa
Spicæ ut in precedente ad pauciflora, ut raro plus quam floris plena
nus. Scolla ciliata demum rubri. Laciniæ calyx' ciliata. Leguminosæ
atticuli angulati, gibbae scabri

3 elatior Styl. foliis lanceolatis - acutis glabris, spicis paucis floris, vaginis foliolisque
ciliatis; caule exerto Sw. Act. Hol. l. c. p. 300. tab. 9. f. 3. x

Ranunculus manana Lutea, foliis angustioribus Pet. pi. 84.

In folium biflorum spicis bifloris pectinatis, in volucinis his pedis infundibuli
formibus, foliis lanceolatis den. Spec: pl. pag. 10 88x

Habitat in silvis Canado et Virginea 3
Pauli & 2 pedaliis simpliciifoliis suffriticosis, fructus pubescens. Folium
ut in precedentibus. Rupido vaginale duo longi linearis acuti. Quibus
petioli inferuntur. Folium subfusca integra glabra albido linearato
intedum canina p. Specie terminales et axillares subfusca, lat
vagino mediis & medo folio terminato ^{velutina} ciliato, conferte inter se
flores 2. 3. Rei albi. Flore lutei. Legum in subrotundum apicum
monopetala

non vidi

hispida Stylophantes diffusa procumbens, rami patentibus, non poter
v. foliolis cancellatis, parve hispidis. styli et capitulo ter
minale hispidissimum Act. Soc. h. Nat. Par. pag. 112.
Habitat in amer. merid.

non vidi

4. guianensis. foliis lanceolato-acuminatis, petiolis longioribus, fructis multiplonis
villopis, caule erecto hirsuto Sw. in Act. Holm. C. C. pag. 301. *

Trifolium guianense, hirsutum apicum, flore luteo Rubr. Guian. V. 307

Habitat in Guiana

Pauli 3 pedalis, ramosus, ferrugineus. Folia ternata. Petoli elongati
basi vaginis connati bi-angustidis, membranaceis hirsuti. Foliola
hirsuta capula. Specie ultra elegans terminalis et axillares
globosa vel lata, foliolas vaginis que hirsutis congeste. Flores pauci-
inter bracteas, solitares. Calyx basi rotundatus, tubo ciliato
Legumen ovatum hirsutum, ipermus.

non v.d.