

# Styrax

1. officinale L. foliis ovatis subtus villosis, racemis simplicibus foliis brevioribus
2. grandifolium L. foliis obovatis subtus villosis, pedunculis inferioribus axillaribus solitariis unifloris
3. levigatum L. foliis oblongis utrinque acutis glabris, pedunculis axillaribus solitariis geminisve unifloris
4. glabrum L. foliis oblongis subserratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus simplicibus <sup>racemis</sup> ~~conspicuis multifloris~~, floribus nutantibus
5. benzoin
6. Camphorifera

1 officinale *Styrax folio ovatis subtus villosi racemis simplicibus folio brevioribus*

Lin. Hort. New 2. p. 75.

*Styrax* Camer. epit. 30.

*Styrax folio mali cotoneae* Bauh-Pin. p. 452.

*Styrax officinale* Lin. S. V. p. 409

Habitat in Syria, India, Italia Tivoli &c.

Rami teretes <sup>aeterni</sup> purpureo-feres, juniores tomentosi. Folium petiolato  
pendentia, ovata vel <sup>subrotunda</sup> obtusa in apice, sub-  
tus tomentosa mollia <sup>periphereana striata</sup> vel <sup>molliora</sup> supra <sup>superiora</sup> <sup>longiora</sup>  
conium piliculis <sup>superiora</sup> pedunculi at pedicelli tomen-  
tosus angulati. Floris 3 vel quatuor in pedunculo racemo breviter  
cuneis obtusa ad basin pedicelli, Calyx campanulatus  
tomentosus obscure dentatus. Stamina longitudine petalorum



2 grandifolium Syrae Lohis obovatis subtus villosis, pedunculis inferioribus axillaribus  
solitariis unifloris Hort. Kew. 2. p. 75.  
Habitat in Carolina australi

non vidi

*grandifolium* Hyrn

Habitat in America Septentrionali

Rami superne incani. Folia palmata & altera, oblongo ovata, acuta, etate  
superiora glabra, subtus tomentosa incana, superne remote setaceo dentibus  
cista. Racemi terminales et axillares triflori. Flores majores. Calyx  
incanus. Corolla laciniis ovato-lanceolata

pulverulenta *Styrost*

Habitat in Carolina herb. Richardi: 5

Rami cortice cinereo, inferne glabri, apicē villosi. Folia in ramulis petiolata, oblonga, ex troscum remote serrulata, supra villis stellatis punctata, subtus imbricata. Pediculi axillares et terminales, solitarii, uniani. Flores nutantes.

habes



racemosa *Strigelia*

Habitat herb. Guaf. 5

Rami teretes, superne ferrugineo tomentosi. Folia quadripollicaria, ovato-oblonga, venosa, supra nitida, subtus reticulata, venis nervisque ferrugineo-nigricans. Racemi axillares, bipollicares. Flores secundi, incani, penduli. Pedunculi et pedicelli angulati. Bractea duo, lineares in medio pedicelli, oppositi. Calyx et corollamini

Tam simili *Styracis* - largato, et ut specie differt  
hujus quoque generis est *Doveclana* Ruiz et Pavon.

Benzoii **?** foliis oblongis acuminatis subtus tomentosis raris com-  
positis longitudine foliorum Gayard. Act. angl. vol. 77. 2.  
p. 3 & 7. 4. 12.

Habitat.

non vidi nisi folium



Camphor fern

non vidi nisi folium

1829



2 *Levigatum* *Styrax* foliis oblongis utrinque acutis glabris, Pedunculis axillari-  
bus solitariis geminisque unifloris

*Styrax citrandrum* L'Heretier *Styrax* nova Tom. 2. t. 17.

*Styrax levigatum* foliis oblongis utrinque glabris, pedunculis  
axillaribus unifloris solitariis brevioribus. Hort. Kew. 2. p. 75.

Habitat in Carolina australi

Rami tincti cortice cinereo superius vix pubescentes basi mucati-  
saabriusculi. Folia petiolato pollicaria et ultra acuminata  
basi acuta, remota, utrinque glabra subtus pallidiora subden-  
ticulata in saepe integerrima. Pedunculi axillares et termi-  
nales vix unguicularis solitarii, vel gemini uniflori superne  
inraspati. Calyx turbinatus quinque dentatus

~~an a glabra laron Inversum~~