

Svetia

1. perennis l. corollis 5fidis, foliis internodiis ovalibus petiolatis, superionibus
ovatis sessilibus
2. Difformis l. corollis 5fidis, terminali fortifida, pedunculis longissimis foliis, linea
nibus
3. rotata l. corollis 5fidis, ^{plenis} foliis linear lanceolatis corollis
4. ~~canthiaco~~ l. corollis 5fidis, caulis unifloris, basi foliosis
5. Decumbens l. corollis 5fidis, foliis linear lanceolatis, caulis deorsum
ventibus
6. cerniculata l. corollis 4fidis quadricornibus
7. Dichotoma l. corollis 4fidis bicornibus

Svetia altissima Luss. - Trassera Walth

actisjma Swedia

Fragera Waltheri

Habitat in Carolina Michaux herb 4usf.

Cauli herbacis, 4spadatis, superne ramosis; glabris. ~~folia~~ ^{sepalis} inferiora 6 pollicum
spathulata, pollicis 2. lata, floralia lanceolata, pollicum, obtusiuscula
omnia sessilia, glabra, integerrima, obscure nervosa, arenia, crassa. Pediculi
axillares et terminales, solitarii, uniflori, longitudine foliorum, diphylli.

Glandula ciliata in medio singula sursum corollae.

Tota foetida. Calyx 4phyllus: foliola lanceolata. Petala oblonga. Stylus 1. sty-

ma bilocularis Guss.

male descripta a Walthero

Erasmus Walth.

~~W~~ Habitat in Carolina

Caulis herbaceus, erectus, 4-9 pedalis. Folia verticillata, superiora opposita, oblongo-ovata. Rami floriferi verticillati. Cal. profunde 4partita: laciniis lanceolatis, acutis. Cor. calyce multo major, profunde 4partita: laciniis ovatis. Glandula orbiculata, convexa, barbata, in medio punctata laciniis. Stamina 4. corolla breviora. Filamenta subulata, inferne bifida, demum reflexa. Germen oblongo-ovatum, compressum. Stylus styligata 2. ~~stylis~~ glandulosa, divergentia. Capsula ovalis, valde compressa submarginata, subarticulata, mucronata, 1 locularis, 2 valvis. Semina paucis, elliptico plano compressa, membrana compressa ad latera utriusque suturae.

Suaeda gigantea

perennis l. corollis quinque fidis, foliis radicalibus ovalibus Lin l. V
Gaep. fl. austr. 3. t. 243.

Gentiana XII. punctata flore Clus. hist. l. p. 316

Gentiana palustris latifolia Bauh. pin. 1000.

caulis erectus glaber pedalis superne in ramos floriferos
oppositos ^{divisus}. folia infima basi in petiolum
semiamplexicaulem attenuata, ^{inferiora internodiis} superiora ovata ^{semi-}
amplexicaule, ^{in ramos, et superne in caule} omnia trinervi
pedunculi axillares oppositi uniflori. calycis foliola
lanicolata corolla duplo breviora lacinis corollae
lanicolata attenuata

et coru

tetrapetala Swertia: corollis 4fidis scornibus pedunculis erectis, foliis
lanceolatis, caule simpliciter Wild. spec. pl. pag. 1331.
Swertia tetrapetala corollis 4fidis, foliis oppositis lancicola
tu nervosi Pallas fl. 103f. 2. p. 99. tab. 70
Habitat in Cantshatka ©

non ordi

Differens Swertia corollis quinquefidis; terminali sexfida, pedunculis longissimis foliis
linearibus Lin. I. V. p. 266.
Gentiana foliis linearibus acuminatis, pedunculis longissimis nudis unifloris 1770
f. tit. Gronov. Virg. 30.
Habitat in Virginia
Floris albi

non vidi

~~linearis lanceolata~~
rotata L. corollis quinquefidis, foliis lanceolato-linearibus Lin. Spec. pl. pag. 320.
Gmel. Sibir. 4. p. 114. t. 53. fig. 1. Flora Dan. tab. 349.

Habitat in Sibiria et Flandria O

Caulis erectus digitatus et ultra siti tota planta glabra simplex
tetragonus a lineis decur rentibus. folia sessilia linearia, longitu-
dine internodiorum. Pedunculi axillares oppositi uniflori
calycis longitudine corolla calycis foliola linearis lanceola-
ta Pet. l. c. c. corolla oblonga acuta

corollis planis

Retzius Flandricam a sibirica distinguit ob Corollas campanula-
tas sed potius sic figuratur in figura Oederi errore pictoris

canthiaca. collis quinque fidi, caulibus uni flori, basi foliosis Len S. V. m.
266. Gaique. Mex. 12. p. 27. V. 6.

Habitat.

~~a Gent. Yucateca p. non dicitur non dicitur~~
~~non dicitur~~

Deser. de Juna
e Gaique loco cit.

4-5 - Decumbens Swertia ^{Swertia} corollis quinquepartitis, foliis linear-lanceolatis, caulibus decumbentibus.

Parnassia polynesiaria foliis linear-lanceolatis; necitariis decem setosis

Cosm. desf. pag. 207. Icon: tab. 5 fig. 6.

Caulis decumbentes, filiformis, superne ramosi; ^{obtusè angulatis} glaberrimi, uti tota planta.

Folia sessilibus, opposita, ^{remota} linear-lanceolata, basi subconnata, patentissima, semperOLLIVANA

Radicali gemmi ex apice ramorum filiformes; basi foliolo linear.

Calyx quinquepartitus uti Corolla.

Stigmata duo.

(Reliqua vide Cosm. desf. pag. l. c.)

corniculata L. corollis quadrifidis quadricornibus Gmel. bot. 4. p. 114. t. 53. fig. 3

Lin. Am. acad. 2. p. 344 *

Habitat in Sibiria et Candia

^{semipedalis}
Caulis erectus uti tota planta glabra, simplex & linearis superne
interdum ramo uno alterove florifero, & linearis a basi foliorum
decumbentibus angulati. Folia sessilia lanceolato oblonga trinervi
ria superiora acutiora opposita, remota, polliciana inter
nodis longior. ^{pedunculati} ^{ant. & capis} flori terminaliter foliorum superiorum uni
flori.

Dichotoma Swertia corollae quadrifidæ æternibus Lin. Am. 2. pag. 345. ¹⁷ S. V. pag. 266. Junc.
fib. 4. p. 113. t. 53. fig. 2.

Habitat in Sibéria

Folia radicalia ovata, nervosa, in petiolo longitudine foliorum, deflexa. Ca-
les numerosi dichotomi, diffusi, articulati, longitudine digiti. Rami oppositi, sal-
tem longiores. Folia caulina ovata, trinervia, glabra, subsessile integerrima
patentia. Pedunculæ dichotomæ ramorum, terminales unifloræ, inter-
diis ramorum breviores. Filamenta 40. Capsula longitudine corollæ
subrotunda, compressa. Facies anagallidis aut alpines hinc Am. loc.