

Swidonia

Makajoni Sw.

mahagoni Swietenia

Habitata America herb 4. 5. 3

Rami glabri. Folia alterna, 2-5 paja. petiolus basi parum crispior: pariter un-
guiculares. foliola parum per petiolum decurrantia, semicovata, pollicari, attenua-
ta, venosa, acuta, supra nitida. Racemi axillares, foliis breviores, subcompositi.

Senegalensis Swietenia octandra foliis abrupte pinnatis subtrijugis:
foliolo obtusifoliis, fructu quadivalvi La Mark Enc.

Habitat in Senegal

Rami Veretis glabri. Folia alterna 2-3 juga, foliola ovata vel
ovato oblonga, obtusa acuminata, virens glauca, tripollicina.

Panicula terminalis. Calyx 4fidus. Corolla 4petala, petalis
ovatis, obtusis, patentibus. Capsula sphaerica dura, magnitudine
nemi apice quadivalvis La Mark.

non vidi

makayoni Switeneia Lin. S. V. p. 399. Jacq.

Arbor foliis pinnatis nullo impari: nervo ad latus Cataph. Car. 2. p. 81. Tab. 81.

Cedrela foliis pinnatis, floribus fragis, ligno odorato Brown. Jam. 158.

Habitat in America meridionali

Similis Cedrela foliolo impari majore, at Cedrela foliola altero latere angustiora Lin. S. V. l. c.

arbor proceram, ramosissima, coma ampla nitida. Folia alterna abrupte pinnata 3-5 puga: foliola sequi pollicaria, petiolata, opposita, foliato lanicolato, acuminata, atropum inflexo integerrima, peduncululi axillares bipollicares sub 3 floris, flores parvi albi

non vidi