

Symphytum

1. officinale l. foliis ovato lanceolatis decurrentibus omnibus alternis
2. tuberosum l. foliis ^{lanceolatis} semidecurrentibus: summis oppositis
3. orientale l. foliis ovatis subpetiolatis
4. secundum l.
5. requium l.

secundum S. foliis semicampylis caulibus canaliculatis lanatis, floribus micropis
ghesl. d. 3. t. 36. fig. 3. La Marti. Eni.

Habitat.

non vidi.

ragium. foliis lanceolatis sessilibus lanatis, ^{floribus} ~~foliis~~ comosis Gmel. N. 3. 7. 36
fig. 1. La Marche Enci.
Habitat.

non vidi

Tuberosum L. foliis semidecurrentibus: summis oppositi Lin. spec. pl. pag. 145 & L. V

Jacqu. off. 3. p. 12. & 13. fl. austr. 3. & 225

Symphytum radice tuberosa Cam. epit. 701.

Symphytum majus, tuberosa radice Bauh. pin. 259.

Habitat in Germania centrali & Europa australi &

Caule striato, pilis rarioribus subhipudis: foliis lanceolata, basi
attenuata 3 vel quadripollicariis, costa subhipuda, pilis utraque

inferiora petiolata

suprema altera
na

parvis pedunculis terminalibus erectis apice sub floribus
biphyllis, foliis oppositis, pedunculis in rademosis bracteis
omnibus partibus minoribus officinali, flores lutei

orientale *Symphytum* foliis ovatis subpetiolatis Len. I. 107.

Symphytum orientale, foliis subrotundo apertis, flore coniceo Tournef. corol. 7.

Symphytum constantinopolitanum, Boraginis foliis et facie, flore albo Tournef. cor.
7. Buxb. Cent. 5. p. 36. t. 60.

Habitat juxta Constantinopolis rivulos, primo vere 24 heb. Quos.

Caules crassissimi perne asperis. Stipula inferiora petiolata, ovata
oblonga, acuta, obscure crenata, superiora sessilia, ovata acuta, omnia
subtus villosa, incana, supra ovulo armata adpressis pilis rarioribus.
Pseudanthium terminalis, bifidus. Calycis lacina lanceolata, acuta,
albida. Corolla glabra.

officinale *S. foliis ovato-lanceolatis decurrentibus* Lin. 1. V

Pl. Dan. 664

Symphytum consolida major Bauh. pin. 259.

Habitat in Europa umbrosi subhumidi &

Caulis sulcato angulatus, bipedus bipedali ramosus. folia ovato lanceolata, attenuata, pilis adpressa, utraque sicabris pona quana tuberosa, ad folium infrequentem decurrentia. Peduncululi terminales vel ex axillis supremis. folia floralia alterna Peduncululi bipedi, flori in dichotomia, reliqui racemosi calyces uti peduncululi bipedi.

floralibus summis omnibus

alternis