

Sympleicos

Martinicensis Symplocos floribus racemosis pentapetalis, foliis utrinque glabris
crenatis.

Symplocos Martinicensis Lin. L. V. pag. 699

Symplocos martinicensis: floribus pentapetalis Sw. prod. pag. 109. off.
bot. pag.

Habitat in montserrat.

Rami alterni, teretes, glabri, cortice cinereo.

Folia petiolata, alternis, trisvel quadripollicaria, elliptica, obtuse
serrata, basi versus integerrima, acuminata, obtusa, basi
acutiora, utrinque glaberrima, venosa, supra nitida, subtus
pallide viridia, costa purpurascens.

Petiolus pollicaris supra planus

Racemi axillares, petiolo parum longiores, solitarii; pedicelli
alterni, uniflori, uti pedunculus communis, angulati, villosi

Bractea tres sub singulo flore, oblonga, carinata villosa, de
currens.

Calycis laciniis rotundatis, glabra

Corolla petalorum quinque, glabra

Intra ~~quatuor~~ oblonga; quadritubulari

(Olor gustatifimum - Mel prostantissimum apibus probet In Rigan
^{oleos}
Vasitatem quae oque dedit In Rigan foliis lationibus; fructibus duplo fere
Caspionibus via vero d'wesam esse credo

Ciponima Symplocos pedunculis multifloris, foliis ovato lanceolatis extropis subperatis
subtus villosis.

Ciponima guianensis Quib. fl. Guian. p. 567. Tab. 226.

Symplocos Ciponima: pedunculis multifloris, foliis integris subtus villosis
L'Herit. in Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 175.

Habitat Cayenna L. v. Rob. 5

Rami teretes, cortice supra cinerascens, inferne glabri, superne subhirsuti
Folia petiolata, alterna, trivel quadripollicaria, ovato-lanceolata,
attenuata, obtusiuscula, apicem versus serrata nonnullis remotis
obtusis, supra glaberrima, nitida, arena, secundum nervos
pubescentia, subtus villosiuscula, prostrata versus et costa.

Petiolis hirsutus, vix unguiculatis.

Racemi axillares, unguiculatis, subhirsuti.

Calycis foliola parva, oblonga, obtusa

Symphoricarpos.

Calyx Perianthium 1 phylum, 5que partitum: laciniis rotundatis, corolla multo brevior

Corolla profunde 5quefida: laciniis oblongis, erectis, obtusis, duobus internodiis parvis majoribus

Stamina filamenta plura in 400 corpora connata, plana inferne corollae adnata, extus glabra, intus superne antherifera, antherae apice parvis pro flagella filamentis diveris, petalo parvis brevioribus

germen ^{lem} superum, vertice parvis vellosum stylus unicus longitudine corollae aequans. Stigma subopertum

olf: Calyx secundum Swartz superum est ego in madriuerosi semi superis inveni

Pseudo Pice

2 *Ciponema* *Symplocos* pedunculis multifloris, foliis integris subtus villosis

L. Herb. in Len. Trans. 1. p. 175.

Ciponema *guyanensis* Aub. fl. Gu. 5. 67. 8. 226.

Habitat in Guyana.

variet foliis integerrimis et serratis.

Descript. habetur inter amari.

Symplocos

Calyx quinquefidus superus. Corolla 5. p. petala. Stamina quadruplici
seri tubo corollae adnata. Fructus Drupa quinquelocularis, polysper
ma

octopetala *Syml. floribus octopetalis Sw. prodr. p. 169*

Habitat in Jamaica

Rami uti tota planta glabra folia petiolata sparsa
oblonga glaberrima lucida nitida.

1 *madriensis* Symptlocos pedunculis subracemosis, foliis glaberrimis crenulatis

Herb. in Len. Trans. 1. p. 175.

Symplocos madriensis.

Symp. madriensis floribus pentapetalis Sw. prodr. p. 109 Lin.

J. V. pag 694. Jacq. americana 166

Habitat in America

varia foliis angustioribus fructu minore et latioribus fructu maiore
descript. habetur inter americanas

3 arechea L. pedunculis subquinque floris, foliis serratis nudiusculis L'Herit
in Gen. Trans. 176.

Habitat in Perua

~~haec haec~~ haec forte varietates

non vid.

Vincetoxicum *Symph.* floribus confectis suspensus, foliis glaucis L. Herit. in L.
Transact. p. 176.

Artemisia launifolia, floribus in folium alii Catess. Par. 1. 45.
Hesperis *Vincetoxicum* Lin. Mant. 105.

non vid.

Alstonia Symptlocos: floribus subcaepitulis fasciculatis septernis *Cherx.* in

Len. 1. p. 176

Alstonia theciformis *Len.* *Suppl.* p. 264.

Habitat in America meridionali 5

non vid.