

Syringa

6

Cor. 4 fida. Capp. bilobulatis, bivalvis. Semina margine membranaceo cincta

1. vulgaris L. foliis ovato-cordatis, thyrsis terminali
2. persica L. foliis lanceolatis, racemo subsimpliciter.
3. sspensia L. foliis ovatis serratis ternatisque, pedunculis unifloris, corollis campanulatis

21
20 Syringa.

Capp. 2-valvis, 2-locularis
Cal. 4-dentatus. Cor. 4-fida, ~~2-locularis, 2-valvis.~~ Semina
Sem. margine membranaceo cincta.

vulgans, Syringa foliis ovato-cordatis Lin. Syst. Veg. 57

Lilac Matth.

Syringa flore coeruleo Clus. hist. 1. 58. Bauh. hist. 1. 204.

Habitat versus Persiam $\frac{1}{2}$ in sepi nunc in septibus Germanis, Saxonis
et Helvetia et ad littora fluvii Albi prope Aetnam
quasi spontanea $\frac{1}{2}$ glaberrima terminali;

folia petiolata, attenuata, nervosa, aversis. Flores in racemo denso, am-
posito, ovato-oblongo. Ped. folium lineare ad basin pedunculorum partia
cum inferna, unguiculare.

Variat floribus coeruleis, albis et saturate purpureis.

2 angustifolia Phyllyrea foliis linearibus - lanceolatis integerrimis L.S.V. p. 57. Sp. pl. 162. Hist. Cliff. 4.

Cyprius Dodon.

Phyllyrea qta et quinta t. p. 52

Phyllyrea angustifolia prima et secunda Bault. Pin. 476.

~~Joan. de A. H. 596.~~

Habitat in Italia, Hispania &c.

Rami teretes oppositi, uti tota planta glabri. Folia opposita conflantia
acuta mucronata parva, ovata, pollicaria. Racemi axillares breves

varietates vide in h. hew.

chirensis? Syringa foliis ovato-lanceolatis Willden. arb. Berol. 370. Spec. pl. 1, p. 40

Habitat in China?

Valde affinis S. vulgaris folia minor. Flores ut in S. persica. An planta

hybrida? Willden.

3. In prensa *Syringa foliis ovatis serratis ternatisque* L.S.V. pag. 57. 3. Thunb. fl. Jap. pag. 19 Tab.
3. 7 1. v

• *Prunus* *Rampf. Am. East. Taf. v. p. 907.*

Habitata in Japonia

Caule flexuoso, ascendens. Burs. dependens. ramis ramosis subtota
genuis. rami oppositi & variati. folia & gemma plura
reticulata: prima simplicia ovata acuta serrata glabra in
quidam sub florifera emmentia, deinde serrata.
flores & gemmae oppositi solitarii duo vel tres flori pedun-
culati. lacinae lanicolatae corolla campanulata ad
medium quadrifida Thunb.

nulati

pedunculis uniflori corollae campa-

persica 3 lynga, foliis lanceolatis Lin. Syst. Veg. 57.

integriolia a foliis indivisis.

lynga babylonica, foliis indivisis densioribus foliis-Plukh alm.
359. t. 227. f. 8

laciniata

3. a foliis indivisis divisisque
Agusthyon foliis laciniatis Boerh. prodr 158
Agem lilae persanum sive lilae uniso folio Cornut. Canad 109.

Syniga capitata, foliis 2 ubi scissulatis inferioribus pinnatis; superioribus ternatis simplicibusque Gmel. 3. p. 304. t. 32. f. 1.

Habitat in Persia 5

Bouticulus bi p. 3 pedalis, glaber. folia integerrima, alternata, glabra, plura ex eadem
gemma, pedunculi versus apicem gemmae distincti, oppositi; pedicelli
oppositi, ramosi, triflori. flor. pedicellati.

Variat floribus albis & coeruleis

~~persica 3. lynga foliis lanceolatis Lin. Syst. Veg. 57. melle. Sect. 169. f. 4.~~
~~The integriolia a foliis indivisis~~
~~lynga 6~~

u subniflora ^{P.} ~~Q.~~ foliis ellipticis acuminatis serratis latius corolla laciniatis.
Phillyrea indica foliis ovatis acutis: racemis terminalibus Loureiro fl. Martini

Lin.: 1703. 19.

Habitat in Cochinchina.

Rami tortuosi. Folia parva glabra. Racemis terminalibus breves.

Corolla quadrifida

ex herb. Banksi

villosa 4. Syringa foliis oblongis utrinque acutis - ^{Ex perona} subtus villosis.

Habitat in montibus circa Peking. ~~H. D. Encavill.~~ in museo Gussonei

Rami glabri. Folia petiolata, pollicaria vel ultra, integerrima, arenaria
sub nervo, subtus pallida. Thyrsus terminalis, erectus. Flores unguiculares,
quadricidi. An eadem cum Ligust. bivenis Lour?

Habitat ~~R. S. Kiam~~ ^{angulata} ~~superne~~ ~~compressis~~. Folia petiolata opposita.

Bivenis & Ligusticum | Alia oblonga utrinque acuta

1 media *Phillyrea media* foliis ovato lanceolatis subintegerrimis L.V. pag. 57. ~~Sp. pl. 121. Hort. Kew.~~

Phillyrea matth.

Phillyrea tercia Cliff. h. 1. p. 52. Lob. Ic. 2. p. 132.

~~*Phillyrea legitima* foliis Bauh. pin 476
Tournef. Inst. R. H. pag.~~

~~*Phillyrea foliis ovato lanceolatis vix crenatis* Hort. Clifton~~

~~Habitat in Europa Australiis collibus &~~

media P. foliis oblongo lanceolatis integris serratis que H. Kew. 1. p. 11

^{sequente}
a precedente differt foliis latioribus. Squamae duo oblongae conzavae
ad basin pedunculi.

varietates plures v. de in Horto Kew