

Tageles

1. patula T. caule subdiviso patulo
2. erecta T. caule simplici erecto, pedunculis raro uniflori
3. minor T. caule simplici erecto, pedunculis sycomorpi multi floris

tenue folio Tagete

Habitat in Penn. nob. - Guj.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, hirsutus, glaber: rami in pectore oppositi,
superioris subdichotome diripi. folia opposita, semi-pinnata: foliolis linearibus,
fusiformibus, unguiculatis, glabris, antezernina. Pedunculi & dichotomia stape
re, una flori, solitarii. Calyx obvatus, superne peltatoe punctatus, gla
ber. 7 dentatus. Dentibus setaceis. Papilla radice squalifera, flocculis longior
isque latioribus brevioribus

micrantha Payet

Habito herba herbacea
gracilis. Caulis herbaceus, ramosis, Californiae. folia pennata; juv. non palmatis; se
mi-pinnatis. Pedunculi axillares, uniflori, elongati. Calyx cylindricus.

Cunulata Tagete foliis pennatis, foliolis obtusis fimbriatis ciliatis
caule erecto, rame ^{ramospinoso} subdumosa Otega Dec: pl: nov.
pag 44.

Habitat in Regno mexicano.

Glebemma - Paulis herbaceis, erectis, obtusis angustatis
foliis ex pani pennatis, foliola alterna vel
opposita linearis lanceolata pubescentia punctata, indi-
cifrons minor, denticulos minutissime ciliatus.
Pedunculi Verminalis, Conglomerati, foliosi, uniflori.
Corolla 5que radice lutea: Corollulae radice prope
truncato obcordato, matula sanguinea Cunulata in
medio rotata. Pappus granulis anostis 3-4-5.

non red.

lucida Toxotes folio simplicibus connotatis oratiis argente fimbriis ciliis
tis Raven. t. vol. 3. pag 33 tab. 264

Habitat in Nova Hispania

non vidi

macrantha Tagetei foliis opppositi laciniosi laevius lineatus, cauli
bus ramosis Parah. See vol 4 p 31 Tab 352.

Habitat in Nova Hispania

non vidi

multifida Tagetei foliis Tripadto multifida Ortega Dec: pl.
nos. 25. pag 45

Habita in Peruvia

Caulis herbaceus, simplex, erectus, pubescens, Tripadali.
Sola fructuosa inferiora Tripadto multifida: periorum
Tripadto Tripada laevius linearibus, reflectis
pedunculi terminali dichotomi. Pedicelli longi
capillares unius flori. Calyx sphaerulus foliolis apice
purpureis. Sphaerula duo sub basi calycis. Corolla lateris
feminae hermaphrodite & feminea 1. Pappus paleo
stérilis.

non vidi

1. patula Tagetes caule subcylindrica pedata L. S. V. p. 770

Panophylli indicis Tag. Jefn. hor

Ölos africanus Dod pempt. 255.

Tanacetum africanum f. ölos africanus minor Baud. Pl. 132.

B. Tagetes indicis minor, multiplicata flore Tournet G. R. II. 408.

Tagetes minor, flore fulvo maculata Lill. cith. 273. t. 279. f. 361.

Habitat in Mexico C

Paulista natura ramosa globos uti tota planta. folia pennata, pinnas perfractae
maiores alterno, paniculata serrato-serratis acutis apice pleniusque
feta terminali. Pedunculus uniflorus ramos terminalis superne incrassatus
conus.

2 erecta Tagetes caule simplici erecto. Lin. s. v. p. 750.

T. coi afriči annus major simplici flore lob. fc.

Caltha africana fructuosa flore simplici Ges. hor.

Taraxacum afriči annum majis simplici flore Bauch. Lin. 1250

B. Tagetes maximus redus, flore maximo multiplicato Bauch. h. 3. p. 100.

V. Tagetes mexicanus flore fistuloso, simplea Pol. Ephr. 2. p. 47. t. 46. fig. 1.

A. Tagetes mexicanus alter polyanthus, fistuloso flore Pol. Ephr. 2. p. p. 40. t. 46.

Habitat in metiō O.

Cultur ramos aquinī ut precedens sed multo robustior tota glabra gaul caule
angulata sulcata angulatus soleā angustiora, longiora ~~est~~ cægemina vel
ferrata

7, minor Tagetes caerulea compluvi recto, pedunculis symmetricis multiplois Hort Cliff 1250. f. V. p. 770

Tagetes multiflora, minuto flore albicante Vill. Eth. 374. f. 200 f. 362.

Habitat in Chile

Totagloba Paulei purpureoflavae rami nonnulli alterius floriferi. Folia pennata. pinnas
lanceari lanceolatis, secundum frequentioribus quam in antecedentibus, extimus pen-
sori majoribus. Flores ex apice ramulorum subcorymbose. Pedunculi adspersi symmetrici
nonnullis pubulatis. Calyxas cylindrici.