

Taliesin.

Talisia

Talisia hexaphyda, racemi simplicibus, calycibus petalis aequalibus.

Habitat in America meridionali von Prokr 5.

Arbor. Rami Veretis; cuspide penno cygnoe, cortice cinereo, e punctis elevatis numerosis cincis inaequalibus, glabri: ramuli alterni, paucis simili.

Folia petiolata, alterna, pinnata cum pan., bi-^{sive} tri-^{sive} quadrifida:
foliola breviter petiolata, opposita vel alterna, oblonga vel lanceolata-oblonga, acuminata, integrerrima, utrinque glabra, supra vix venosa, subtus tenuissime venosa nitida, consistentia foliorum laui, quadruplicata vel sexuplicaria, interiora parum minora.

Petiolus Veretiusculus, ~~petiolis~~ mucrone terminatus: petiolis via semiunguisularis.

Racemi in ramis, supra cibatculam petiolat, sope octo, simplices, bi-sive tri-pollicares. Flores geminati, alterni, polygalliæ.

affinis Meliioria
Lamina 1. 2. 3.

Flos: hermaphroditus

Calyx. Perianthium monophyllum, Campanulatum, quinque fidum: lacinia
lanceolata, obtusiusculis orculo armato pubescentibus; longitudo corollae
Corolla duplet, utraque pentapetala. Petala exteriora unguiculata, lineana, gla-
bra, calyx e dimidio longiora, apice patula: interna medio petalorum
exteriorum inserita, longitudine & latitudine exteriora equantia,
latero interioro nervosilla.

Nectarium margo
inter corollam et
staminem

Stamina. Filamenta recta, petali Duplo barioria, germini depressa.
Anthede parva, oblonga, erecta.

Pistillum. Germen superum, ovatum, irregularum, incanum. Style unicus
linearis, corolla parum brevior. Stigma leviter emarginatum

A. Pinieles hermaphrodito, absque germine.

(diffedit a priori) pinnis parvioribus, magis approximatis, angustioribus,
venis obsoletis, minus acuminatis

Talisia rosea, racemo decomposito, calyculis petalis brevioribus

Talisia guianensis Aubl. fl. guian. pag. 349. tab. 136.

Habitat in Cajenna von Rohr t.

Rami angulati, fusco-purpurascens.

Folia bipedalia, pediolata, alterna, pinnata cum pari: foliola pediola
ta, inferiora alterna, superosa opposita, elliptica, acuminata,
integerrima, utrinque glabra, venissime venoso-subreticulata, sub
nitida; quinque vel sex pollicaria, subopacaria.

Pedioli communis teres, fusco-purpurascens, glaber, mucrone terminalia
nisi: partiales vix unguicularis, crassi.

+ Flores polyami.
Thermaphroditi

Panicula terminalis, racemosa, patens, semipedalis. Pedunculi univer
tales et partiales angulati. Foliola plura ad basin pedunculi
universalis, solitariae ad partiales, subulata ^{infirma} sive pollicaria
serrato-dentata; dentibus tomentosis, an radimento foliorum

Calyx quinquepartitus: lacinia oblonga, oculo armata pubescentes,
obtusa, corolla triplo brevior ^{er} verte

Petala ~~204~~

Corolla duplex) utique pentapetala ~~exteriora~~ linear - oblongo - obtusum
8. & plana utique glabra; ~~inferior petala~~ interna basi petalo
num exteriorum inserta, lanceolata, longitudine exteriorum, latera
exteriorie ad dimidium glabra, apice marginata latere que
interno pili nescientibus rotata.

Nectarium margo ^{elevata, carnea} recepta inter corollam et staminia in receptaculo, lobata.

Stamina. Filamenta octo ad decim, receptaculo inserta.

Rapula quinque angulata