

Ternstroemia

1. meridionalis T. foliis obovatis integerrimis, pedunculis axillaribus calycibus obtusis
2. elliptica T. foliis ellipticis acutis integerrimis, pedunculis lateralibus calycibus obtusis
3. punctata T. foliis oblongis integris submarginatis margine punctatis, pedunculis axillaribus, calycibus acuminatis
4. hexagonica T. foliis oblongo-ovatis apice subseratis, pedunculis axillaribus, calycibus obtusis
5. dentata T. foliis oblongis acuminatis dentato-seratis, pedunculis axillaribus lateralibusque, calycibus obtusis

orientali Ternstroemia

Habitat in Java herb. frusf.

Rami teretes, glabri, punctato-scabrisquiduli. Folia petiolata, alterna, elliptico-lanceolata, coriacea, ovata, utrinque glaberrima, nervosa, parum acuminata, obtusa, emarginata, obsolete crenata, impunctata ad marginem. Petioli semiconjugaliter. Pediculi axillares, solitarii uniflori, semipollicares. Calycis foliola oblonga.

2 elliptica

Fernströmia foliis ellipticis acutis integerrimis, pedunculis lateralibus ^{subulicibus obtusis} ~~subulicibus obtusis~~

Habitat in India occidentali Dr. Forseth.

Rami cortice rugoso, glabro.

Folia superne in ramis, sparsa, petiolata, alterna, bipolliciana et ultra, glaberrima, coriacea, margine parum reflexa, utrinque punctis numerosis minutis elevatis adspersa, basi angustiora, supra subasencia nitida.

Petiolus unguis cularis, supra planus, subtus convexus

Pedunculi serpii apicem, sparsi parum supra foliis, sparsi pollicares, uniflori, purpurascetes.

Calycis foliola obtusa coriacei

varietas a Pyramis foliis convexis specie distincta Richard
alia datur forte varietas caule arboreo actioux

ferrata Templetonia foliis lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus, calycibus obtusis
ramis hispitis

Habitat in Jamaica Tophth.

Rami superne flexuosi, pilos-tomentosi, profertim versus apicem.

Folia petiolata, ^{alterna,} lato-lanceolata, ^{utrinque acuta,} ~~alternis~~, coriaceo, venos, ~~atque~~
glaabra, juniora subtus nervo longitudinali dense pilosa, subtus

pallidiora, margine crispata, bis tripollliciana
Pedunculi axillares solitarii brevis, sive pene unguiculares longitudinali
petiolorum

Boleola calycina ovata, tenuissime tubulata

an diversa a Schw. dentata

axillanibus clypeibus obtusis
(meridionalis) foliis obovatis integris, pedunculis terminalibus Linn. prod. v. pag. 86.
Ternstroemia meridionalis Linn. suppl. pag. 264. x. f. v.

Habitat in nova Granada

Arbor. Rami rigiduli, unesii. Folio alterna, subpetiolata, coriacea, perennia, ovata obtusa, submarginata, margine subrecurvata, integerrima, arena. Spula nullo. Pedunculi compressi angustiter ^{uniflori} sub flore crispore, foliis dimidio brevioribus. Calyx cartilagineus Linn.

3 punctata T. foliis oblongis integris submarginatis margine punctatis
pedunculi axillaribus ^{calycibus acuminatis} Sw. prodr. p. 81.

Taonabo punctata foliis ovato-oblongis, emarginatis fuitu.
major Aubl. fl. guian. p. 571. t. 220.

Habitata in Guiana

Folia emarginata, punctis rigidis ad marginem exasperata
glabra breviter petiolata

4 japonica P. foliis oblongo-ovatis apice subserratis, calycibus obtusis

Mokof vel Mukokf Kompp. Am. et Jap. 5. p. 223. p.
774.

Habitat in Japonia
Pleyera japonica Thunb. fl. Jap. p. 224

Rami et ramuli subverticillati 3-5. Cineri nigri; secundis
erecti. Folia in apice ramulorum subverticil-
lata, quaternis s. 6. inaequalia, petiolata, oblongo
ovata, obtusa, crassa, supra late vixida plana
sesqui-pellucida. Petioli semiteretes, supra sulcati.
Pedunculi axillares solitarii vel terni cernui Thunb.

non vidi

japonica T. foliis lanceolatis.

5 Dentata V. foliis oblongis acuminatis ^{capitulis obtusis} dentato-~~seriatis~~ serratis, pedunculis axilla-
ribus lateralibusque ^{ser. prodr. p. 31.}

Ternabo dentata foliis ellipticis serratis, calycibus obtusis
Aubl. fl. gu. p. 569. V. 227.

Habitat in Guana

Folia alterna, glabra rigida, petiolata