

Tetracera

Calyx 4. & phyllus Corolla 3-5 petala : Filamenta apice dilatata
Semina anillo radicato cincta.

1. volubilis T. foliis Faberiniis ferratis, floribus Tetragynis
2. farmentosa T. foliis ellipticis Faberiniis ferratis, floribus monogynis
3. levigata T. foliis oblongis levibus subferratis, floribus terminalibus
4. laevigata T. foliis ovatibus obtusis glabris integerrimis calycibus pentaphyllis.

Davida Vandelli hui pertinet Ruth

3

Eunyandra Tetraeca foliis oblongis obtusis glaucois integrernmis

Eunyandra scandens Forst. nov. gen. pag. 82.

Folia petiolata, subtriangularia, bipinnata et alterna

Polygonum

~~Ex ante generis: confidere videtur in se laevius superque dilatatio
unius antheriferae, feminibusque arillo arillo radato cinctio~~

196

102

Lurta Triumfetta: folia vel lobis, panicula terminali dichotomia ^{ramis} lata, pedicellos
completis

Ced. A. Martham legit Dr. von Rohr, ex herbario e collectione
Dr. Lund.

Pauli frutescens

Solia petiolata palmata, latitudine et longitudo equalia
basi supra glabra, subtili ^{venae} occulto armata pilis minutissimis fella
hi tecta inque cotta et petiolis majoribus pilis ranoribus longis his
ta proferuntur basi ad insertionem petioli, septem nervis rictus
venosa, inqualiter ferrata feruntur petiolo proximus glandu
lo, basi subcordata super lat. vel lobis lobis ovatis

Petiole ^{diffiniti} ^{bis} acuminatis ^{apice munis vellopis}
^{modicula}

Panicula terminalis, diffusa: ramis, his suis tris vel ter dichot
omis, alterni ultimi duo opposti. Bloni pedicellati per
intervalla aggregati, dichotomia foliarum parvi

Calystegia canefera

Davilla Vandelli Bruf. p 35. Tab 14

Habitat in Brasilia Herb Gus. 5

Rami breves, glabri, cortice cinereo, superne pilosi. Folia petiolata, alterna, trif.

Triplacaria, oblonga, per petiolum parum decurrentia, supra glabra, nitida,
scabra, remote lineata, subhis pilosa, margine remotissime denticulata. Racemi
terminali, compositi, bipinnatares, Pedunculi villosi; pedicelli aggregati, terni,
uni flori

Palea 5phyllar, conicae: folioli Umbra exterioribus minimis, rotundis, intenobus
2. magnis. Stamina plura. Germen infernum. Embryon ^{foliolo} vestitus 1. coriaceus, super
mox, subffroneus; Testa ^{foliolo} calixis 2 intenobus calycis conniventia pseudo
capsularum 2 valvam pilosis

1 volubilis Tetracera Hort. Cliff. 214. 4

Arbor americana convolvulacea platyphyllae barbadensis
dicta, foliis serratis Platin. alm 40. t. 145. fig. 1.?

Tetracera foliis ampliis serratis obovatis cum acuminis capitu-
lis bigeminis Brown. Jan 255.
Habebat in America meridionali 5

— foliis ~~febris~~
^{nisi}
non vide.

caberrinis serratis, floribus tetragy-

Petracca

Habitat ad Senegal herb. tenuif. 5

Rame fuscopurpurascens, superne compresso subtrianguli, glabri, superne
piles rarusim adspersi. Soluta petiolata, remota, Triplicaria, oblongo-pha
bia vir scabios supra obscurae nevosa, subbas subcostata, venis fine venosa, in
tegerrima. Paniceola Vermonalis, sempedalis. Pedunculi remoti. Slo
ver magnitudine Tetr. volubilis. Anthera ad singulum latus filamentosa
apice. Styles unicus. Calyx er ope lenti margine villosi, coetemum gla
bi.

fagi folia Tetracera foliis oblongis, f. aberrans mis, spicula terminalis oblonga.

Arbor brasiliensis fagi folia florae racemoso Breyne c. 20. tab. 6

Habitat in Brasilia. Pommeron herb. Gus. 5

Rami, teretes, glabri, scabri. Dolia petiolata, alterna, bif. tripollia, oblonga
ut nique glabra, si aberrans obtusipinula, basi per petiolum planum decur-
ventia, remota dentata, supra nitida sublanceata, avenacea, membranacea
etca. Petiolis famepollicans. Spicula pedunculata, bipinnata. vix forte

specie a volubile decepta.

Capsula foliacea, bivalvis. Semina nigra, pulpa venosa innotata. Com-
merpon

rotundifolia Tetraiem

Habitat in Cemencia herb. fus.

Rami fibri : ramuli angulati. Folia petiolata, subrotunda, polliciana
vel panum ultra, sed utique fibra, interdum subretusa, integerrima,
supra aerea, subnitida, lineata, subtus venosa. Paniceula termina-
ta, patens. Capsule nitido rostrata.

a Tigarea aspera Ambloca forte non diversa.

macrophylla Tetracan

Habitat ad Senegal herb. Gus. 5

Rami teretis, glabri, purpurascens, angusti, ranno crenato, latoe. Dolia petiolata, alterna, pithamœa, oblonga, obtusiflora, integerrima, basi acutior, per petiolum parum decurrentia, glabra, lata, utrinque supra, oblique oblique nervosa, subtriangularis, subtilissime obsolete venosa. Petiolati triglobis, pollicares. Panicula ex clavas et terminalis, pedalis; inferne foliata. Re dunculus communis, uti partiales compresi: partiales remoti. Pedicelli et calyces oculo armato illis rari

Palyt 5 phyllus. Por. tripetala. Staminea 200. Post. germ. 4. Styli procul germini. Stigma 1. Arbor 15 pedalis Adanson.

Aperum Calycorum foliis ovatis apera, racemis subdulis fructu geni
no lous. fl. Cochinch. pag. 342.

Habitat in silvis coquinhens.

fruticosus, scandens. Folia in egermina glabra alterna aperi
ma. Racemi terminali. flore albi Calyx 5 phyllis. Corolla
fusca nulla intedum 4 petala. Stigma prospicue obtusum profun
de bipartitum. Penicarpus non baccatus nisi 2 basi connato
1 Culinans.

opera Tetraecum

ut hucus generis potius Selima
non sedi.

volubili Tetracera foliis siaberninis serratis, floribus tetragynis
Tetracera volubili Lin. S. V. pag. 502

Especie generis Tetracera, confitetur videtur in filamentis superne dilatatis
et rotundatis antheriferis; capsulis altero latere longitudinaliter dehinc
liber feminibusque basi anillo denticulato circumdati. Hucus inde
capsulam et semen esse in Delima Linnii est specimen in his Herman
ni vidi idemque omnino in Tetracera volubili, hinc non dubium
quoniam Delima et Tetracera eisdem generis sunt, quamvis numero publ
lorum et Capitelorum differant. Num vero Tetracera et Tetra
cera volubili, nec Capsule, quoniam est definitione
conjurare licet diversa sunt differentia. Num vero femina annulata
est Tetracera rotunda in Europa non fortior
Calyx et corolla sunt nec ne ignos cum in meo specimine defiderantur, ignos. Cum
Tetracera rotunda sive Tetracera officinalis
mea conservata
denique habet
cum reliqui
speciebus hucus
generis

104 198

quantum est definitione conjurare licet obliquit non dubito
quoniam Eudora ^{hucus} generis sed, uti jam suspicatus est Celeb. Swart: in
pro observatione suo pag. 220 Sonomia Guananensis Aubl. pl. quoniam
pag. 552. tab. 219 est Calinea scandens Eud. pag. 556 tab. 221. #

prunifolia Eugenia foliis oblongis utrinque pectinatis, pedunculis oppositis Vnflow

Habitat in America de Rohs

Rami Vetulus, superne coccine cinereo purpureo sanguineo, pectinatis et
vatis adspersi.

Solia opposita, petiolata, oblonga, obtusipunctata, glabra,
germina, subtus pallidiora, utrinque pectinata, Venella genesia.

Pedunculi brevi, axillares, solitarii oppositi longitudine foliorum, prunifoliae
triflori. Flores perfumes. Bractea sua setacea ab basi anguli

Calycis lacunae: rotundata pectinata

Petala 4 or subtilata

An Vandum varietas Myrti: frangunti convenit teste in plu nmiss
diffit fere folium quo pedunculi triflori nec trifida angulis
ramis tenui in singulo pedicello, petra folia quoque longius
pediculata

descript floro deest Eugenio forte

farmentosa
Tetraicosa foliis ellipticis siccaberrimi ferotis; floribus monozynis.

Pini pu Rheo. Malab. 7. Tab. 54 pag. 101. Tab. 54
Delma farmentosa Lin. S. V. pag. Burm. in D. Tab. 35. fig. 1

Rami terete, se^c aberrimi: rameuli velloso.
folia petiolata, alterna, elliptica, bif. tripllicata; se^c aberrima
supradicendum nervis leneata, subbas. nervis elevatis velloso
menisco glabra, excepto in nervis utrinque, acuta, serrata
petiolo brevis.

foliorum rachis paniculati. Pedunculi elongati, velloso,
pedunculi partiales remoti, interdum secum dividiti, inter
dum triflori. floribus alterne

Calyx & bracteophyllus. interdum 6 phyllus

Corolla Tripetala

Anthera

Filamenta superne dilatata, utrinque ad marginem latens

intenori

Capula ovata, attenuata, glabra, aetate late
longitudinolites deficiens. Semen hincum parvum
negligi, sordido denticulato inferne cunctum

~~Tomentofus foliis sue ordinatis setaceis ferratis Tomentofus ramulis Veretibus~~

~~Habitat in nemorosi Caleidos Leytonis~~

~~Vallia puro, pitica Rheod. Mal. 7. Tab. 7.~~

~~affinis lixoides Rami Veretki inferne cordis foliis faperne una crenata
planta Tomentofus, Tomento fulvo. Folia alterna cordata absoque
finu ad basi petiolis transversa ~~superiorum~~ ~~basi oblique~~ serrata postea ~~petiolis~~ ^{reticula}
acuminata venosa, venis majoribus subtus oppositis, subtus magis tomento
fapeno basi obliqua lesque polluaria. Petiolis sempollieans stipula
oblonga lateralis. Pedunculus oppositi folii petiolis petiolis duplo longior
ambella composta. ex universalis radice ²⁰ ~~40~~ ~~50~~ petiolis 4. 5. 8 metus
pyriformes glaber~~

nitida

Tephacera
foliis lanceolata oblongis fabri integrimis, floribus monogynis
Habitat in Parvula Trinitatis. Ad von Rohr,
Habitus reliquorum.
Rami terete, glabi. Ramuli plenimque bipartiti, testiculis pilosissimis, fabri
folia petiolata, alterna, 3-4-polluccana, nitidissimula, supra levigata, non
venosa, subtilis nervi elevati sub costata, verso nervi ^{lascivus} ~~costis~~ villosi,
dentibus alios obscuris, & modis & sensu nervi parum ultra marginem extiter.
renibus: priore supra ad centrum squamis minutis albido adpresso, ad ultiora
punctis impressi

Pedunculus unguiculans, subtilis convexus, supra & leuis margine folii tenue exi-
cantibus latius.

Racemi ex axi parum supra axillis foliorum superiorum ex apice ra-
menorem, compasti, folio longiori. Pedunculus ^{particulis} ~~compositus~~ et pedicelli
alternis, filiformes, villosi, purpurascentes. Bractea ovata, membranacea, acuta,
ad basim pedunculorum particulum.

Cal: Perianthium pentaphyllum: foliolis subrotundis, inibus exterioribus

minoribus brevibus, duabus interioribus majoribus coriaceis, ante close-

scens margine oculo-ornato subciliatis, glabi.

Corolla tetrapetala: petala subrotunda, margine plus parum plicata - un-

culata, duo parum minora.

Stamina: filamenta numero, longitudine petalorum, apie glabra, apie vil-

losa. Anthera utrinque ad latoplicem ad latera filamenti apie versus apie.

195

Pft: germen ovatum, acuteum, glabrum. Styles longitudine filamentorum. Stigma pla-
nus subpeltatum.

volubilis Lourandra

Habitat hec my.

Rami teretes, glabri. Sola petiolata, alterna, bi-f. tripolliana, oblonga, obtusip
er, ^{emarginata} integerrima, netida, carica, supra remota obfolete venosa, subtus pallidiora
venosa, basi acutiora. Racemi terminales, composti, villosi. Bracts oblongo.

a flor - flor non diversa

Asfa Tetraica

Asfa Tetraica Houwthuyne Pflanzenf. 4. pag. 39. Tab. 26

Asfa Tetra - loris

157

4 Lori Tetracera foliis oblongo-lanceis sub serratis, floribus terminalibus
indigenis
Habitat in India orientali. Dicitur de la Martre.

Ramuli flexuosi, cortice cinereo, glabri, subangulati.

Folia petiolata, alterna, basi attenuata, apice acuminata, superne
dentibus nonnullis obsolete serrata, bis triplicata, venosa,
ut inque glabra.

Petiolis brevispinis

Floribus subracemosis, terminalis, solitariis vel gemini, prolixari, pedicellis
uni floris vel bifloris.

Calyx Tetraphyllus, folioli 6. subrotundis

Cappulo 4 or, unguicularis, subrotundo, ventricosus, mucronato, gla-
berim, nitido. Lumen unicum, parvum, nigrum, nitidum, anillo albido.
marginem denticulato, ad medium ~~latus~~ in ferme rectius.

Style tantum 2 observari, subulati.

~~giganteus E. spica ereta anta; spiculis sex floribus glumis valvulis corollis
nisi extenuoribus velloso~~

Habitat. dedi L. Schumacher

~~Pulm crassiflora digiti intermedii. folia involuta fructu
spica se qui pollicari inferne biuncialis superne attenuata
in breviora spicula numero. Speculo 6, prollucare
Polyxii valvula pubulata spicula parum longiora glabra
cannata intus cava. di Sticho 6. protes 7. terminali
steriles valvula extenor lanceolata superne fructu ad medium
vellofa. interior linearis obtusa intus plana siula est intus cava
mehis vellofa.~~