

Tetraptens

Cavina *Tetrapteri* foliis oblongis ^{acuminatis} attenuatis, ~~et~~ ^{et} lobis mucosi axilla-
ribus terminalibusque, pedicellis umbellatis
an *Tetrapteri* mucronata Caron.

Habitat in ~~Carolinis~~ ^{Carolinis} meridionali s. Probr no 65. 5

Rami teretes glabri inferne cortice cinereo fibrinoso super
ne fusco lasei. folia petiolata opposita 3-4 pollicaria
integerrima utrinque venosa, glabra supra nitida
uscula acuminata obtusa. Pedicelli semurquiculati

Peduncululi axillares et terminales ^{unicati} ~~exteri~~ pedicelli
postales oppositi filiformes patentes folium utraque partem
ad basin singuli. Pedicelli umbellati 4-5que glo
seminis linearis cancellata obtuso duo breviori

micronata Torr. foliis orbis micronatis glabris, floribus umbellatis
Cavan. Diss. pag. 434. n. 5-964. 262. fig. 2.
Habitat in Capana

~~in ha. equata~~

memorata Tetrapteris foliis ovato-oblongis acuminatis

Habitat herb. Fusf.

Tota glabra. Folia bipollicaria, venosa, nitida, membranacea. Pedunculi stellati
res, saepe gemini, trifidi. Pedicelli quini, umbellati, semipollicares, medio arti-
culati. Alae duo oblongae, unguiculatae, duo dimidio breviores.

buxifolia Tetrapteris foliis oblongis obtusis

Habitat in America herb. frusj.

Cortex cinerea, elevato punctatus. Folia semipollicaria, vel parum ultra, parvis
sine petiolata, nitida. Umbella pedunculata, quadrifida. Pedicelli ca-
pillares.

insipida *Tropis*

Habitat in America hab. Linnæ.

Rami teretes, superne incano tomentosi. Folia petiolata, opposita, 3-4 pollicaria, oblonga, attenuata, venosa, utrinque glabra, integerrima, acuta. Ramuli oppositi, patentissimi, incani, foliis oblongis pollicaribus, superius minoribus sed unculi axillares, superne folia duo unguicularia: pedicelli 4, umbellati ~~per~~ pollicares, bractea 4. minuta, ovata, ad basin, medio articulati, bractea 2 bus alii minoribus. Folia duo petiolata ad basin calycii. Ala femineum duo, oblonga, basi canescentes, parum angustiores, semipollicares, duo minores unguiculares

insipida *Tropis* *peruiana*

acutifolia Tetrapteri foliis ovato-oblongis attenuatis

Habitat in America herb. fus.

Tota glabra. Stipes nitida, venosa, tripollucana, opposita. Seminum alba
brevia

latifolia Torr. foliis ovatis pubescentibus - parvis, floribus umbellatis
terminalibus. Curandus. pag. ~~34~~ 34. ne 597. Tab 262
fig. 1.
Habituaria Antillia.

michi non nota

Cissampelos f. foliis oblongis integris utrinque glabris; racemis axillaribus
ramis dichotomis, capsulis quadrilobatis Sw. prodr. p. 75.
Arbor scandens tricolor foliis citri Plum. i. 4. 16.
Habitat in Jamaica f.

non vidi

inequalis & tripteni foliis ovatis acutis subcordatis glabris floribus umbellatis
alio inferioribus brevioribus Cavan. Desf. 433. Tra 594. Tab. 260
Barrameda foliis ovatis oppositis Plum. icon. V. 16.
Habituca & sp. N. Domini

nubi yate

acutifolia Tetr. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, flibus paniculatis
terminalibus Cav. Desf. p. 433. no 595. t. 261.
Halimolobos Cayenna 5.