

Thlaspi

1. peregrinum T. filiculatis subrotundatis, foliis lanceolatis integerrimi.
2. satatile T. filiculatis subrotundatis, foliis linearibus obtusis carnosis
3. alpinum T. filiculatis obcordatis, foliis glabris radice alebur pubescens operata integerrimi, caulinis sessilibus, corollis calycis majoribus
4. obtusipolatum T. filiculatis obcordatis, foliis oblongis et exerimis: radice alebur oblongis petiolatis, caulinis sessilibus obtusis lacinis.
5. arvense T. filiculatis obcordatis, foliis oblongis dentatis glabris
6. alleaeum T. filiculatis subrotundatis ventre opis, foliis radice alebur petiolatis, caulinis sagittatis lanceolatis dentatis glabris
7. hirtum T. filiculatis oblongis petiolis, foliis radice alebur integri lyrate vel nudis ruficulis: caulinis sagittatis vellosis
8. campestre T. pubescens, filiculatis subrotundatis foliis sagittatis dentatis lanceolatis
9. montanum T. filiculatis obcordatis, foliis glabris: radice alebur ubi caro
fui obrotata integerrimi, caulinis ampliis caulebus, corollis
calycis majoribus
10. perfoliatum T. filiculatis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris
fusiformibus, petiolis longitudo calycis caule ramoso

11. aperite T. feliculii obcordato, foliis subdentato : caulinis ampliori aculebus,
 petalior longitudine calycis, caule simplici
 12. ceratocarpus T. feliculii brachiatii, foliis sagittato lanceolati integerrimi
 subfractaque.
 13. bursa pastoris T. feliculii obcordatis, foliis radiatae aculebus pinnatifidis
 summis sagittata lanceolatis

ob. Thlaspi bursa pastoris, ceratocarpum a variis generis distinguuntur
 si hoc separando placet, alio quoque, nempe omnes qui quadrant
 superne tantum feliculii membrana autem, sed si nota sufficiat
 est pro novo genere, quod membrana tantum superne est vel con-
 potius conspicua, nota majoris momenti muti videtur
 quod in membranis Bursa pastoris membrana superne inflata re-
 gatur rectius mellea. Bursa pastoris membrana superne inflata re-
 gatur minima autem ex reliquo que hinc reverantur. Solem
 regatur Bursam pastoris separandum esse ex meo judicio
 si dividendum erit genus

Thlaspi orientale, *fructuorum*, *Scamoni monspeliacis foliis* Tournef. Corp. 65
Habitat in Armenia hab. Tournef. 5

Bruticulus ramosus, glaber. Soluta frequentia, vix unguiculata, cordata, secunda,
erecta, aerea, exerrata, placentia, inferiora opposita, superiora alterna. Ova
cavum terminalis. Silicula pendula, margine membranacea cuncta.

Canophylli folia Thlaspi

Lepidium orientale Canophylli folia Tournet. Cor. pag. 15.

Habitat in oriente herb. Aus.

Racemos humulis, canescens, angulatus, rigidiusculus. Folia lencaria, unguiculata
nigra, crassa, canescens. Cymobi attollentes et terminalis. Calyx orato
mato paleo.

-trinervatum Blaspi

Habitat in Persia herb. ha. heifet 5

Unde & glaber. Siliqua semi-amplexicaulea, inferiore oblonga obtusa, apice
superiora cordato-lanceolata, integriforme, semipellucida, trinervia. Long.
bus terminalis. Oalyxis foliolo oblongo, obtuso. Petala lanceana obtusa

enstatum Thlaspi

Habitat in Persia herb. de Lesq. C

Planta pollicaris, glabra. Caulis cylindricus, simplex. Siliqua subfusca, rotunda, angustata, lanata, oblonga, exsparsa, avenia. Radix ramosa concretadine caulis. Siliqua oblonga, margine cato dentata cum dente, utrinque triangulares, retusa, cuto styllo emarginatur.

Thlaspi?

Habitat.

herb. de la forêt

habeo

Thlaspi?

Habitat in Orense Herb. De Leske.

habeo

Thlaspi

Thlaspi orientale, folio Cynorombi, flore minimo Tournef. Cor-p. 15

Habitat in Armenia Herb-Tournef.

Planta herbacea, palmata, glaberrima, ramosa: rami patentes, simplicissimi.

folia scissia, unguiculata, oblonga, crassa, avenae, acuta, exserta.

Spica terminalis: fructus ^{scutellis} fere sequipollicaris, ^{scutellis} embricatae. Siccata
autem planta magno, emarginato, margine lato membranaceo cur-
to. & coriaceo.

Thaspi

Thaspi capillis hispatis Tournef

Habitat Herb. Desfont.

Raceli erectus, recta, planta velloso subhirsuta, superne subarmata: folia radi-
calia petiolata, oblonga, bipinnatifida, interdum lacinia inferne una alterare
subpinnatifida, base attenuata, integerrima: lacinia semi-pinnatifida, frequenter
semicampylitica, sagittata, integerrima, obtusa: inferiora oblonga, superiore mi-
nor. Racemi terminalis. Siliculae stylatae, oblongae, emarginatae, utrinque mem-
brana auriculata. Facie arvensis an hirsutum.

parviflorum Thlaspi

Habitat in Syria Villandure herb. Desfont

Thlaspi orientale folio cyano ramis flore minimo Tournef Cor. p.

Paulo herbaceus, eretus, ut tota planta glabra, rameus: rami teretes, simplices, file
former, altitudine fere coulis. Tota seminaqueculana, laevicollata - oblonga, alata, a
Seneca, enervata, integerrima, viride - glaucescens. Racemus terminalis. Flores
parvi. Silicula tuberculata, emergente, marginie membranacea. loculi 2. permo-

stylatum Klaopi

Habitat in Syria Billardere herb Desf.

Trichobulus folius glaber, ramosus; basi ramosus: rami adscendentis, simplices. Dolia
fusiforme oblonga, angustularia acuta, crassa, vix glaucescens, aerea, evanescens
racemosus terminalis, elongatus. Silicula oblonga, margine membranacea, minime
emarginata, style persistente mucronata, mucro longitudine siliulae

Cordifolium Thlaspi

Habitat in Syria Bellardiere herb Desfont. t

Stylus bifidus ramosus: ramis simplices, uti tota planta glabri. folio cordato, semiam
plasticaulis, unguiculata, acuta, ciliata, crassa, avenia nervosa: radimento
ramulorum in axillis. Racemus longus. Silicula subrotunda, emarginata, margine
membranacea, gibba utrinque suturo linea elevata, depressa

gibbosum Thlaspi

Habitat in Syria Bellardiere herb Desfont.

Fruticosus, basi ramosus: rami simplices, ascendentes, terete, glabri, folia oblonga,
obtusa, in ramulis approximata. Siliicula oblonga, emarginata, dorso gibba

Thlaspi

Thlaspi orientale foliis cynocrambis, flore minimo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

Radix annua. Caulis palmari, sibi reque planta glaberrima rami gracili, altitu
dine cauli. Dolia subcordata ovata, glauco viridia, integerrima - Siliqua
fusiformis

Secundum syn. adjectum Baehn. est *Thlaspi peregrinum* Linn.

Thlaspi

Thlaspi orientale Venuſi folium canescens, flore albo Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Radicis superne divisus in ramos plures. Solia pilosa. Pedunculi hispi

Thlaspi

Habitat ad fium magellanicum Comino et. habet huf.

Pauci plures; erecti, palmari, adscender, glabri mi, simplici spini. folia pecti
angustulana, oblonga, glabra, int exima, radiis alia subcuneata. Pedicelli patens
tarsimi. Silicula obcordatis.

habeo

ceratocarpon T. glaberrimum, caule sulcato, foliis sagittatis lanceolatis
vis subferratis, filei culis bilobatis ha Suppl. p. 295. T. V. p. 500.
Lepidium ceratocarpon Pall. T. 2. p. 74 & T. 4.

Tulaspi ceratocarpon siliiculis oblongis fusiforme utraque membra
næ eo cornutis; foliis superioribus oblongis sagittatis amplecti-
caulibus, inferioribus ovalibus petiolatis Muell. ex Com.
gott 1774. p. 26 t. 1.

Habitat. in Siberia. ^{sota glaberrima}
Planta prothamna vel altior glabra. Caulis erectus teres pro-
tus apice ramificatus, rami floriferi. Solea pinnata
pletius aulica fæ integriforma vel levissime ferrata
obtuse simpliciter venosa. Cymbi in racemos clau-
gati. Flores parvi albi. Siliiculus obovatus ventriquo
emarginatus lobis duabus uti productis aucti semina
cerato carpi referentes.

foliis
subferratis qui siliiculis bidentatis integriformis

prunofum L. foliis pinnatis: foliolis lunatis: extenoribus elongatis; rami
mucronatis Lin. Mant. 253. & I. V. p. 586.

Lepidium prunofum: foliis pinnatifidis superum crenatis, spicis pubelatis
Ard. precim. 2. p. 34. t. 16.

Habitat in Oriente

Folia radicibus petiolata, pinnata pinnis alternis decurrenti-
bus inferiora subrotunda lunata antice porato vel sa postice
integerrima; exterosa multo majora, extrofam semipenna
 trifida laciniis linearibus impari folio integro vel trifida
petioli ^{ciliata} ciliata cunearia trifida vel biuga pinnata aerea
superiora caduca. Caulis spathaceous rigidulus subula-
tus inferne ramosus. Rami simplices non rigentes apice
in spinas deponentes. Flores inferiores ex illaris superiores
racemosi erecti Petala obvata, lobi cuneiformis
trifida regis apice compresus bilobus lobis oblongis
cicula videntur monopetala

an ad anagallis tam referenda vel Thlaspi?

^{ovatis}
obtusifoliat. filiculæ obcordatis foliis integerrimis radicibus oblongis
petiolatis caulinis septebris obtusissimis
Habitat in Bozana ^Ofretum magellanicum
Caule plus in ^{gla}berrimus. doleri radice plura via polluiana petio
teri filiformis. solea caulina d. hastata oblonga obtusifoliat.
subcognit. subcognit.

Thlaspi *odoratissimum* T. filii aliis subovatis ventricosis, foliis oblongis obtusis dentatis
glabris Lin. Spec. pl. p. 901. 4
Borodo *Thlaspi* *Ulyssis Aldrovandi* Baeh. Hist. 2. p. 932.

Thlaspi *allium redolens* Mon. Hist. 2. p. 297. f. 3. t. 10. f. 4. 20.
Habitat in Europa australi

Caules plures fructuifomi; adfrondentes oculi armato pelo
fusculi digitales et ultra. Solia radicale petiolata
oblonga glabra integerrima caerulea sagittata ampliata
e' aquila acuta deitate glabra vix angustula
filii oculo subrotundata oblonga parum emarginata
vix marginata pedicellum brevis pedicelli patentissimi
pubescentes

foliis radicibus petiolatis
caeruleis sagittata longeoblates dentatis glabri

T. pleiuli pubescens pelosus, foliis caulinis sagittatis vellosis
Loc. Spec. pl. pag. 9024
Thlaspi vellosum, capitulo hispido Bauch. prod. 47. t. 47.

Thlaspi capitulo hispido Bauch. loc. 2. p. 922.

Habitat in Italia, Narbona ♂

Paucis pluies compunctionis excoli vel adfidentibus pluviam
et ultra ~~vellosum~~ pubescens ut folia caulinis. Folii radiculae
petiolatae oblongae vel subcuneatae integreris basi attenuatae
et glabriuscula interdum glabra vel interdum pubes-
cens aliquot. Pope glabra integrimma sub punctata vel
lyrata. caulinis sagittata unguiculata dentata vel
puberulae roraria. fructu elongato pelosa

oblongi pelosi, foliis radiculis integris punctatis vel lyra-
tiis nudis cuneatis caulinis sagittatis vellosis

perfoliatum
foliacione t. filiculii obcordatis, foliis canticis cordatis glabris sedden
tatis, petalis longitudine calyculis, caule ramoso Spec. pl. p. 902 &
Jacq. fl. Austr. 4. v. 337.

Thlaspi oleraceum Tabern. ii. 462. hst. 85.

Pileella filiqueata Lam. hst. 7. fig. C.

Thlaspi altissimum minor, burfo pastoris fructu Colum. exphr 270.
q. 276. fig. 2.

Thlaspi arvense perfoliatum major Baud. gen. 106. Banv. ii.

315.

Habitat in germania, Helvetia, Gallia agri apennini &
Pauli palmarum glaber ^{utri tota planta} erectus ramosus rami & s. intedum
anuis vel albertisno simplici. Sola radice petiolata
oblonga, caerulea amplexicaulia remota, glauco vnde
nigra culana sursum versus flosca minora obscurae den
tata avenia. lobis petiolato puberulo plerulo latior
quam longo

nudicaulis L. frapo nudo simplicissimo, floribus reticulatis, foliis pennatis-pidiis

Locfl. A. 1554

nasturtium minimum varnum, foliis tantum circa radicem

magn: monsp: 107. V. 106.

Habitat Montpelii &c in Hispania C

aucto

Solea radicaria plura pediolata lacinis linearibus angustis umbra
extorris connatis frapo oblongo obtuso, Scapi plures rarus
individua oblonga. Scapi plures, exenti simplicissime digitatae
cylabri. Silicula subrotunda glabra emarginata

pusillum

L. folis linearis canicolatis integerrimis capo brudo
simplicissimo

legi aī littoralibus Sardinie mense Januari
an soneta, prouo

virginicum L. floribus subtruncatis vel rotundatis, foliis linearibus
pennatis Lin. f. v.

Iberis virginiana latifolia ramosa M. Monf. prol. 277.

Iberis humilior annua virginiana ramosa M. Monf. host. 2.
p. 311. f. 3. t. 21. fig. 2. Sloan host. 1. p. 195. t. 123. fig. 3.

Habitat in Virginia, Jamaica glaucifolia

Caulis erectus ramosus profusa superne ramis simplicibus
elongatis altitudine ferre caulis. folia radice albae pennatae
pinnis oblongis serratis, caulea lanceolata in petiolam
attenuata per que pollicaria supra et angustiora
Raculo subrotunda.

foliis radice albae pennatis
caulea lanceolata ferratis summis integerrimi

bonanensis f. *floribus dandis tetrapteralis*, foliis omnibus pinnatis
mane ~~multifidis~~ Len. 1. V

Thlaspi bonanense multifidum, flore invisibili All. Cott.
281. 1. 286. fig. 370

Habitat in Bonaria O

Similis *Lepidium sativum* at foliis pelosis sileculis minores

pelosus pinnatis pinnis

me-fo hummi radicifli

Padum L. floribus tetradynamis, folioli oblongi multifidis. Lin. S. V

P. *Nasturtium hederifolium* Dod. p. 107.

Nasturtium hederifolium vulgatum Baeh. p. 103.

B. *Nasturtium hederifolium crispum* Baeh. prod. 44. t. 43. p. 104.

Habitat

Paulis ericetis, sequipedalis heret, glaber uti. Tota plantae ramos
fus. Folie petiolata infimo pennata planis pinnatifidis
Cacinius rubricip*l* superiore pennata vel pinnatifida
Cacinius linsan lanciolatis in inferioribus ferato intefis
in foliis superioribus integriforme superoma trifida vel
indivisa lineari lanciolata racemi ex apice ramorum

intenoribus
folie pennata. folioli oblongi lanciolatore
multifidis, in eius integriforme superomis trifido

fastigata
Hastata Thl. filicis subrotundis, foliis lanceolato-linearibus obtusis
carnosis h.v. Taegu. fl. austr. 3. t. 236. alt. fl. ped. n. 916.
Thlaspi montanum pingui foliis, carnoe flore, plana et cor-
data siliqua. Barv. c. 345.
Thlaspi fili quo ellipticis foliis lanceolato-linearibus intre-
germinis Act. petrop. 5. p. 330..
Thlaspi parvum fastigata, flore rubente Baut. pin. 107.
Lithos Thlaspi quantum, carnoe rotundo folio Col. Lephr. 1. p
219. t. 277. fig. 2.
Habitat in Italia, G. Narbonensi, Provincia fastigiata
Caules diversi puli basi lignosi, adpendentes simplices
vel pop' ramo pallidi, palmato superne ramo uno
vel altero florifer. Tola septem grata unguiculatis
glauco viride raceme ex apice ramorum flore par-
i paleo purpuree
Caules ramosi sive pedales hab. mif

peregrinum
cypinum T. filii aliis sib orbiculatis, foliis lanceolatis integrerrimis

Hort. Cliff. 330+

Thlaspi cappula cordata, *peregrinum* Baeh. Hort. 2. p. 927.

Mons. Hort. 2. p. 297. / 3.V.10. fig. 30

Habitat.

Caules tigris ramosi glaberrimi, ut tota planta testes
foliis sib via petiolata avenia unguicularia obtusis
fusula. racemi et apice ramosum. Petiolo marginato
lato membranaceo

Thlaspi

12 arabicum Thlaspi sibyllis ovatibus stylis, foliis inferioribus cū neatis superioribus
cordato-oblongis amplecticaulibus.

Subulata purpurea; foliis cordato-oblongis, sub dentatis Torff. descripta p. 117.

Thlaspi arabicum: herba caerulea, foliis ovalis glabris avenies integrerimis, foliis

basi apice rotundatis Lin. Spec. pl. pag 906. cum Synonymo

Paulus herbacee, diffusa, ramosa; ut tota planta glaberrimi

Folia bis follicana, oblonga inferiora basi sericeo-pianum angustata,
superiora oblonga, basi cordata amplecticaulis sequa
fere Brasiliensi orientali, superiora basi angustiora cordata oblonga
amplecticauila ~~angustiora~~ pleniusque integrerima, rarus retro
te denticulata: omnia avenia.

Racemos terminalis, cum ramo alterius ex crescente

Flores primum corymbosi, demum racemosi

Polygala foliolata lanceolata

Petala calycis longior: Camino subrotundata purpurea, duæ vix majora

Siliula angustulata, ovalis, margine late membranacea, stylo
sibulato persistente siliula quaduplo brevior terminato, bafi apice
que fini est cuso

(Quam petala vix irregularia, et siliula omnino Thlaspeos ab Ibendi
genus removere non afferum mehi visum est. Quis Rubellano speciem
test Torff. non digneat nec enim commune habet

~~# 6. bidens
undulata~~ *Bunias folius petiolatis undulatis crenato-pinnatis integris
repando filicibus lanceolatis bafi
bidens*

~~Ghatis Egyptica~~ Dork. de pr. pag. 121.

~~vane flexus
flexus~~ *Paulis exaltus, Terei crispi repanda pinnis, glaber uti tota planta
nolle capa oblonga
Tolci alterna, ovato lanceolata, obtusa, crassa inaequilatera
crenato-pinnata, avenia bafi in petioleum definientia interdum
Petiolis longitudine folii undulata*

Racemai laterales erecti

*ob longo medio fere utriusque
Silicula bracteolata articulo primo obovato apice dentatus binis
obtusis, secundo ovato-acuminatis apice compresso angusti.
Semina unicolora in singulo articulo*

~~# 7. Pachys sue ennea marina latifolia Bauch hov. Z. pag
868~~

~~Ghatis pennata foliis carnosis, pennatis, subdentatis Dork.
de pr. pag. 121.~~

examenanda silicula Pachys.

*Bunias Petiolata
erit*

campestris t. filiculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incisos.

Linn. f. v

Thlaspi latifolium Duck. hst. 306.

Thlaspi arvense, vallis incano folio majori Baeh. p. 106.

Habitat in Europa annis, vix angustissimis, anni 3. 8.

Pauli ^{ramosus pedalis} uti tota planta pubescens folia lanceola
ta frequenter polliciana oblonga avenia. Silicula

pubescens

~~arvensis~~ *T. pliculæ orbiculatis*, foliis oblongo-dentatis glabris
vera *fe.* Daven Tab. 79 t. 3.

Thlaspi latius Dod. p. emp. 112.

Thlaspi arvense, siliquæ latæ Benth. p. n. 105.

Habitat in Europa agri.

Caulis erectus stans subangulatus. folia bipinnata
fagifolia lanceolata - oblongæ ampliatae & remote dentatae
amplexicaule venosa, obtusa inferiora inferne attenuata
minus ampliata acutiora. Siliqua

lunata sed non in alium haud sufficiens.

montanum
Stems T. foliis obcordatis, foliis glabris. radiceibus subcarneis
obovatis integerrimis, calycinis ampliis caulebus, corollis calyci
majoribus L. V. p. 587 & Thlaspi fl. aust. 3. t. 237.

Thlaspi montanum 2 Clus. Hist. 2. p. 131.

Thlaspi montanum, gladii folio minus Baum. p. 106.

Thlaspi alpinum, bellidis cuneo folio Baum. p. 106.

Thlaspi montanum, bisse pastoris fructu Col. ephr. 1. fo.
275. t. 276.

β. Thlaspi perfoliatum minus Ad Baum. 106?

Habitat in Helvetia, Austria, Italia Monspelii petro
sylvatici.

Caulis erectus simplicipinni frondosus foliatus
folia radicibus in pet. blum planum attenuata
subintegerrima glabra obscurè venosa. caulea
canciculata, sagittata integerrima vel dentata
vel altero obscurè bipinnata superiora minor
et utra.

in herbario deploratur

~~septem~~
~~T.~~ ~~leucotricha~~ ~~obcordatis~~, ~~folio subdentatis~~: caulinis ampliis ian-
cebus, petali longitudinaliter calyculis, caule simplici. Lin 1 V

P.

Thlaspi pumilum ? Cluf. Hist. p. 31.

Thlaspi perfoliatum minus Baeh. Hist. p. 106

Thlaspi valerianis folio, baso postoris siliquis Baeh. p. 105.

Habitat. in Alpinia

Tota glabra. Caules plurimi simplici spini interdum pedatis.
Solia radicalia cuneata. Caulina lanceolata ~~angustata~~
angustularia oblique dentata supra et in terminalia
racemos elongatus pedicelli lati patente pedunculo longiori
rebus longitudinaliter calycis. Namque florae longiora regimuntato

glabra

cuneatis foliis radicibus cuneatis caulinis lanceolatis
fagittatis ampliis caulis, caule simplici

alpinum L. foliis obcordatis, foliis glabris: radicibus fibrosis
obovatis integriformis, caulinis hispidis, corollis calyce majoribus
Gargia fe. austr. 3.V. 230. 1.V. p. 500.

Habitat.

non vide