

Thomomys

- ♂ Cal. O. nisi & nubriculi receptaculi communi. Falx mandibularis in apice  
& nubriculo, Superae & quamatum. Anthera globulata.
- ♀ Conspicui in receptaculo communi. Cal: feliformis bidentata. Styles  
1. indistinctus. Semen unicum nudum.

Sanguinea Thlaspiaria

Habitat in bylinis umbrosis montium Aquapim Guineo. Stems  
Radix repens, ramentosa exsiccata penno ariennio, fragili. Caulis  
<sup>4</sup> teret  
Triplacatum, <sup>4</sup> Basum dense crassiss, & subtile instar Vetus squamus  
bricatis, ovato-lanceolati, concavisi, rigidi, superciliis, superioribus  
peniculis longioribus et confectionibus, at illis basatis. Dolia nulla.

Si squam Receptaculum terminale, convexus, diametro fer pollicem, squamus  
obvallatum, floribus Vetricam numerosis testum: Receptaculum Masculinum  
trilobatum: tribululi, tribululi super squamula acuta & oblique  
diversis. Flores masculi: Calyx nullus nisi & tribulum receptaculi  
longi. Corolla nulla. Stamena unicum in singulo tribululo, viri longi  
tudine & quamnam obvallatum: inferior dimidia pars filamentum  
globum, superne & quammo quatuor, duos alt. bidentes, duo altiores; superius  
dimidia pars anthera, longitudinibus vultata, unipaniculata, tubu-  
lata, prollione albo testi. Stylus feminei in distinto individuo, in reip-  
taculo hemisphaerico conferti, atropurpurei. Calyx proprius filiformis,  
virgineam longum, ore bidentata, dente altero majori, per se tan-  
ta. Corolla nulla. Germen lineare, tenui, infernum. Styles capillaris, caly-  
ce duplo longior. Stigma obtusum. Peniculus nullum proter calycem.

Semen soldanum, subrotundum, parvum, receptaculo immersum, calyx obte-

rum. Thonning.

Genus Cynomorion affine, at diversum absentia caly & squamam in recepta-

cule calyx nullo in floribus masculis et monophyllum in foemineis.