Thymus

1. Serpyllum T. floribus capitatis verticillatisque, caulibus repentibus, foliis ovatis petiolatis planis obtusis basi ciliatis
2. Convgatus T. floribus capitatis, caulibus procumbentibus, foliis lineanbus obtusis planis basi angustatis fessilibus
3. vulgaris T. floribus verticillato-spicatis, caulibus erectis, foliis ovatis revolutis
4. Zygis T. floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto, foliis lineari oblongis basi ciliatis
5. acinos T. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis lanceolato-oblongis serratis
6. Conyatus T. floribus verticillatis pedicellatis, foliis lanceolato ovatis glabris serratis
7. Brownei floribus axillaribus pedunculatis solitariis, foliis subortbiculatis crenatis.
8. alpinus T. verticillis 6 floris, foliis ovatis obtusiusculis sub cordatis serratis
9. pallasianus T. verticillis 8 floris floribus caule herbaceo inflatis calyce longioribus foliis ovatis serratis, caulibus suffruticosis

10. piperella T. pedunculis axillaribus multifloris, foliis ovati obtusis glabris nervosis integerrimis margine submarginatis

10. filiformis floribus axillaribus solitariis pedunculatis, foliis cordatis acutis integerrimis petiolatis, caulibus filiformibus pedunculatis decumbentibus

12. nervosus T. verticillis subsexfloris foliis ovatis nervosis glabris integerrimis calycibusque punctatis

13. cephalotes T. capitulis imbricatis, bracteis ovatis coloratis impunctatis integerrimis, foliis 3 purpureo-lineatis

15. stratus T. capitulis imbricatis terminalibus, bracteis ovatis allenuatis, foliis lanceolatis integerrimis serratis margine punctatis

16. villosus T. capitulis imbricatis bracteis dentatis, foliis setaceis pilosis.

17. maritima T. floribus verticillatis, calycibus lanuginosis dentibus setaceis villosis

18. Tragoriganum T. floribus verticillatis, caule fruticoso erecto, foliis hispidis acuminatis.

19. virginicus T. capitulis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis

melissoides Thymus sesquilis subsectifloris foliis ovato subrotundis planis serratis

Habitat in Hungaria. 4

Caules plures adscendentes basi ramosi spithamaei et ultra purpurascentes, pubescentes. Folia petiolata, unguiculata remota, serraturis utrinque 3–4. apice vix pubescentia margine villosula subtus pallidiora nervosa venia supra sublineata. pedunculi duo utrinque rarius tres et alterna axillaria subpubescentes flores longitudine foliis. calycis oblati labium inferius versus faucem albidum maculis sex saturatioribus supra et infra istis longitudinaliter lineis duobus pilosis. labium inferius laciniis mediis emarginatis. labium superius cochleatum globosum

Conescens Veronica incana, racemis terminalibus, foliis lanceolatis, profunde serratis pro caule prostratoque incanis

Habitat in Syria herb. Desfontainii

Tota villoso-incana. Caules plures, spitha-mosi, filiformes, prostrati, subramosi. Folia sessilia, ungue lata, extrorsum parum latiora. Racemus longus. Folia floralia oppositis lanceolatis. Pedicelli solitarii. Calyx 4 fidus, laciniis lanceolatis. Capsula obcordata, compressa, calycem æquantes

#Brutea Culta Caule sesquipedali, foliis mollissimis, obtusis, racemis bipedalibus

cephalotus T capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis foliis lanceolatis Lin. S. V

Tragonganum Dactamni capite, hispanicum Barrel. ic: 707: Bocc. mus. 2. p. 50. t. 43

β. Thymus cephalo lusitanicus cephalotos, capitulo majori T.

γ. Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo minori T.

Habitat in Hispania, lusitania t

Caules filiformes purpurascentes superne ramosi ramis subvillosis pubescentibus. Folia lanceolata versus florem linearia lanceolata, pellucida unguiculata, subtus nervosa utrinque punctata, ciliata. Capitula in ramis terminalia magnitudine cerasi. Bracteae latae ovatae nervosae ciliatae membranaceae purpurascentes unipunctatae. pedunculi gemini subsingulo calyce nervis extrorsum pubescentibus purpurei labio superiore patente in dentibus 3 acutis inferiore bifido dentibus ciliata rudimenta ramulorum in axillis

~~acutis~~ colorati unipunctatis foliis

integerrimis

Thymus cephalotos

In Schousboe e Marocco reduct specimina hujus meleo pulcherrima communicavit quo in vanis ab illa in Symb bot. descrip
differt speciei tamen vix diversa prior vero ut varietas
tantum foliis angustior

Frutex ramosus strictus caule crassitie fere pennae
columbinae glaber cortice cinereo detecto fusco
Rami oppositi tetragoni valloso
Folia breviter petiolata fere unguiculata, glabra utrinque
supra punctata oblonga lanceolata basi acuta obtusa
suprema subcapitulata ovata fere et bracteam ex ovata
viridi punctata ratus inappunctata viridi purpurea
ciliata bracteo extimo extus subpunctata intimo g inpunctato

Differentia mutanda
foliis lanceolato oblongis integerrimis bracteis

Cactiflora Begonia bifloren

Epidendrum folis lineari lanceolatis obtusiusculis, caule anceps subbifloro

Li Montserrat.

Caulis altitudine digiti intermedii compressus anceps vaginis foliorum ferè simplicibus semiamplexantibus erectis versus florem aphyllus vaginis cinereis

Montserrat 2 Vb Cuba

folia vaginantia alterna, bi-tripollicia

nà infima pollicaria ferè integerrima obtusiuscula glabra, plana ferè

Vagina compressa

Pedunculi gemini filiformes unguiculares

Capsula ovata costato semiunguiculares glabra

Cyperus

Montserrat 234

Thymus

Thymus hispanicus cephalotes capitulo minore.
Barrel. Ic. 302.
Habitat in Hispania herb. tus.
Frutex pedalis, erectus, ramosissimus: ramuli villosi. Folia petiolata, parva, ova
ta, margine parum revoluta, subtus incana. Flores superne, confertis in capitulo
absque bracteis majoribus, magnitudi lycopi.
fasciculi foliorum in axillis

habeo no 1.

Thymus

Thymus lusitanicus cephaloides squamis capitulorum amplioribus Tournef. Inst. r. herb.

Habitat in lusitania herb. Tuss.

Caulis suffrutescens, ramosissimus: rami filiformes, villosi. Folia petiolata, parva, ovata, revoluta, villosa, subtus canescentia, fasciculi foliorum in axillis. Capitulum terminale, subglobosum. Bracteae magnae, imbricatae, rhombeo-ovatae, nervosae, villosae.

Tabeo No 2.

Denticulatus. Thymus

Habitat, ignota herb. Desfont.
Affinis Virginiano. Caules villosuli. Folia sessilia, pellucidopunctata, oblongo-lanceolata, acuta, nervoso-glabra, utrinque punctata, integerrima vel serratura una alterave obsoleta. Pedunculi ex axillis superioribus 2 aut 3, 4-6 phylli. Capitulum solitarium, parvum, globosum, villosum, incanum. Bracteae lanceolatae
varietas est Virginiani

Thymus carolenianus Walth.

Habitat in Carolina teste Desfont

Caulis fere pedalis, ramosus, superne subtiliter pubescens. Folia petiolata, vix semipollicaria, obtusa remote subserrata, glabra, punctata, subtus minus.

Pedunculi in axillis superiorum, brevissimi

Carolinianus Thymus

Thymbra Carolina Walth.
Habitat in Carolina Richard
Caulis herbaceus, ramosus

habeo

Origani folium Thymus

Habitat in Syria herb Descript 5

totus tomentosa incanus. Caulis fruticulosus, digitalis basi ramosus. Folia opposita
ovata, superiora oblonga, interdum unguiculata. Pedunculi 1 3flori

habeo

Lucidus Thymus

Thymum mastichinum lucidum Δ crassum flore pallido Lusitanicum Tourn.
Inst. r. h. 199

Habitat in Lusitania Herb. Desfont. ♄

Caulis pithamaeus, ramosus: rami villosi, incani. Folia linearia, crassa glabra, punctata, revoluta, fasciculata. Bracteae ovatae, subtus villosae, supra punctatae. Calycis laciniae ciliatae.

labes

Thymus

Habitat in america boreali Richard
Caulis herbaceus, procumbens, ramosus. Folia remote dentata

habeo 1801

Tomentosus Thymus

Habitat in Syria Reb. Descript. 5

Frutex ulus vix pal mani, basi ramosus, diffusus, rigidus: rami glabri, apice incani. Folia semiunciualia, ovata, acuta, incana, subtus nervosa. Flores Vermi nales, plures, in capitulo basi subspicato. Calycis villosi, incani, striati

purpureis capitulis imbricatis bracteis ovatis punctatis coloratis foliisque lan-
ceolato oblongis integerrimis
Habitat in Brasilia

L. folio oblem

Serpyllum ♄ floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis bas
ciliatis Lin. S.V.

2 Serpyllum angustifolium glabrum Bauh. pin. 220.

1 Serpyllum vulgare Dod. pemp. 277.

Serpyllum vulgare minus Bauh. pin. 220

β. Serpyllum vulgare majus Bauh. pin. 220

γ Serpyllum vulgare minus, capitulis sanguineis Tourn. I. R. H. 197

δ Serpyllum angustifolium hirsutum Bauh. pin. 220

ε Serpyllum foliis citri odore Bauh. pin. 220

Habitat in Europa australi, aprilis ♄

Caulibus basi ramosis repentibus. Ramis filiformibus retrorsum purpurascentibus, alternatim bipinnatim pilosis. Foliis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus ovatis, semiunguiculatis acutis, subtus nervosa glabra, utrinque punctatis, petioli margine ciliis aliquot. Flores in capitulo terminali sepe verticillato 1. 2. in supremis axillis. Calycibus purpurascentibus pilosis.

Thymus

Congeatus 12.

Thymus floribus capitatis, caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis obtusis basi pellucidis basi angustatis.

Thymus serpyllum Hoffm. descr. pag. 107.

Habitat in arenosis

Caules filiformes, fruticulosi, procumbentes, inferne glabri, apice villosi, inserti, ramosi: rami adscendentes, annulati post lapsum foliorum.

Folia pellucida, lineari-lanceolata, semiunguiculata, obtusissima, inferne versus angustata, glaberrima, enervia, punctata, basi ciliata.

Capitulum terminale, pellucidum, hemisphaericum, circumfoliis plurimis stipatum.

Structura caulium ramorum ad insertionem foliorum dentibus

Calyces pellucidi elevatis pilosi, labio superiore ciliato, subulatis.

Corolla pilosa rubra.

Stamina Corolla longiora

a Thymo serpyllo foliis omnino diversa nec ullo modo cum varietatibus convenit

209

vulgaris T. erectus foliis revolutis ovatis, floribus verticillato spicatis hirsutis V

Thymus vulgaris, folio Venuvoie Bauh. pin. 219.

β. Thymus vulgaris latiore folio Bauh. pin. 219

Thymum Dunii Dod. pempt. 276

γ. Thymus supinus candicans odoratus Tourn. I. R. H. 196.

δ Thymus capitulis minoribus, masilliensis Tourn. I. R. H. 196.

Habitat in H. Spanico montosis saltosis, frequentissima in Gallia Narbonen

sis. ♃. ♄

Caulis ramosissimus sub ramis subcano pentabus. Folia subtus cano pentia. Dentes superiores 3. calycis breviores latiores

vaut en Syst

zygis T. floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto, foliis lineari-
bus basi ciliatis S.V
Mant 413.
Serpyllum sylvestre zygis Dioscoridis Clus. hist. 1. p. 358.
Thymo vulgatiori rigidiori simile Bauh. hist. 2. p. 271.
Thymum angusto longoque folio Barrel. ic. 777.
Habitat in Hispanica 4
Caulis basi ramosus diffusus supe palmaris ramis albido hirtis subtetrago
ni. Folia sessilia linear lanceolata semiunciualaria, margine pauci
reflexa, pilis raioribus adspersa superiora versus flores pilis longioribus
ciliata viri et latiuscula calycis

acinos T floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acute serratis Lin. S. V

Clinopodium vulgare Lob. ic. 506.

Clinopodium arvense, odymi facie Bauh. pin. 225.

Habitat in Europa glareosis, cretaceis, siccis ⊙

Caules tetragoni vel planiusculi, villosi. Folia lanceolato oblonga basi attenuata subtus nervosa, unguiculata, utrinque impunctata ad ambitum margine subpilosiuscula integerrima vel extrorsum dente uno altero. Calyces uniflori 10 in singulo verticillo pedunculati basi gibbi fulcati lanati inter fulcos pilis minutis celeati

glabratus
Corymbatus T. floribus vertillatis pedicellatis, foliis lanceolato ova
to glabruseulis serratis
Habitat ex hort. Da Lee
Caulis pubescens. Folia petiolata inferiora
fere pollicaria, utrinque punctata obtusa superne
dentibus utrinque 2. 3. vertilli 6–7 flori

Brownei T foliis orbiculatis crenatis, floribus pedunculatis axillaribus hirs
prodr. p 89
Thymus t. Brown jam. 259.
Habitat in Jamaica O.4
Caulis filiformis, septans glaber ramosus. Folia petio
lata parva glabra ovata utraque punctata glabra
pedunculi solitarii uniflori longitudine fere foliorum
finati glabri oblique truncati s. dentati

alpinus T. ventricillis seriplevis, foliis obtusis pubi concavi subserratis
Lin Spec. pl. p. 1264 Facqu. fl. austr. 1. t. 97.
Plinopodium montanum Bauh. pin. 225. Bocc. mus. 2. p. 50. t. 45.
Admi pulchra species Bauh. hist. 3. p. 620

Habitat in alpibus Helveticis, austriacis, Monspelii O
Caules procumbentes pilosi. Folia petiolata ovata, utrinque acuta serrata utrinque 2-3 superne pilosa subtus adspersa unguiculata subtus nervosa. flores utrinque 3. pedicellati. dentes calycis ovati villosi dentibus omnibus setaceis
Fontanesia villosior

adde Syn. Hall.

patavinus T. floribus verticillatis: fauce inflata calyce longiore, foliis ovatis serratis, caulibus suffruticosis Hort. Ven. 2. p. 314.

Clinopodium perenne Pulegii odore Bocc. mus. 60. t. 45. fig. 13.

Thymus patavinus Pacq. obs. 4. p. 7. t. 87.

Habitat

Caulis basi ramosus palmaris et ultra obscure Vestazonus villosus. folia petiolata utrinque acuta, extrorsum serrata subtus nervosa nervis 4-6 villosis utrinque impunctata unguiculata. pedunculi axillares breves utrinque quatuor flores folio breviores calyces basi gibbi, pilosi laneo glebbati hirti

Pannonicus T. vestitus ad apicem ramorum conjuncti, foliis ovatis caulegue hispidis.

Bauh hist. 3. p. 267.

ad Rumi accedens ad A. Richard

minki cymbifer

filiformis T. floribus axillaribus solitariis pedunculatis, foliis cordatis acutis integerrimis petiolatis, caulibus filiformibus decumbentibus.

Hort. Kew. 2. p 313.

Habitat in Insulis Balearicis ♄

non vidi

pipevella T: pedunculis multiflonis lateralibus; foliis ovatis obtusis glabris
nervosis integerrimis S.V. pag. 542 +
Manum hispanicum magnum Boiss mus. 2. p 166. t. 117. Barr.
ic: 354. t. 694.
pipevellam a Habitat in Hispania, Italia, Barbaria

Desfont hebd Caulis fruticulosus palmaris vel spithameus erectus ramosus, ramis
caule ramosp simplicissimis tetragonis villosis: Folia breviter petiolata, ovata
margine ramum reflexa semiamplexicaulia integerrima, subtus ner
vosa nervis villosis utrinque pennatata punctis depressis glaucescen
tibus. pedunculi axillares (impropriati) oppositi solitarii 5-6 flon. pedicellis sub
umbellati, calycis pilosi dentibus equalibus staminibus superioribus brevioribus
labium superius latitudine inferioris
variat calycibus pilosis et glabrioribus
Thymus imbricatus Forsk descr

hebd mus Thymus lecta Jolette et
Clinopodium manus spicatum nigricantibus foliis Boiss. mus 2. p. 108
tab 84
Clinopodium erectum fruticosum foliis lanceolatis
hic descripta est nervosis Desfont

Piperella Thymus pedunculis multiflonis lateralibus; foliis ovatis obtusis glabris nervosis integerrimis Lin. S. V. pag. 542.

Thymus imbricatus; caulibus decumbentibus, imbricatis; foliis ovatis acutis; floribus axillaribus, solitariis sessilibus Dorst. descr. pag 108

Dorstenia planta non differt a Piperella Lin: nisi quod omnibus partibus minor, et ~~pubescens~~ Numerosa hujus plantæ individua vidi in aliis locis omnibus ~~planibus Thymi~~ vidi digitalem foliis decussatis floribus paucioribus in axillis, in aliis vero semipedalem pedunculis multiflonis. Folia margine parum incrassata esse et carina ciliata semper observavi

Diffecta ~~Euphrasie foliis lanceolatis dentata~~ ~~2 fis dentibus utrinque subgeminis~~

~~foliis caudatis~~

Euphrasia officinalis ~~Euphrasia~~ Linn. Venus semi dissecto folio, angusto Boec. mus. 2. Tilli hort. Pis. pag 59.

Habitat in regno Neapolitano D. Cyrillo

Caulis palmaris, erectus, pubescens, ramosus. Rami simplicissimi folio formes.

Folia sessilia, opposita, ~~lanc~~ semiunguiculata, lanceolata, utrinque acuta, ~~opp~~ dentibus utrinque 2- vel 3 in medio folii, superiora breviora, inferiora longiora, subulata, apice uti et apex ipsius folii terminatis — sesta flavescente longitudine ipsius dentis

Flores axillares, solitarii, oppositi, sessiles.

Corolla Euphrasiæ officinalis

Communicavit plantam D. Cyrillo sub nomine Euphrasie odontitis

Hall. hist. stirp. 2 varietas officinalis varietas cum qua vero nullo modo quadrat, si varietas planta alicui erit, certe potius officinalis habenda, congruit enim cum ea quoad corollam in pluribus vero diversa et facile pro distincta haberi potest. Differt enim ~~rami~~ figura foliorum eorumque dentes foliisque et floribus omnibus oppositis nec tantum caulinorum

nervosis T. verticillis subsest floris foliis ovatis nervosis glabris integer
rimis calycibusque puneta tis

Habitat

Caule decumbentis ramosi Ver Brasiculi supeme pubescentis
Foliis petiolata semiunguiculatis fere rhombeo-ova
tis utrinque punctis copiosis resinosis flavescentibus
Pedunculis axillaris unifloris ternis utrinque vel solita
rii Calycis basi panum gibbi labium superius latum tri
dentatum dentibus brevibus obtusis reflexo-ciliatis
Facies Piperello duresa pedunculis unifloris calycibus
puncta tis

β foliis lineanibus anthis dentatis, floribus axillaribus solitariis Schreb. und. pag 25. sub Aguga

Anthyllis altera Clus. hist. 2. p. 106.

Chamopithys spuria prior Dod. pempt. 47.

Chamopithys moschata, foliis serratis Bauh. pin. 249.

+ Habitat in Lusitania, G. Narbonensi, Monspelii Barbani

+ Teneriffæ foliis sub tridentatis lineanibus, floribus spicatis lin. sp.

2-8 Striatus Thymus capitulis ante imbricatis, bracteis ovatis foliis quæ lanceolatis striatis margine
lineari
punctatis.

Habitat in regno Neapolitano Dedit Dn Prof. Cyrillo t

Tantillus sapeva vix palmaris. Planta digitalis. Caules plures, rigidusculi, erecti, basi ramosi: rami filiformes, digitales, erecti, verchusculi, inferne glabri, basi e casu foliorum muricati, superne simplicissimi

Folia sessilia, unguiculata, rigidiuscula, erecta, subtus longitudinaliter multistriata, supra lævia, utrinque ad marginem serie punctorum, glabra, ciliata, remote obscure serrata: quatuor vel quinque sub capitulo, caulemus semillima, modo basi latiora, longitudine capituli; fasciculi foliorum nulli in axillis

Capitula magnitudine pisi, terminalia, solitaria, ante imbricata. Bracteæ longitudinaliter ovatæ, vix semiunguiculares, acuta, villosa, virides, striatæ, inter nervos marginales punctatæ, ciliatæ.

Calyces longitudine bractearum: dentibus ciliatis

Differt ſiè a præcedenti: caulibus brevioribus strictioribus versus superne non ramosis: foliis latioribus erectis, subtus striatis, serratis margine tantum punctatis: capitulis minoribus, ante imbricatis, bracteis striatis, minoribus, punctatis.

220

cont.

villosus ♀ capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis setaceis pilosis

Lin. sp. V

Thymus lusitanicus, foliis capillaceo villoso, capite magno purpureo-cinereo villoso oblongo Tournef. ♀ R. H. 196.

β. Thymus lusitanicus, foliis capillaceo villoso, capite magno purpureo-cinereo rotundo Tournef. ♀ R. H. 190.

Habitat in Lusitania ♀ β in hort. nostr.

Dedit Cus.

nondi

numeduis Th. Lombus capitato spicatis hispidis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis, bracteis basi latissimis Pour. A. 2. p. 107.
Habitat in Barbaria

non vidi

mastichina ♄ floribus verticillatis, calycibus canuginosis dentibus setaceis
villosis Lin. Mant. 413. Spec. pl. pag. 827
Manum vulgare f. Clinopodium Bod. pempt. 271
Sampsuchus f. manum mastichen redolens Bauh. pin. 224.
Habitat in Hispanico petrosis ♄
Caulis erectus, pedalis ramosus Verticillis subsex vel villosis quinque
integerrimo sub capitulis sessilibus. Rami erecti. Folia petiolata oblonga remota supino
plerumque ramosa sessilia, utrinque punctata, avenia submembranosa, ad ambo costam
serratura una vel altera villosa semiunguiculata. Flores plerumque in capitulo
terminali collecti, interdum in axillis supremis capitulum
cum utrinque pedunculatum terminale mentientes valde
hirsuta bracteis tubis canaliculatis in attenuatis sub singulo
calycino calycis tubulato longiore quam in congenericis

Thymus

cephalodes Thymus capitulis laxe imbricatis, bracteis late ovatis coloratis impunctatis, foliis lanceolatis integerrimis

Tragoriganum dictamni capite hispanicum Barrel. ic. 780.

Thymus cephalodes: capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis Lin. S. V. pag. 542.

Mist. de Pourret 3.

Caules filiformes, purpurascentes, superne parum ramosi: rami subvillosi-cinerascentes, simplices.

Folia sessilia, unguiculata, lanceolata, pedentia, enervia, basi pubescentia, margine parum reflexa, integerrima, utrinque punctata: floralia duo sub capitulo lanceolata, parum longiora, obscure obliqueque nervosa. Folia caulis foliorum omnibus asteliis.

Capitula terminalia caulis et ramorum superiorum, solitaria, magnitudine fere huius corylli. Bractea late-ovata, unguiculata, obliqua, parum nervosa, nervis parum extrorsum ramosis, ciliis membranaceo, purpureo, impunctata, acuminata, integerrimo, ciliata.

Calyces purpurei: labio superiore parum latiore: dentibus setaceis; duobus inferioribus ciliatis.

Verte

an hic potius vellosus Lin

219

204 205

cephalotes secund Lin.

Thymus cap algarvensis cephalotos, thymi vulgaris foliis capitulo rotundiore Tournef. inst r h

Caulis vario ramosus: rami filiformes apice incani. Folia ovata sub tus incana margine revoluto, rilosa punctata. Capitulum oblongum. Bracteis rhombeo purpureo rilosa impunctata herb Desfont qui specim communicavit

β. Thymus Lusitanicus folio capillaceo, capitulo magno purpurascente capitulis brevioribus Tournef inst r h

Caulis palmaris ramosus. Folia subulata, ciliata. Bracteæ [illegible] ovato vel integro. Capitula sepe subpolliciana dedit Desfont

Tragoriganum I floribus vertic illatis, caule fruticoso erecto, foliis hispidis acuminatis hin Mant. 84. & I. V pag. 542.

Tragoriganum 2. altera species Clus. hist. I. pag. 355.

Tragoriganum magnum alp. Ett. 79. V. 70.

Tragoriganum Creticum Bauh. pin. 223. Raj hist. I. p. 523. &

Habetat in Creta ♄

Planta suaveolens. Caules hirsuti pedales. Folia ovata aeuminata hirsuta rigidiuscula hin

fruticulus palmaris ramosissimus: rami filiformes superne villosi canescentes. Folia frequentia breviter petiolata ovata superne punctata glabra Flores superne conferti hirt. Desont qui dedit

Tragoriganum

virginicus L. capitulis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis

Serpentaria virginiana Boec. mus. 2. p 161. tab. 115.

Polinopodium, pulegii angusto rigidoque folio, virginianum, floseulis in cymis dispositis Pluken. alm. 110. fig 4. fig. 2.

Pulegium erectum virginianum angust. folium, floribus in Cymis dispositis Mor. hist 3. p. 371. s. 11. t. 7. fig. 8.

Satureja virginiana Herm. parad. 210. t. 210

Satureja virginiana capitulis terminalibus, caule erecto foliis lanceolatis Lin. Spec. pl. pag. 793. 4

Habitat in virginia 4

Caulis erectus, ramosus, glaber ramis tetragonis folia sessilia glabra integerrima, utrinque punctata pollicaria, nervosa capitata terminali, pisi majoris magnitudine, globosa flo rona. Corolla extus villosa

varietas datur foliis angustis

Satur. virginiana

Indicus F. spicis verticillato-interruptis, caulibus erectis Burm ind.

Habitat in Ind. cà orientali

non Ind

1 Thym. villosus est Aegypto herb. sus
Fruticulus palmaris, ramosus rami villosi. folia ovata obtusa revoluta
Specim. deest sus. quod forte perdi

2. Tragoriganum alterum Bocc. mus. 3. 183. tab 83.

3. Satureja Bocc: sic.

4. Thymus orientalis densa spicatus flore albo Sherard.

5. an Thymus cephalotes lusitanicus mantemus glaber et lucidus Tournef. 6 h

6 Thymus cephalotes lusitanicus foliis et capitulis minoribus spicatus

7 Thymus odor herb Barrel. obs. 29

herb mus 8. Thymus algarve

9. Thymus serpillum hispanum nanum flore rubello Bocc. mus. 2. tab. 89

10 eadem flore albo

commun sus 11. Serpyllum pannonicum C Clus.

12. Thymus algarbiensis vulgaris foliis, capitulo octadron

13 Thymus lusitanicus cephalotes squamis capitulorum ampleonbus

14. Tragoriganum Dictamni capitis

15 Thymbra angustifolia flore rubro

16 Pseudodictamnus hispanicus amplissimo folio nigricante et villoso Tournef
9. v. h.
folia 2-3 pollicaria

17 minimus

18. inodorus
fruticulus subpedalis. Romæ sparsi

19. alyssoides etc:
Caulis vario ramosus, palmaris: rami supremi canescentes. Folia ovata rotu
ex armato supra villosula, punctata, subtus cinerea. Bracteæ rhombeo ovatæ
supra punctatæ, subtus villosæ

20 Thymus leptaneus cephalotus, squamis capitulorum amplexibus Tournef
Cf. r. h.
Caulis erectus subthamosus. Folia bracteæ in priore

21. Thymus cephalotus leptaneus. Folia et capitula minimi fructuosa
Tournef. in. r. h.
Caulis semipedalis ramosus: rami subsimplices, apice canescentes folia
herb. Dafour qui pro thymus lanceolata, basi ovata, revoluta supra punctata bracteæ ovatæ supra punctatæ
minor communis dentata et minores et subtus punctato

22 ex horto Ponsus
canescens Folia lanceata. Caules subsimplices villosi, pedales decumbentes
23 luteus
Thymus virens odore lutei citrei Bauhin
Caules decumbentes, ramosi rami subramosi
Th. luteus conjugatus fructus mystifolius pupentus
24 Cum folio
Thymus hispanicus cordis folio Tournef
Bauhf. Erectus subthamosus, erectus rami ramosi, approximati squarrosi
Caules pentagoni. Folia basi cilicata
25. Thymus leptaneus cephalotus squamis capitulorum minoribus
angustioribus Tournef