

Tragopogon

Calyx simplex: fructifera pyramidata connata. - Semina
teretia. Pappi styli lineari, semini subequali multothesque
longiore solidus, crustaceus.

glauca C. foliis foliis lanceolatis serratis oppositis ternisque, pedunculis axil-
laribus terminalibusq; subquadriplois.

Calceolaria glauca foliis lanceolatis serratis, pedunculis tri-4floris
corollis maculatis fl. peruv. l. p. 17. tab. 27. fig. 6.

Habitat in Canto antiquo

Caulis suffruticosus, tripedalis ramosis, teres; rami oppositi vel ter-
ni fragiles teretes, tamen leviter pubescentes, subpurpurei. Folia bre-
viter petiolata, patentia, venosa, utroque leviter pubescentia, supra
glauca. Pedunculi superne; pedicelli 3 vel 4 or umbellati; triflori
folium lanceolatum angustum a basi pedunculorum et pedicellorum
fl. Purpurea corolla intus basi macula purpurea

crucifolium Tragopogon

gr. nov

Caulis bipedalis teres, subtilissimus striatus glaber, ramo uno
vel altero. Folia angustissima, 8 pithamou, semiamplectentia
striata in teretissima basin versus sensim latiora margine mem-
bratim sectionem sublanata stata evanida. Calyx 6 vel heptaph-
foliis linear lanceolatis calycis parum longiora. Pedunculus
sub calycis lanceolatis stata glaber. ^{ut et calyx basi} flosculi triplici serie fusco
purpurascens + magis margine superne, dentibus basi flavis
eviglati reliqui

69
Mentha floribus pithamou, foliis linearibus, caulibus sessilibus
Vernia caulibus procumbentibus, foliis linearibus, floribus sessilibus
litis generis Vernia
Ment. Comm. p. 1702. p. 11. 7. 3.
Statist. in Virginia

jamaicensis *Rosea* nā foliis ^{oblongo-ovatis} spatulato ^{glabris} acutis ^{dentato-serratis} caute hirs.

Valerianoides Boekh. her. Lugdb. 2. p. 270

Vertena folio pulcherrimo serrato, flore caeruleo Sloan. h. v. 1. 71. t. 10. ^{7.} _E

Verbena indica Mill. Diet.

Verbena erecta Divisa, speciei & divanationibus supremis Brown
fam. 115.

Hortordum cultura Habitat in Jamaica et Caribaei. C. in pado suffruticosus ramosus; rami sparsi.
base fere glabri. Caulis pilis rarioribus hirtus ramosus. folia

vel acuta, pubescente
ba,
acuminata q. bipollicaria, grosse acutaque serrata, obtusa,
basi integerrima, obtusa, glabra nervo medio tantum pilis raris hirsuta
adpressa: rudimenta ramulorum in axillis. Petiolus basi dilata-
tus, semiamplexicaulis. Spica brythamoda. Bracteo lanicula
ta. *

Tragopogon

pratense T. calycibus corolla radium aequantibus foliis integri frutis

8. L. Dur

Tragopogon

Tragopogon pratense Luteum Bauh. pin. 274

Habitat in campo prati apud D

Caulis glaber purpurea superne ramulo nas alterve florifero. Folia glabra
nervosa basi dilatata ^{in ped. rufiacti} sensim attenuata semialexiscula

Pedunculi uniflori. Soleola calycina 8 lanceolata.

mutabile T - calycibus octophyllis, radium corollae aequantibus foliis integris striatis Can
Prolato-acuminatis. Gaigu. muf. v. 2 p. 316. fi. rar. t. 20

undulatum ^T calycibus corolla radium aequantibus, foliis integris sublineariibus, cauli
nis undulatis pinnis lacyn. Misp. 1.2. p. 317. t. 20

Habitat

Caules ramosis stratis glabres rami superne lanati
Folia semiamplexicaulicula glabra spithamoni 7 nervii
foliola Peduncululi ex apice ramorum saepe lanati
foliola calycis attenuata

magis *T. calycibus* corollae radiis longioribus, foliis integris striatis, pedunculis superne incrassatis,
corollulis ad apicem rotundatis. Gauch. auct. 1. p. 19. t. 29. Lin. l. V.

Habitat in Austria, Helvetia &

Caulis nitidi nani in pedunculos valde incrassati. Folia glauco viridia
striata axillis lanatis. Calyx 13 phyllis petalis dimidiis longiora. Anthera
fuso corollula flava. Semina aspera. Gauch.
B. dubium Scopoli

Orientalis *Tragopogon calycibus invollo radio brevioribus; foliis integris subundulatis* Lin Sp. pl. p.
1109 * S.V. p. 710

Barbarea Cam. epit. 312. figum

Tragopogon orientalis angustifolium, flore maximo luteo Tournef. Corol. 36.

Habitat in oriente ♂

Differt a *T. pratensi* flore majore; calyce ubi reflectitur quasi fracto; Radio corol
la subtus luteo, nec fusco striato; Antheris luteis nec fuscis L. Sp. l. c.

romifolium & calycibus corolla radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis sa-
perne introrsatis. Corollulis angustissimis truncatis Lin. S. V.

Ge. Bas. V. 797. Gaig. Coll. 1. p. 99.

Tragopogon alterum f. barba hirci Dalech. hist. 1089.

Barba hirci altera Cam. epit. 313.

Tragopogon purpureo-conuleum, romifolio, quod Artef. vulgo Bauh. pin. 274. Monf.
hist. 3. p. 8. f. 7. V. g. fig. 5.

B. Tragopogon folio oblongo serrato Bauh. pin. 274.

Habitat in Dania, Germania, & Italia.

Cetera quam in Crocif.
Totus glaber bipedalis et ultra folia lanceolata-subulata Pedunculis
valde nemusfutus magis quam in crocifolios

villosum T calycibus corolla radio sesqui longioribus caule folisque villosis Lin. Sp.
pl. pag. 1110 & L. V. p. 710

Habitat in Hispania &

Magnitudo pomifolia, sed tota planta villis albis pubescens, inprimis caulis
et foliis subtus magis copiose. Pedunculi cylindrici. Calyx enneaphyllus
corolla sesqui longior non imbricatus. Corolla seque magis pallida
radio 10. ^{longi} rami ~~et omnibus axillis~~ secundum totam longitudinem
unde corymbosa erigit. Flores ex parvis subsutans

non ind.

Eroisifolium T. calycibus corollae radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculique
basi villosis Lin. I. V. p. 710 &

Tragopogon eroisifolius montanum, flore nigro-purpureo Column. Ephr. I. p. 229
t. 230.

Tragopogon purpureo-roseum *Eroisifolium* Bauh. pin. 275

Habitat in Italia, Mongolia &

Calycis sphylli ^{radialis} rudalis
Paulis exitis ramosis Rami strictus Rami basi lanati & subtilissime striati

glabri. Folio subulata, nervosa basi dilatata villosa state glabra.

Pedunculi intricati apice tomentosi. Calycis foliulae squae. Semina
angulata mucronulis exasperatis stipes pappi clavatus glaber

aliam ex horto parisiensi tota glabra excepta calycis corollaeque longit.
Dum Calyx. de sphyllis

vennifolium Trag: foliis subulatis cauleque glabri calycibus ^{subtomentosi} corollae radium aequantibus

Habitat in Italia ex horto Paf:

similis quoad fructum *crucifolius* caule pedali foliis parum latioribus
Corolla purpurea differt calycibus longitudine radii foliis non
quinis sed pluribus forte tamen nil nisi varietas

apertum Tragopogon calycibus corolla brevioribus hispidis, foliis integris: caulinis oblongis L.S. V.
p. 710. Gouan. Monsp. 405 *

Lonchus appes, subrotundo folio, majori et minor Bauh. prodr. 124. prodr. 60.

Habitat Mospelii

uniflorum Engelm.

capensis Tragopogon

Tragopogon capensis Gaerth. coll. 2. pag. 32 D.

Habitat in Cap. b. p. i. D.

Caulis 3-4 pedalis solitarius basi crassitie d. r. erectus superne ramosus
pilis albis rigidis hirsutus subangulatus. Pedunculi terminalis semi
pedalis erecti infra florem incrassati parum hirsuti. Folici na
cinati, acutiuscula, simplicia, alterna, hirsuta, serrato-dentata
squarrosula, minime pungentia, calyx d. r. pilis albis hirsutus
foliolis d. lanceolatis Corolla flava. Semina incurva scabra Gaerth.

non vid.

ruber T. Glaberrimus, foliis amplexicaulis integris, floribus solitariis
terminalibus Cmel. N. 2. 163, 190
Habitat

non ad.