

villosum In folium
num

Trifolium orientale magno villosissimum, floribus flavescentibus Tournf. Cor.

Habitat in oriente Herb. Aus.

Totum villosissimum. Caulis herbaceus, erectus, simpliciter, nudus. Sola lanceolata,
^{superiora opposita} remota: foliola pollicare, linearis-lanceolata, sessilia, integerrima. Stipula
in acuminis subulato pollicare depressa. Capitulum pedunculatum pollicia
re eratum, erectum, solitarium. Calyx lacinios fimbria, unica longiore.
prope purpureum colloratur

capitatum Tr. capitatis umbellato-globoso, legumenibus obtusis permissis, forcatis
repentibus, foliis estripulatis Regnum magaz Naturae helv. 2. p. 20.
Habitat Dedit Ruhad
an a repente diversum

meli egyptium

Stylatum Triglochin spicis terminali cylindricis, glomeris reflectis, stylis exsertis hamofo
ni curvis

Habitat in Syria Herb. Desfont

Pauli simplicies piliformes; Veretris pila lobata pedata. Sola petiolata: foliola in
teriorum obsoleta, suprema linearia oblonga, striata, nervosa, serrata, semi
pollicaria. Laciniis stipulatum subulata. Spica terminalis pedunculata,
vit pollicaris. Palicies striati; villosi. Flores pedicello bracteis vix recurvatae.
Stylus in floribus defloratis exsertus hamofus.

otulodus Trifolium foliolis obcordatis, capitulo umbellans, caulebus procurrentibus.

Habebat in pastore monte video. Commer. ex herb. Gust. Murci

Radix bulbifera dupata. Facies Trifolii repens an modo varietas. Caules procurrentes an repenter. Foliola semi pollicaria, 8 natu, minutim dentata. Calyces 8 natu. Flores elegans some purpurei. Variat foliolis caule calyce que glabri vel villosi

more repens

all day

fringosum Mel. *Trifolium racemi cylindricis, leguminibus glutinosis* puberulis *disper-*
mis, caule erecto

Melilotus orientalis angustifolius capite fringofiore coeruleo modoro. Tenu-
nef.

Habitat ex heb. Vaell.

Caule erectus, triatus; glaber, sem plex. Siliqua vernata: foliola lanceo-
*latea, ^{bore} ad basim serrata, semi-pollucaria, glabra. Stipulae
dactio. Pedunculi axillares, elongati. Flores parvi. Racemi e laevis calyxi-*nis* dactio et stylo longiore persistente fringofi. Calyx patens. Lemina
leguminis magnitudine seminis rhapaeor.*

ſtrigosum Mel. In folium ¹² leguminosar. rademoris despermis Bubrotundis venofis, ranc
mis Cylen dn

herpetum Trifolium hispatum folioli obcordatis, capitulo subgloboso peduncula
tris

Habitat in Monte Vidae Commer. herb. Gar.

Caules procumbentes
4 foliati angulati facies exstaledi. Tota planta pulchri hergeta, palmarii. Folia longa
petiolata : foliola unguiculata, stipulo oblongo, parvo. Pedunculi ex
aliis supremis, folio longioribus, petiolis duplo crassioribus, opice radi-
cellis ternis semi pollicianis squalibus, bracteo duobus ad basim pedicello
num et duobus in medio laterali. Legumen hispatum, spernum.

Triphyllis rufa pilosa, sperma, procumbens Commer.

Trifolium

Habitat in Græsula Transcauc. Herb. Gus /

Sæcis Trifoliæ prætensis, an specie diversum? Rachis ramosus, uti folia
riles unicolor ad perscrut. foliola oblonga, obplete denticulata, emar-
ginata, semi, colligaria. Stipula oblonga, ~~amarginata~~ membran-
ea, acuminata. Capitulum terminale, bracteis ~~ovato~~ involucra-
rum.

In folium

Infolii frutescens Cappadocia herb. Tournef.

Habitat in Cappadocia herb. Tournef.

Praesertim palmaris vel ultra; diffisi

habes

Trifolium

Trifolium orientale, canescens, capitulo oblongo, pedunculo albo

Habita in cappadocia herb-Turcic: 2

Caulis pluero, intendum digitatus.

habeo

a