

Trigonella

angustifolia Trigonella Leguminibus pedunculatis racemosis declinatis incurvis
glabris sensim, stipulis canaliculatis integerrimiis

Patna ignota ex herb. Gussovi

Praes plures; ramosi, corys, Teretes; glabi. Folia, uti foliola petiolata:
foliola linearie - Cuneiformia, que leviter villosum, extorsum anguste
serrata, unguicularia vel munia. Stipello triato, attenuata, longi
itudine fere petioli. Racemi astillares, cuneolati: pedunculatus abz
mucrone terminali. Flores copiosi. Calyx villosum. Petala lineata
leguminina semipeltinaria, glabra, subulata.

*hybrida Trigonella floribus pedunculatis umbellatis, foliolis obovatis pubescenti
mis, stipulis crassis basi dentatis*
Habitat Nasbono ex herb. Gussidi.

*Pauli angulatus, uti & ha planta glaber. Foliola unguiculata. Sti-
pula longitudine petioli. Pedunculus foliar longior Legumen 5-6, vero
8a, semiunguiculata, parum angusta, lata. Pedunculus absque seta
terminali*

incisæ Trigonella Leguminibus pedunculatis racemosis declinatis Verruptis annuatæ;

stipulis integrimis

Habitat in Egypto ^{et} herb. Persicæ

Paulio ramosus, sicut natura, ut folia villosa. Folia et foliolæ petiolata. Foliolæ
lanceolata, serrato-crenata, semipinnata, villosa. Subtomentosæ, crenatae
que acuta, nervosa. Stipula semianguillaris, pubulata, integrer
nime. Racemæ axillares, multiflori. Pedunculus spinula rigida
terminata. Flores lutei. Bractæ parva, petiolaria. Legumina subtili
ta, lata, incurva, villosa tomentosa.

Lacunata Trigonella

Lotus egyptiacus vnde repens, angusto crenato folio fimbriatis aunculis
leppi.

Habitat in Egypto herb. Mus et. Gus.

Paulus pedales & ultra, Veretar, uti tota planta, glabri, ramosa. Rami simili
siliqua solida ternata: foliola obtusa, apice inaequaliter dentata, lina
ta, unguiculata. Stipula ciliata, lanceolata. Pedunculi astilla
res, folio breviores, mucrone brevi molli terminati. Legumina coni
tes 7. 3 semi unguiculata, decurrentia, oblonga, rugosa
varia leguminibus parum longioribus linearibus curvatis angustioribus
stipulis ciliatis.

^{oblongis potius}
nithenida T. Leguminibus pedunculatis congestis pendulis linearibus rectis, foliis
sublanceolatis Lin. Spec. pl. p. 1093.

Lotus montana Rumphius Trifolia ad caulem alata lutea, silequa modo
recta, modo medicaginea instar falcata nigra Ann. nith. 159
Melleolus fugina angustijolae, medie & facie, silequa compressa Ann.
nith. 154

Trigonella leguminibus pedunculatis Hort. Cliff. 3784

Habitat in Siberia

Carli ter, stratus glaber fabangulatus. Folia petiolata linearia, glabra
oblique striata, basi acuta superne seminata. Stylo pubulato. Pedun-
culi feliformes ex illis foliis longiori pollicaris in mucronem defi-
nentes. Flores verpi apicem racemosi approximati. Pedicelli fasti capilla-
rii tenetes sive. bractea setacea ad basim pedicellorum. Legume
re angustulana oblonga glabra

Culta

2 plati carpos T leguminibus pedunculatis congestis pendulis ovalibus compressis
cavite diffusa, foliis subrotundis lvs. filia: pl. pag. 1093. Jmel. sub. 4. p. 25.
f. 9.

meleotus silequa membranacea compressa Cet. petrop. d.
p. 209. V. 12.

Meleotus puparia latifolia, silequa lata membranacea com
pressa Amin. meth. 150. Cet. gott. 1. p. 213. V. 13.

Habitat in Siberia

Differit a priori folioli obvoluti. Leguminibus duplo vel triplo latioribus
pedicellatis in calycem
repulo capite dentato

Culta pedunculus ^{cultus} tota lenta glabra deflexus uti in omni Trigonella plus vel minus
rigida

3 Cernuata T. Leguminibus pedunculatis fabumbellatis ellipticis foliis cuneiformi
bus-dentatis, stipulis laeviatis Lin Spec. pl. plaz. 1095+

Habitat in Egypto

Similis medicaginis polymorpha cernuata. Folia foliformis lvae-
foliola lvae, retusa, acute dentata. Pedunculi axillares; vest longi
tudine foliorum, spinula molli verminalis. Flores umbelati. Legu-
mina fere meliolata; ovalia, utrinque acuta, calyx duplo longiora
Lin.

4 Anata T. Leguminibus pedunculatis congestis erectis scutis distantibus; pedunculus
foliis longioribus Lin. Suppl. p. 340. & L. S. p. 692.

Habitat in Abyssina

affinis similes. Toliola striae laterales, nevis profectum penorum.
Flores & ad exitum terminales non racemosi, sessiles lutei. Pedunculus
communis erectus, folius longior apice mucronatus. Legumina umbella
ta fere erecti, uti dicitur distantia manu, linearia,
L. folia, plana non rotundata. Lin.

non vidi

5 corniculata Th leguminibus pedunculatis congestis declinatis subfalcatis, pedunda
lo longo subflexo, caule erecto. See Spec. pl. p. 1034

Trifolium corniculatum L. Dad. pempt. 573.

Melilotus corniculus reflectis ex eodem centro 3d^{is} major Burch
pnn. 331.

Melilotus latiflora major, corniculus reflectis ex eodem centro ortis
Monsp. hist. 2. p. 162. f. 2. t. 16. fig. 11.

Habitat in Europa australi 6

Taleola obovata mucronata dentata. Stipulo subulato. Pedun
culi foliis duplo longioribus & tragoni, apice frumento molli. Sub quo
legumina 10-12. racemofl. congesti pendentes, pollicianaria parum
cavitora quam in infrequentibus. Calyxis ante et plicationem
colore obscuriore

cultam

6 hamosa T. leguminibus pedunculatis rameis
culis spinosis foliolo longioribus. Lin. Spec. pl. pag. 1094 &
^{longitudine foliorum potius}

Meleotus corniculus reflectis, minor f. repens Baeh. gen. 331.

Meleotus egyptius achemelichsowatus Alp. egypt. 41. V. 124. Baeh.
her. t. 2. p. 357.

Habitat in Egypto ♂

Caulis plures ascendentes palmatae vel ultra. Foliola obovata oblique
dentata dentata semiangustulata. Stipula lanceolata basi dentata
legue flore parvi Leguminosa versus apicem pedicellata conferti
Caulis & St. valde incrassati est apex fere basi tangit, venosa unguis
culanae crenaria
mea tota glabra si Legumina compresa esse
apparet

spontanea

7 Spinosa T. Leguminibus subpedunculatis congestis declinatis paleatis compresi; pedunculis spinosis brevissimis. Lin. Spec: pl. p. 1094.
Toenum grecum sylvestre polyecation creticum magis Breyne.

Cent. 79. t. 33. fig. 1.

Habitat in Creta

Totu glabra Rami ex ipso basi caulis, tota glabra, simplicissimi sputhamoi. foliola
obovata emarginata. petiolis unguiculatis. pedunculus petolo
brevior. flore parvi pedunculis. cinctus duob vel tres.
Canis glabra Cretana. introrsum arcuata, breve pedicellata. Legumen polli
lata dentata plana pubulata

Spontanea

O monspeliacum T. Leguminosae congesto scaphisibus anuariis divaricatis undulatis brevi
bus; pedunculis mucronati cernui. Lin Spec. pl. p. 1095^x

Hedysarum minimum Dalech. host. 446.

Scoenum grecum syriacum polycaratum minus monspeliacum Breyne
Cant. 80. t. 33. fig. 2.

Habitat Monspelii

planta

Pauci prostrata terre adpresso in fructifera rigidae; folia lebida
pubescens spithamea. Foliola acutae serratae. Flores subcapite
in capitulo sessili. Legumina Verbis transversim negi elevatis, unguis
in culta brevissimi ad duriorata. Culatta parum incurva excedet 12. ^{sessilia} stipula lanceolata
acuminata bafi dentata cernufo

Montanea

9 polycerata T. Leguminibus subfissilibus congestis erectis subrectis longis lineari
bus; pedunculis multicis s. v. p.

Toenum gracium sylvestre alternum Dad. pempt. 547.

Toenum gracium sylvestre alternum polyceratum Baub. pma. 340
Mediis agos leguminibus confertis longis rectis parallelis, pedunculis
communi Host Cliff. 376+

Habitat in Hispania, Monspeli & Italia ^O astillaria
folia parva, ^{ola} cuneata, acute ferrata. Legumina 2 - ad 4. vix pedicella
ta bipinnicoria venosa acuta introsum parum curvata

monspeliacia Trigonella Leguminibus flosibus congetis arcuatis divaricatis inlen-
natis brevibus, pedunculi mollieres mucronatis Lin. s. v. pag
Trigonella stellata; Leguminibus astillibus, confectis, flosibus, rigidis
arcuatis, in stellam extensis Döglf. des. pag. 140

(80. s. v. stellata n. i. nisi mero varietas, ~~varia eminente qua~~ ^{sola} a ~~tenore~~ ^{epicantum} differt
est quod foliis apice non rotundatis sed tenuis)

~~monspeliacia~~ Tryphall

pennatifida Trigonella caule prostrato Tetragonon: leguminibus lineanbus compresi
seratis fuscis Car. ex. p. pag. 26. tab. 30.

Habita in vicinis madati. G

10 Toenum grecum T. Legumi nibus fessilibus strictis erectis sciales subfoliatis acuminateis,
caule erecto. Lin. Spec. pl. p. 1095 &

Toenum grecum Lam. ep. 199.

Toenum grecum sativum Baeh. gen. 348.

sylvestris 13. Toenum grecum sylvestre Baeh. gen. 348.

Habitat monspelii O. erectu' rulis ranunculis ad pressi apice pubetibus
Pauli simplici sumis peda lis. Obolela cu' testa argentea ferrata
pera polliciana, glabra. Stipula lanceolata peloponnesio. Flores
solitari vel gemini fessiles. Legumina quaeoni pollicari canis
extorsum curvata styllo longo acuminata glabra. Sylvestre 13.
Differt Holonibui ad radicem longior, rotundatum caulem, Testa
ad pressi. Oboleli obvoluti nec lanceato lanceolatis. Geminiulis
folesorum purpurascens. Leguminibus magis hispida. Lin

varetor. sylvestris

11 index a T. Leguminibus. ^{sub} foliis ^{rectis} foliariis, folioli integerrimis,
caule diffuso. Lin fl. Augt. 205^x
Lotus mediterraneus velloso, ornithopodi plegua fragularia Platin
alm. 226. t. 200. fig. 7.

Habitat in India.

Caules pedales
Tales loti pubescens velloso subfascia. foliola lanceolata basi
foliola labera ^{ante unguiculata} omnia foliis nec intermedio petiola
lia subfalcata ^{40 ut in coeteris stipulae semiovata acuta mucronata.}
ut in loto petiolis dimidi branca. flores foliari rarii gemini bensi
Legumina brevissima pedunculata, recta linearia byzantiana
velloso, acuta.

front.

an loti species habita certe cum hi magis convenit