

Triopteris

1. rigida T. foliis subrotundis acutis marginatis lencatis coriaceis, racemis  
conproptis axillaribus, capitulo trialatis
2. Cetrifolia T. foliis oblongis integris utinque glabris; racemis axillaribus  
ramis dichotomis, capitulo quadriangularibus.

rectenata Herda Hocque hist. pl. amer.

Habitat in America

michi ignota Character <sup>gerani</sup> seu in Syst. ed. Mar. diversa a Hoc quae

cepsidosa *Saxifraga*

*Saxifraga pedemontana* et *Hypnoides* All. ~~Leptostomum~~ sec: Wulff

ovata Tropaeoli foliis ovatis lato cordatis integerrimis glabris, flombis paniculatis

Parva. Duf. p. 431. n. 591. Tab. 2 59.

Habitat in Tropaeo St. Domingi 5

non vide

reclinata Troptenii foliis oblongis extropsum calvioribus ut nunc ab aliis ipsam  
elongatae Corran. Des. p. 431. fig. 592.  
Thaea reclinata Gaertn. am. p. 67. t. 260. f. 37.

jamaicensis T. foliis ovatis attenuatis venosis nitidis, racemos compo-  
tis terminalibus capulis 3 salato Sw. ob. pag. 103. \*

Monteni jamaicensis den. Spec. pl. pag. 613.

Banftena capsule triangulari, foliis ovato acuminati, racae  
mili terminalibus Brown Jam. 231. 3.

Habitat in jamaica

Tricet scandens, volubilis: Rami patent & divergenter terete  
glabri. Sola petiolata opposita ovata, vel ovato  
canciculata, indegenima, saturate viride. Racemi  
terminales et ramulorum axillarum raro axillares  
paniculato racemosa rami opppositi. pedunculi florae  
florei coerulei. Calyx spathus laciniis basi glandulis  
adnati. Petala parva undulato - ciliata. Filamenta 10  
styli 3. filiformes breves. Capsule 3 separabiles. Salata  
propter alam medium Sw.

Tropaeolum inqualis Herb Rev.

rigida T. foliis subdundis acutis marginatis lineatis coriaceis; racemis com-  
positis atellanibus; cappulis trialatis siv. prodr. p. 75.

Habitat in Hispaniola

non vidi

Mergier