

Vogelia

92 Triptarella

Cor. ~~la~~-fida: lacinios alternis minutis: tubo angu
lato, basi ventrioso.

Capitata 1. Tripterella. Michaux fl. bor. Am. I. p. 10. t. 3.

Anonymus capitatus Walt. fl. car. 68.

Vogelia capitata Gmel. ed. 3. yst. Lin. 2. p. 107

Tripterella capitata; foliis setaceo; folio tubulato; floribus
in capitulo terminali

Habitat in adi. Carolina Boeck, in Cajenna Richard.

Caulis filiformis, spichamon vel semipedalis, erectus, simpli-
cissimus, globos. folia sparsa, remotis summa, paucis, vagina longa
sus pubulata. Flores albi, capitati. Capitulum magnitudine pse.
Spatha univalvis.

Corolla monopetala, basi ventricosa, medio evanescens, superne
angulata, angulis pubescentibus; limbus trifida trifidus;
lacinias alterni, minuti. Anthers pilosissiles intus lacinias
germen inferius. Stylus longitudine staminum. Stigma tripli-
cata. Capsula trigona, trilocularis, polycarpha. Richard.

Affinis Burmannia Richard

~~Cypripedium~~ paludosum Auct.

Habita in Papuia New Guin.

Bulbus conoides globosus; concentrico tunicatus. Sola plurimae radiculae,
petiolata, linearis - lanceolata, nervosa, glabra, 3-5 pollicana. Scapus
erectus, foliis brevior apice folium unidens, erectum, lobi vaginatis.
Scapo alterius, fructiferus caulinus. Specia simplicitate, foliis, bracteis paucis
distichis imbricatis, lanceolatis, amplectebibus, unifloris. Calyx per
bracteas rotundus ex fido. Ovarium lescens, sit post scapo. Lacinia 3 est, venae
~~laborata~~, recurvata paleata, 3 cm. inter se, multo minor,
majoris, concavae, quae in utero rotundata, genitaria oblongata, cornuven-
ter. Tubus brevis, deorsum adutus. Stamina 3 brevissima. Flores dilata-
coemiles.