Proximum

Calyx oblongus simplex vel imbricatus. Receptaculum nudum pus.

Dandelion

virgineum

Lanatum

ho tres genere forte differunt: Calyx enim in Lanato imbricatus nec simplex. Pappus in Dandel. simplex in virgineo et Lanato plumosus. Omnes mihi ignotae sunt ideoque determinare neqeo num diverso generis sint

Trostimon Gaertn.

Glaucum glabratum

Trostimon glaberrimum, foliis infimis lanceolatis sub petiolatis caulinis cordato lanceolatis semiamplexicaulibus

Habitat in monte Video Brasiliae Commerson. Et herbario Tussi ai

Caulis herbaceus, erectus, semipedalis, ramosus, glaucus: Rami simplices. Folia infima subpetiolata, supra spithamaea, omnia acuta, plerumque integerrima, raro dente uno alterove notata. Pedunculi terminales, ~~ramosum~~ elongati solitarii, unifloriferos, folio uno alterove sessili adspersi. ~~Pappus~~ Calyx simplex foliolis lanceolatis. Pappus simplex sessilis

H glauca sit

Crepis

Hieracium creticum, Endivia folio Tournef. Cor. pag 35

~~Habitat in~~ Creta Herb. Tournef.

Caulis foliosus - angulatus, crassitie fere pennæ ~~anserinæ~~ cygneæ, glaber, superne ramosus, villosus: rami alterni, subfastigiati. Folia lanceolata, radicalia in petiolum attenuata, remote denticulata, spatharum, rare villosa: ramea semiamplexicaulia, remota, basi dentata: suprema margine membranacea. Flores versus apices ramorum, plures. Pedunculi et pedicelli villosi: pedicelli uniflori. Calyx exterior foliolis oblongis, membranaceis, dorso ferrugineis, longitudine fere interioris, circiter 6. glabris: interior villosus: foliola lanceolata. Pappus stipitatus, simplex. Semina longitudinaliter striata.

Dandelion Tragopogon foliis ensiformibus integris laevibus, scapis radicalibus Lin. Spec. pl. p. 1111. * S.V. p. 710
Leontodon foliis ensiformibus integris, calycis erecto simplici Gronov. Virg. 114 *
Habitat in Virginia
Folia ensiformia, longa, glabra integerrima. Scapi unifloi omnino aphylli, apice pubescentes L.l.c.

virginicum Tragopogon foliis radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indivisis Lin Spec: pl. p. 1111. & Gron. Virg. 113. t. V. pag 70

Habitat in Virginia, Canada

Folia radicalia plurima, lyrata: lobis rotundatis, glabris. Caules subnudi, erecti, striati: folio uno alterove, lanceolato, integro, amplexicauli; ramis paucis. Rami terminantur pedunculis tribus, ad quorum exortum folia duo, lanceolata, opposita: altero minore. Calyx in 12 folia ad basin divisus, aequalia, corollae breviora. Flores saturate lutei. Habitus Arnicae Gerberae. Pappus plumosus non est nec stipitatus sed simplex. Statura Hyoseridis. Calyx Tragopogonis. Semina Hieracii Lin. l. c.

Canadum Tragopogon foliis ensiformibus undulatis villosis, scapis radice albus L. ~~Am. ac 4 p. 287~~ * Spec. pl. p. 1111. * S. V. p. 116.

Leontodon foliis ensiformibus integris hirsutis, calyce erecto simplici L. Am. Ac. 4. p. 267 *

Rauw. A. 217.

Habitat in oriente, Palestina

Radix bulbosa. Folia lanceolato linearia, plurima, digitalia, utrinque lana alba hirsuta

L. Scapi foliis paulo longiora, in medio foliorum, fere vix manifestum, hirsuti, uniflori. Flores magnitudine pedofello. Calyx longitudine fere corollae, canaliculatus. Corolla lutea hirsuta Am. l. c.

non vidi