

Ucriana

Speciosa Veronica foliis cedo - oblongis, corymbi terminalibus, pedunculis trifloris
floribus longissimis fuscis illos id.

Torreyana Speciosa; foliis ovatis, basi subcordatis, nitidis 8 imis, coria
cero: floribus cyanois Cat. Bot. Inst. nat. Par. 1. p. 1007.

Habitat in Californiam Richard. T.

Rami obscuri Vetriconi, ut vito glaberrimi. Seta petiolata, spissa
mida, acuminata; subcordata, ova, nitida, subtilis pallidiora, sub
nervosa. Stipulae laterales, ovato-lanceolatae. Calyx quinque dentata
tus, dentilis ovatis. Corolla hypoleuca [#]. Stylus clavatus. Anthe
ra versus basi filamentis horizontaliter inserto. Porolla lancea lance

Lacordia lanceolata ^{II} Dalmatica tubo longior.

~~Tocoyena~~

~~Habitat herb. Gus.~~

Rhamn Veretis; superne obfure Tetragoni, glabi. Sola petiolata, opposita, semi-pedalis,
Coracea, ovata, integerrima, parum acuminate venosa, supra nuda, utrinque
glaberrima. Cymbus Verminalis. Pedunculi triflori. Corolla Tripllicans.

parviflori
elliptica Uteriana, foliis ellipticis, utique acutis, pedunculis terminalibus
ternis dichotomis, corolla brevibus.

Habitat in Brasilia herb. - Guzai f.

Rami Vetragoni, cuspitie penne cygnei, uti tota planta glabri. Tota
petiolata, 4-5 pollicaria, parum acuminate, venosa, supra nitida,
integerrima. Pedunculi torquato-compressi. Calyx deuter ovati,
acuti. Corolla semipollucans. Capsula cylindrica oblonga,
pollucans, cuspitie digitis intermedii.

~~Tomentosa Genipa~~

~~Habitat ad Senegal Herb-4usf. 5~~

~~Rami Veretesi, c. c. abrictati, glabri. Sola versur apicet, approximata, pediculata, bispol
lucana, oblonga, ali petoli Tomentosi, mollia, subter fons de incana, supra viridio
ra, arvensis, oblique remote nervosa, parum acuminata, basin versus attenuata,
Stipula membranacea, ovata, acute, glabra. Flores Verminalei; plures; pedicella
ta in cymbo brevissimo. Calyx lucinie subulata. Corolla pollicans; extre
misperita vello non nullo.~~