

# Urtica

## foliis alternis

48. cappulatae u. foliis ovatis scabriusculis, floribus terminalibus pubescentibus monochro-  
matis, ramiis, caule & fls.
49. effluens u. foliis cordatis, racemis dictyonis, fructibus orbiculatis corymbosis
50. capitatae u. foliis cordatis, glomerulis spicatis
51. niederseckeri u. foliis cordatis ovatis obtuse serratis, paniculis astillanibus divaricatis  
corymbosib.
52. hispida u. foliis cordatis ovatis serratis, racemis compotis, caule petiolisque hastis
53. divaricata u. foliis ovatis, racemis compotis divaricatis
54. condensata u. foliis cordatis ovatis, amentis supra fabri, amentis ramosis distinctis erectis
55. clota u. foliis ovatis acutis serratis, subtus molliter vellosi, caule arboreo, ramis  
nudiusculis racemiferos, floribus discis
56. latifolia u. foliis cordatis ovatis obtuse serratis subtus vellosi supra fabri, panic-  
ulus astillanibus, caule herbaceo
57. elongata u. foliis ovato-cordatis serratis petioli aquantibus, spicis ramosis  
elongatis interrumpiti, floribus distinctis
58. interupta u. foliis ovato-cordatis petiolo suberionibus, spicis solitariis interrump-  
tis
59. nevera u. foliis ovatis utrinque acutis serratis subtus niveis  
bo Koenigii u. foliis ovato-cordatis serratis acuminatis subtus niveis

61. argentea U. foliis ovatis acuminatis trinerviis subtus tomentosis, glomerulus spicatus  
caule fructuosa.
62. mollis U. foliis lanceolato ellipticis integrimis subtus ramisque superne  
villoso - canescens, fructuosa (an arborea)
63. baccifera U. foliis cordatis dentatis aculeatis, caule fructuosa, calycibus coeminentibus  
baccatis
64. sspiliflora U. foliis lanceolato - ovatis coenatis, racemi brevissimi astillantes,  
floribus monochrois distinctis, caule erecto.
65. arborea U. foliis ellipticis subtus villoso, panicula terminali ex fructu  
ramosa
66. capensis U. foliis cordatis crenatis subtus pubescentibus, fructu interruptis
67. frutescens U. foliis oblongis exspicatis subtus nivis
68. stimulans U. foliis oblongis basi versus attenuatis integratis, paniculis axillaribus
69. japonica U. foliis cordatis villoso, floribus glomerato - capitatis
70. muralis U. foliis ovatis trinerviis pubescentibus serratis, capitulis astillaribus spili  
bus
71. villosa U. foliis cordatis hirsutis, globulis sspilis

glaucia Litsea foliis oblongo lanceolatis glaberrimiis subtripliciter viciis  
mis, pedunculis ramosis, pedicellis vesticillatis Glaberrima

Habitat in Montenore ad Ryan.

Paulus Herbarius: nomi Verdero; qd uti tota planta, glaberrimi, peduncu-  
li, pulvere glauco ad pres.

Lolia petiolata, opposita, 4-5 pollicaria, pollicem lata, ubique fere  
eodem latitudine aperte rugosa, ~~ramum ramosum a levana sangu~~  
~~ramum rugosum dextre non rami~~  
flosca, acuta, basi subovata, ~~et~~ oblonga oblonga oblonga, utrin-  
que glaberrima, vnde ~~q~~ laevigata, non venosa: nervi ter-  
marum supra basi, rugosum medium evanescere.

Petiolis ~~super~~ pollicaris. Styphula decidua, oblonga, unguiculata,  
feruginea fusi.

Pedunculi ex axillis ultimi et apice, longitudine foliorum. Pedun-  
culi partiales rugosum superne in pedunculo, patentissimi, confe-  
nori oppositi foliorum ~~vel~~ ~~ramorum~~, superiores uti minoris  
vesticillati uti pedicelli

Flores monoicii.

Litsea Litt. E. Ad Ryan.

obtusata Urtica foliis oppositis, ovatis obtuse serratis, trinervis obtusis, fructu ramo  
fus, glomerulis sessilibus.

Habitat in Mont. serrat. Dr Ryan.

Caules herbacei, teres, striatus; superne pubescens.

Xolii petiolata, opposita, bipinnata, supra glabra, oculo armata  
pulis aliquot adpresso, subtus glauco vindicta, nervis et venis majoribus  
pulosis, grosse serrata: serratis obtusis; basi versus integriformis, ciliata  
morum subquadrangularium, nervis acutinatis, Venuia.  
misiva tripartita

Petiole longitudo foliorum, pubescentes. Sipulae membranaceae, tenues;

deinde.

Pedunculi axillares, folio longiores, ramosi: rami farsi, ramulosi: glome-  
ruli florum sessili

(An gemina ut. Lactuca Sardicæ at folia non ciliata).

Dicotoma

Urtica foliis oppositis ovatis integerrimis stinacis subtus incanis, pedunculis dichotomis ramosis, glomerulis floribus fimbribus.

Habitat in Montferrat <sup>Dr</sup> Ryan.

Pauli herbaceus, eretum, glaber, crassifolia penna anterina, simplici, raro glandulosa adspersa, fluitans.

Folia opposita, petiolata, bipinnata, <sup>super</sup> et ultra, panus attenuata, acuta, venoso-fibrilis ciliata, supra vinda, foliis raro simplici ornatissima adspersa, integerrima, pilis brevibus remotis ciliata, tenera subtus a striis brevissimis foliis innatis incana, nervi et veno fusco-purpureo-rotundatis.

Petiolis foliis dimidiis brevioris interdum cinerascentes. Stipe <sup>D</sup> alato, menabonaceo, - tenero, decidua.

Pedunculi astillares oppositi, foliis longioris, glabri pallide fuscate, apice in ramos dichotomos, filii formae patentem, ultimi capillares. Flores in globo in glomerulis fimbribus, alterne, tres plenariae in singulo pedunculo proter glomerulis dichotomis, forma in rei in diffinito planto. Pedunculi in masculis crassioribus, minus ramosis, glomerulis majoribus.

Ovula

Ryan Litt. b. formae litt. e. mai.

*Coreopsis*

106 Montserrat

Geminata Urtica foliis ellipticis ovatis, acuminatis integerrimiis Trinervis marginè  
glabris, præ*s* terminalibus geminatis dichotomis.

Habitat in America meridionali ab v. Rohr

Pauli herbae cur glauco-purpureo; glaber.

Folia petiolata, opposta, b-s. pollicaria, elliptico-ovata, altero-latera lobo  
panum angustiora, integerrima, aluminata, basi obtusa, Trinervia, supra  
adpresso peli minutis decumbentibus, albis, raro finis, subtus pallidiora  
rare pilosa in costa nervis et venis.

Petiolis b-s. tripollie are, glabi. Stipulae oblongae, membranaceæ.

Pedunculi ex apice, gemini, viri longitudine petiolæ, oculo armato  
rare pilosi, dichotomi. Glomeruli florium fasciles; magnitudine fer  
pisi, alterni, approximati. Bractæ ovato, parvo, membranaceæ.

Calyx virides; ore canti stroboli

prope grand. Collar.

182/38. Ab v. Rohr.

~~Polyodium frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis serratis, stipite~~ <sup>extrosum</sup> ~~fusco~~  
~~franico~~  
Habitat in Montferrat Dr Ryan

180 250 accedit ad Plum. fig. 112.

180 12

anfractum herb. noff

baccifera u. foliis cordatis dentatis aculeatis caule, laetiv. o/s, calycibus  
foemineis baccatis. Lin. I.V. Sw. pbf. B. pag. 358x  
utricula arborens baccifera Plum. spec. II. fol. 268.  
utricula fructifera; foliis amplioribus ovatis serrato-dentatis, aer  
is petiolis Caulibusque aculeatis Brown Jam. 337

Habitat in Amer. et herb. Afr. arbusto 10-16 pedatis opice duris, aculeatis. Aculei crassi, breviusculi, ex parte longitudinaliter caulem occupantes. Ramificatio  
baccis aculeatis, perenne uscente. Solia magna spathamoa,  
petiolata, cordato-ovata, serrata, nervosa, glabra. Nervi subtus  
petiolisque aculeatis. Pagina superior foliorum punctis convexis  
aculeo terminatis, adpersa. Radici caulinis multi partiti aculeati  
nubri. Flores terminales in ramulis racemorum sepsilon corollis  
nectarium masculis in fundo calycis cyathiformis Sw.

### Folii ovato-oblongis cordatis ve dentatis

Caulis petiolis, foliis prossimis subtilis aculeis paucis recurvatis  
folia petiolata, alterna, spathamoa vel minora, glabra, tenera, subversa  
so, nervosa, nervi et costa aculeatis, remota dentata, acuta. Ramifi  
cacio, perungu cygnis, purpureo-scentes. Stipulae canaliculatis, alte  
ravissimis petiolis feliformes, germinant, de hibernatione. Petiolis  
~~caulinis~~ aculeis

ostuans ut foliis cordatis, racemis dichotomis, fructibus orbiculato-

Corymbosiflora Spec. pl. pag. 1397 & t. V

Pino s. Utua Piso Bras. 235

Habitat Surinamia

Paulis simpliciter pedalis, hirsutis aculeis internebus. Dolia infi-  
ma opposita repleta alterna, cordata lobis basioris oppo-  
sernata, serrata, trinervia, petiolata, hirsuta. Ramus et  
pedunculus e singulis aliis. Radix horizontalis laterali  
patens, dichotomus. Flores magis solitarii e singula dichoto-  
mia cithreni niveis, foeminei menti. Semina in orbe  
digesta. Monocotyledon

14-70

elengata articulo folio alternis ovalo cordatis serratis petiolis equantibus specie ramosa  
clavatis inter septis floribus distinctis

Habitat in India Occidentali

foliis rebatur Affinis Urt. interrupta diversa vero quod omni bus partibus majora folia ad  
nec bofis integrum bafis usque ad caput nonem fer. dentato serrato, petiolis pubescentibus. Specie  
ramosa ramosa, ramis dichotomis semiuirginalibus et semipinnatis. Specie  
folia utrōq. dicot. ramosa, ramis dichotomis, pinnatis semiuirginalibus et c. foliis  
et majora spiculis dichotomis, pinnatis semiuirginalibus omnes dichotome ramosi et foliis.  
Confundit nec in glomerulis globos colletis

Cymis ramosi dichotomis diversicatis

folia ferentia dicot. subtilis pallida

Urtica racemofo ample coryli foliis plum. herb. Guss. et Suran.  
Urtica grandiflora Ad. Soc. hist. nat. Paris. hinc vulgo pomelli Richard.

glomeratis globo cymulis globos compactis

n. interrupta semina ovata margine acuto dico punctis non nullis  
elevatis semina semicirc. dentibus obtusioribus

urtica angustifolia

interrupta & foliis ovato-cordatis serratis petiolata subbrevioribus, specie solita  
non interrupta Linzeyl. 336

Batti-Schonigeram Rheed. Mal. 2. p. 75. t. 46

Lupulo vulgaris similis ind. orientalis floribus inspicuum est origine  
foliorum prodeudentem. Plak. aln. 229 Tab. 201. fig. 5

ut & a laticea specata, foliis floribusque petiolis longissimis donatis  
Wurmzeyl. 234. Tab. 110. fig. 2.

Utricula pulicaria, foliis majoribus longissimis pedicellis minori  
bus donatis Wurmzeyl. 232. Tab. 110. fig. 1

Habita in India orientali.  
Paulis herbaceis erectis stratis glaber. Setae petiolatae, utraque  
glabra acuminata, serrata, bipinnata. Stipulae setacea.  
Petiolis foliis longior. Specie ex illacei pedunculata folio  
longioris simplici. glomeruli alterne <sup>inter se</sup> remotiores superne  
confestroni

Rumph. 6. t. 20

simplificatus

19. 20. Lit. U. Urtica foliis alterniis cordato-ovato, racemis compisis, caule petiolisque  
hirsutis!

Lit. U. Urtica divaricata Borff. defr. pag. 160.

Racemis herbae eius pedaliis, flexuosis, foliatis, hirsutis & propositis superne.  
Sobie alterna, cordato-ovata, ferrata, acuta, subtilis pallidiora, nervosilla, foliis, pollicanis.

Petiolis hirsutis, longiusculis foliis

Stipulis lanceolato-linearia

Racemi axillares, foliarii, patentissimi, compoſiti, foliis longioribus; racemulis par-  
vis, subramosis, remotis a ſtuli pilofisi, patulis: floribus glomeratis.

Primo intitulu asperulat Urt. internuptam dicitur et vero hirsutie, foliis bafi-  
feratis nec integerrimus, aperte acutis non vero in acuminis produci-  
ti, foliis ramosis.

Altius. canad. recedit foliis minoribus bafi feratis, hirsutis, racemis  
foliis longioribus non supra dictum compoſiti.

moderatu U. foliis cordato - ovatis obtuse serratis; paniculis setillibus  
divaricatis - corymbosum Tost. prod. p. 66.

Habitat in Tapulu forestatis

Caule suffruticoso ramis herbaceis teretibus glabris. Folia petiolata  
alterna pallidiora subtriangularia pallidiora - panicula longitudine  
foliorum

---

caule suffruticoso

coffro usnea folius alternis cordato-ovatis ferratis floribus astellans se plicans  
canele debili ericinifolo Thunb prodr pag 31.  
Habitat in C. b. forei

non vidi

Urtica foliis ovato-acuminate spinosis subbasitomentosis, glomerulis  
spicatis, cavitate fracto  
Urtica argentea foliis alternis elliptico-lanceolatis integris subbasitomentosis:  
spicis axillaribus solitariis intemperitis destr. prod. pag. 65:

Communicata a Dr Tabacio *mollis sanguinosa* - *mollis sanguinosa*  
Tridax. Ramii terete, superne purpurei, apicemque et superne cineres flexuosi.  
Solia petiolata, bipinnata et ultra, multa, obtusa ferrata, acuminate,  
super glabra, subtus venoso-reticulata cinerea et albida cinerosa  
mollia but tubo ordinata

*See Pedolus* Pedolus *mollis aris, mollesimus.*

*Spiculae* longitudine petrolominis patentes, glomerulo 2-3 in fasciis appresso remoto, globos.

Honeyi Urt. foliis ovatis cordatis basi rotundatis serratis acuminatis subtus nivis <sup>sparsis</sup><sup>compositae</sup> floribus diuersis  
Ramum ex quo Rumph. amb. 5. p. 214. Tab. 79. fig. 1.

Habitat in India orientali Honey. 4

5-6 pedes.

Pauci basi legnosi per ramos profestim superne, terete. Dolia petro-  
lata alterna, ovata, q. s. pollicana grosse rata supra in nervis  
vix ramosa. Subtus nivea in nervis, velosa. Stipulae lan. ciliatae  
attenuatae. unguis clavata <sup>in constricto parvo globulo</sup>. Spiculae subramosa petiolata brevis  
sc. flores minuti <sup>glomerati</sup>. Petoli longitudo foliorum  
differe videtur a niveo petiolis brevioribus. foliis basi  
ovatis nec acutis. modo vanetis.  
sparsis facie latum

japonica u foliis cordatis villosis, floribus glomerato-capitatis Thunb  
fl. jap. p. 704 Pl. 851.

Habitat in Japonia

Caulis ~~tetragonus~~, fuliatus, erectus, pubescens. Folia alterna  
petiolata, cordato-ovata, acuminata, inaequilatera serrata,  
vello-sicra, supra iridia, subtili pallida, fuscopallidiora  
Petoli foliis dimidiis breviores. Flores axillares glomerati  
glomeruli pedunculatis globosis

Differat U. capitata caule pubescente foliis vellosis non  
aequilatera serratis, florum glomerulii pubgloboſi Thunb

non ordi

capitatae foliis cordatis, glomeratis precatis Lin. Spec: pl: pag. 1397\*

Habitat in Canada

Paulus erectus angulatus nudus. Tolea alterna cordata, acuminata  
aequaliter serrata, nuda, petiolis duplo longiora, subtrinervia. Racé  
mi glomerati plures in speciem simplicem dispositi suspentes, foliatae  
Lin-

— serratis

non vidi

*canadensis* il foliis cordato-ovatis, amentis ramosis distichis erectis  
Lin. S. V. pag.

*Urtica canadensis* rameosa mitior s. minus rurent Mon. his t. 3. p

734. f. 11. T. 25. fig. 2.

*Urtica divaricata* Gaertn.

Habitat in Canada & Siberia 4

Dioica

Caules uti petioli pedunculi et nervi adspersi stellulæ, aquilatæ.  
cassis. Solca alterna petiolata, palmata et ultra grossa  
ferrata, acuminata venosa. Petioli foliis breviores. Specie  
supra decomposita petio longior cassa. Flores conferti pauci

supra fabri acute ferrati specie supra  
decomposita petioli longioribus

Divaricata & foliis ovatis racemos compofitis d'varicata. L. s. V. pug.  
utilia racemosa major virginiana mitior f. minus arens Plath. alm.

393. t. 237. fig. 2

Habitat in Virginia Canada

non vidi

*Catifolia*  
*villoso* Utvix folis alterni cordato ovatis obtuse serratis pubes villoso  
supra pubnis <sup>di lobatis breviori</sup> paniculis axillaribus foliaceo cawle hebecos.

Habitat in Cambria Topeth subtus Duncali gen.

<sup>Brang.</sup> petiolis foliis villoso pubescentibus excepto foliis subtus pectora.

Tota planta villoso pubescentibus excepto foliis subtus pectora.

Folia materna ~~rebus generis~~ venosa ut ex quo se a

Petiole foliis breviori adwancata

~~Ex~~ ac uscico Canadensis <sup>a qua</sup> differ & foliis obtuse serratis cawle

petiolis pedunculatis que <sup>villoso</sup> paniculis petiolo brevioribus

Species dubia adwancata

villosa u foliis cordatis hirsutis, globulis flesplibus Thlas. fl. Jap. p. 70x

I.V. p. 851.

Habitat in Papuonia

Pauli herbariis Serri, vix spiculamque. Rami alterni duae  
nigrae patenspmi. Solea alterna brevissime petiolata  
cordata, obtusa, serrato-crenulata, hirta iniquitaria, angustia  
lana. Clorun globuli in rami sparsi, flesples, minuti. Thlas.

non vidi

nvea & foliis puberulis utrinque acutis, subtilis Vomentosis L.

Gaegu. Hort. vol. 2. t. 166.

Ramum major Rumph. Amb. pag. 214. Taf. 79. figt.

Habita & in Chine & India orientali

Pauli Seni ~~pellos~~ superne in a nus. folia petiolata alterna  
ovata, attenuata serrata, supra glabra, subtus neve trinervia  
venosa & quoad apollineana. Petiole <sup>dense pilosus</sup> lanceolate atque  
ruato unguiculatae, alterne <sup>gemmata</sup> axillaria opposita longitudine  
petrolonum. flore <sup>per se</sup> minuti glomerati.

ovatio acuminatis serratis subtus neve  
utrinque acutis

Rumph. s. t. 79 conser. figura Gaegu.

16-17 heterophylla Urtica foliis ovatis integris trilobisque serrato-dentatis, floribus axillariis  
pedunculatis  
Ana - Schorigenam Rheod. Mal. 2. pag. 77. Tab. 41.

7 Urtica palmata; foliis alternis, serratis, ovatis palmatos; spicis formicis  
nigridi, secundis, pennato ramosis Sorbi defr. pag. 159

7 Urtica urens racemi per major Plin. alio. pag. 393.

Pauli herbarium; simplex, paleatus, vellosus, hispidus; setis pubulatis, par-  
sis, albis, nitidis.

sola alternae, petiolatae, inferiora integra, superiora trifida, grossa <sup>ostuse</sup> serrata  
ultima serratura elongata, subvillosa; fructus pallidiora  
bipinnatis, secundum nervos setis nonnullis adpreso, bipinni-  
cana.

Petiolas setis hispidis, folio brevior

Oliver ait Oliver: Majus superne, spicatis. Femina spicis globosis. ominis  
inferne; racemis per ramoso dichotoma hispida.

Pratinus fructiferus, ramosa dichotoma ramosa; hispidus

reptans u

~~riparia & spicis magnulis pluribus trigonatis rugosantibus adutis, fuga  
misi anfracto acuminatis, capsulis subtriangularibus bicoloribus. Rustis fl.  
Lond.~~

Hort. Kew 3. p. 331

Habita in Anglia et Dania

Cappulacea & foliis ovatis Leabnū puli, pectoribus terminalibus subfusilibus  
monoicis, semi nibus trigonis, caule diffuso. Siv prodr. p. 37 act. Holm. 1707  
~~mag. 69 tab. 2. fig. 2.~~  
Urtica humilis Sw. in act. Holm. 1707 p. 34

Siv in act. Holm. 1711 p. 34 ~~tab. 2. fig. 2.~~

Glabrat in Jamaica, Domago superne villosa.  
Pauli repens divaricatus, ramos primis, glaber. Vers. Rami ramu  
ligei alterni, diffusi repentes, pubescentes. Folia minoria, bo*majora unguiculata*  
la flora, equaliter longa et lata, planum aluminata, alterna,  
petiolata, integerrima celesta, nervis superne scabruſula  
Petoli et foliola minima iniana, villosa. Flores minutissimi  
folia suprema & communiter connecta. foeminei et masculi met  
ti; bracteis minimis membranaceis intectis.

---

integerrimus

capitulo foliis cordatis inestibus fustis pubescentibus, fructis interrupitis  
Len. Suppl. p. 417. & I. V. p. 850.

Habitat in Cap. b. spri

Paulis erectis Teres, vix pubescens, iners. Solia alterna, cordata petiolata  
ferrata. Specie laterales duo fure 3. rachi obliqui, erecti. Flores  
ad puncta remota, nonnulli congesti Len.

27-28

muralis Urtica foliis alternis ovatis triangulariis pubescentibus serratis, capitulis axillaribus  
fusculibus.

Urtica parafidaia; foliis alternis, ovata acutis, serratis, molibus; capitulis  
axillaribus fusculibus. <sup>80</sup> off. defer. pag. 160.

Caerulea Teres, pubescens, superne canescens.

Folia petiolata, alterna, ovata, serrata, acuminata, molliter villoso  
profundim fimbriata superiora, triangularia, base acuminataque indegenerata  
<sup>aureo</sup> <sup>verpostr</sup> pollicaria sequi pollicaria.

Petiolae folio brevior, patens. Stipula utrinque lanceolata acuminata  
deorum glomerulii axillaribus, fusculibus, villosi, canescensibus.

Catellus. Taponaria Cal. Thunbergia distinguuntur foliis & qualiter serratis,  
loribus, glomerulii fusculibus.

Decora videtur

sternulans & foliis oblongis basin versus attenuatis integris, paniculis  
atticulatis leu. Suppl. p. 418. & S. V. p. 851

Habitat in Fava 3

arborescens summae foliis majoribus. folia magna alterna

non vidi.

festiflora L. foliis lanceolatis ovatis crenatis, racemis brevissimis atellan  
bus, floribus monorigo differtis; caule erecto sive act. Holm. 1795. p. 33  
prod: pag. 37.

Habitat in Jamaica

Petala pedalis basi rotundata, subdivisa, fractio scabriuscula.  
Rami alterni foliosi. Folia petiolata, inferne alternantia,  
superne ramulis si rarius aliis foliis opposita, acuminata, frons  
rei scabriuscula, crassa subrotunda. Hipula nulla. Petioli frusti  
glabri. Racemi manubi brevissimi, his cauli inglobati.  
Pediculi brevissimi masculi plerisque in axillis ramorum  
inferiorum vel in ipso caule feminei in ramis superiores.

lv

68

quelque nœuds 11

gemina Utricula foliis alterno glabris, involucro bifloro foliato Lour. - fl. Cook.  
pug. 550

Habitat in Cochinchina.

Caules herbacei pungentes, ramos, pedalis. Folia ovata-lanceolata erucata  
petiolata. Flores axillares gemini majoribus foemineis sub eodem in  
involucro foliaceo condito foliatis. ♂ Cal. 4 phyllis. ♀ Cal. 0. Corolla  
Cor. 0. Hacuna sp. Stigmata 3 villosa. Capsula locularis monosperma.

an acalypha

*foliata* L. folia lanceolata ~~folia~~<sup>lanceolata</sup> ferruti nervis capitu  
lis latitudibus septebris.

Habitat in Madagaskar?

Pauli an fructus rami virens.

*Folia petiolata* alterna pithamia lanceolata ferrata bapa vespa  
subrugosa nervis acutis ubique leviter elevatis albidis utrūcunq;  
venosa, nervis lateris altero convexa latera altero concava  
stiora fere recta. Petiolis <sup>nervis</sup> angusticollari canalis lateris  
capitula oppositifoliae terro Pimodio minore foliatae vellosae  
sinula

Tenera u. foliis obovatis ~~integerrimis~~ glabris, florum axillaribus glomeratis caulebus  
fimbriis <sup>fimbricis</sup> prouidentibus herbae <sup>est</sup>

Habitat in India occidentalē

Habitus prolixus <sup>fimbricis</sup> Caules filiformes glabrii digitatae vel granos ultra, pellucidi. Tectoria petiolata  
portula. Ra opposita basi aduta, seminigra ulana opposito minore. petiolas  
capillari congestae foliis. flore minute pmistellarii seplexi plures  
oculis armato peli aequaliter decumbentes folio terminali aor videntur

for Ne eadem cum

pulosa <sup>9</sup> foliis alterno pulosis lato lanceolatis, fructu adellantibus leuc.

fl. Cochinch. p. 550.

Habitat in Cochinchina.

Paulio herbatens sequi pedalis tenui pulosis erectis. folia serrata  
spicis simplicies foemineas ad bovi cal. 1 phyllo tuberculato 18 fido.  
Rigida laciniatum. Capitulo 3 loculis.

an Tragia vel acalypha non nro s

Utric a Verbose folio la March est utrue grand folio folio petiolati oppositi  
exempla transire habet lo March