

Valantia

Præcæta cappadocica glabra humifusa Tournef. Cor. 2 ad X flus /  
Valant. caules copiosissimi ramosi diffusi 2 ad 4 Inp

pedemontana Valantia foliis quadrifidis pedunculis <sup>sub</sup> unifloris apophyllis  
Galuen pedemontanum foliis quaternis ovalibus; radice annua, pedun-  
culis nudis brevibus paucifloris All. fl. Aust. pag. 2.

Valantia pedemontana Belladi: Observat. botan. pag. 61

Habitat pedemontici O

Caulis basi ramosus ramis confertis simplicibus, raris inferne raris  
uno vel altero, erectis tetragonis pilosus angulis scabri palmatis  
vel pithamow. folia oblonga vel unguiculata obtusa ~~marginata~~  
<sup>et margina</sup> <sup>costa</sup> <sup>pilosa</sup> ciliata avenia <sup>pilosa</sup> <sup>et unijera</sup> pedunculi quatuor pilosi folio quadrifido  
breviori fructiferi tetleri. 8 loci minuti flori

caulibus folisque oblongis pilosis

Valantia

Coniata orientalis glabra humifusa Tournefort. Cor. pag

Habitat in oriente herb. Desfont. 4

Caulis plures, simplicis vel subramosi, villosi, palmari. Folia quaternaria, oblonga villosa

Valantia

Quincata orientalis glabra humifusa Tournef. Cor. 4.

44. Habitat in oriente herb. mus.

Caulis plures, basi lignosi, palmares, villosi. Folia una oblonga

rubea

glabra ✓ floribus masculis glabra quadrifido, pedunculis dichotomis aphyllis,  
foliis ovalebus ciliatis. Lin. f. V.

Encrata glabra latifolium glabrum Bauh. prodr. 146.

Encrata glabra. Bauh. pin. 333.

Habitat in Austria, Italia &  
affinis Encrata.

mea palmari caulebus pluribus diffusis glabris. Folia oblonga <sup>simplicibus</sup> ~~truncata~~  
~~et~~ <sup>hinc</sup> unguiculata margine ciliata. Pedunculi folio brevior  
caule plures digitales et ultra, simplicis vel subramosi Rab. Mus.

glabris



hispida L. Floribus masculis trifidis germine hermaphroditi hispido in pediculis  
Tribus Lin. Spec. pl. pag. 1490+

Salicaria erecta hispida Hort. Cleff. 461+

Habitat in Europa australi O

Planta palmaris ramosis ramis diffusis tetragonis superne hispida  
folia quatuor <sup>reflexa</sup> oblonga obtusa integerrima margine et canina  
serrulata. Germen hispida. Fructus oblongus superne  
latior trifidus laciniis lateralibus linearibus intermediis oblongo  
dorso cili margine spinulosis spinulis setaceis ciliatis

hispida  
caulebus pilosis

filiiformis V. capsulis pedicello longioribus cylindraceis pilosis inermibus;  
foliis lanceolatis glabris subciliatis Hort. Kew. 3. pag. 420.  
Habitat in Canariis C

nudi ignoti



Cucullaria V. fructificationibus singulis bractea ovata deflexa obtectis Lin  
am. acad. 4. p. 295. 4

Cucullaria Burb. Cent. 1. p. 13. 7. 14. fig. 2.

Habitat in Cappadocia, Arabia montosis. C. chistena

Planta palmans. Caulis <sup>per bracteam</sup> tetragonus, erectus, ramosis ramis filiformibus  
lobatis. Folia quaterna linear-lanceolata <sup>per unum</sup> ~~per unum~~ <sup>in oppositis</sup> ~~in oppositis~~ ad  
flores vero opposita. Peduncul. <sup>ramis</sup> ~~ramis~~ <sup>multifloris</sup> ~~multifloris <sup>et per unum</sup> ~~et per unum~~ <sup>alij</sup> ~~alij~~  
supra fragulum <sup>bractea ovata</sup> ~~bractea ovata~~, membranacea colorata  
Sexillum floris papilionaceis referas, occultans semen et florem  
cum pedunculo nitat. Lin.~~

aparine V. *Flombus masculis trifidis pedicellatis hermaphroditici pedunculis in  
pedantibus. Hort. Ups. 3024 Spec. pl. pag. 12924*

*Aparine femine Leri Vaill. parif. 10. t. 4. fig. 3.*

*Galium saccharatum All. fl. ped.*

*Habitat inter Germanis, Europa australis et Barbano Jeyeter C*

*Caules sedes mei pithamoi diffusi procumbentes. Vetuson angulis  
fiatoni. Folio sessili quadrato <sup>linea</sup> lanceolata mucronate  
marginem serrulato scabro. Peduncululi triflori. Semina didyma globosa  
municata*

articulata V floribus masculis quadrifidis, pedunculis dichotomis aphyllis,  
foliis cordatis Lin. l. V. p. 9004 Hort. Ups. 3034

Articulata orientalis latifolia erecta, glabra Tournef. Cor. 4.

Habitat in Aegypto, Syria, Mauritania &

Caulis erectus, uti tota planta glaber, tetragonus vix ramosus nisi ad  
basin. Folia quadrifida, sessilia cordata linearia reflexa, pellucida  
superius versus sensim minoribus obtusa. Pedunculus inter singula folia  
dichotomus, flore unico hermaphrodito masculis vero magis pedunculis  
lati 4. 6. omnibus lateribus quadrifidis. Folia nulla in pedunculo. Matura  
planta folia omnia reflexa sunt, semina occultantia: articuli tum caulis  
discedunt et folia a vento pelluntur cum seminibus hinc

---

non basi subsiliante

caule glabro foliis superioribus reflexis

*Emicnata* V. floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. Lin. t. V

perg.

*Emicnata* Dod. pempt. 257.

*Emicnata hirsuta* Bauh. pin. 335.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia &

*Piperone horti*

Caulis plures tetragoni pilosi pedales laxis simplicibus. Folia quatuor na sessile  
oblonga <sup>ovata</sup> lanceolata, polluciana margine et carina ciliata, internodiis brevioribus.  
Pedunculi axillares oppositi gemini ramosi pedunculi pilosi

canaliculis ciliatis

multifloris

caule foliisque margine

muralis V. floribus masculis trifidis germini hermaphroditici glabro inflorescenti-  
bus. An. 1. V

Rubicola echinata faxatilis Baub. pin 334.

Encrinata muralis minima romana Ed. Ephr. 1. p. 290. t. 297. Morf.  
he 7. 3. p. 320. f. g. t. 21. fig. 2.

Salantia annua quadrifolia verticillata, floribus ex viridi pallidifloris  
fibus; fructu echinato Mich. gen. 13. t. 7.

Habitat in G. Narbonensi, Galia merid O

<sup>retrogoni. angulo lobis</sup>  
Caulis diffusus glabri filiformes. fructus corvi. folia quater na  
corvi femiunguiculata. Caulis 7. 12

caulis canaliculatus glabro