

pyrenaea 20 Valeriana foliis cordatis ^{superioribus} ^{que} inaequaliter dentatis, inferioribus
simplicibus, superioribus ternatis: omnibus petiolatis
~~Valeriana maxima, allianis foliis. Mon. bot. 3. p. 102.~~
Valeriana maxima, pyrenaea, lacialis folio Tournef. inst. 4
V. herb. 131. Plukin. alm. dot. 232. f. 1.

Habitat in Pyrenaeis 7

Caulis saepe ergo li, erectus, caespit ~~erectus~~, striatus, glaber,
inter petiolorum villos subtomentosus. Folia radicalia saepe
pedalia, caulina remota, venae acuta, glabra, venae ~~reticulatae~~
reticulatae: foliola ^{tri- et quatuor-} lateralia superiorum lanceolata.
Petioli villosi, lanescens. Pedunculi partiales approximati.
Dichotomi, villosi. Bractea pubulosa, glabra. Flores rubri,
minores quam in Val. triptere.

Valeriana pyre
naea; foliis
triandris, foliis
caulibus cordatis
^{perrotis}
dentatis petiola
tis: summi
ternatis Lin. Syst.

Veg. 81.

~~Salenana globiflora flombus triandris, folus pinnatis foliolis sinuato denta-
tis, bracteis pithulatis, capitulis globosis fl. Penns. 1. pag. 43. Tab 65
fig. 6.~~

~~Habitat in alpebus Penns
ad in subsessilibi 1. 3 pda~~

~~Pilosa. ~~Capitulis~~ herbaceis, plures, sempalmaris, teretes, striati. Eolia radi-
calia, petiolat, scapifer longitudine, pinnata: foliola sesplici
& cores sesplici in capitulo globoso, Bractea pithulata ^{sub} membranacea
distincti. Semen papposum fl. Penns.~~

allianifolia 29 Valeriana foliis cordatis attenuatis inaequaliter denta-
tis omnibus simplicibus superioribus sessilibus
Valeriana orientalis, allianifolia, flore albo Tournef. Cor. 6.
Buxb. art. 2. p. 19. t. 11.

Habitat in Cappadocia. Ex herbario Tournefortii

Tota glabra. Folia inferiora petiolata, palmata, venosa,
superiora sessilia, pollicaria. Flores corymbosi.

Salenaria decussata floribus triandris, foliis imparipinnatis: foliolis lanceola-
tis, intimis minimis, panicula decussata, pedunculis dichotomis fl. peris-
p. pag. 42. tab. 70 fig. 6.

Habitat in bene repibus et locis petrosi

~~Pubescens, inaequalis. Caulis herbaceus, subcondens, tripedalis teres, striatus,
cavus, center pubescens. Folia breviter petiolata: foliola remota dentata
lata, subtus tomentosa inaequalia, supra pubescentia, ciliis versus scabim
majora. Panicula maxima. Pedicelli dichotomi horizontales. Bractea
sub pagulis brevis, pedunculis et pedicellis, linearis. Corolla minima
alba. Semina pappo plumoso, 10-12 radiata fl. peris-~~

sumi panicula divaricata

Capathifolia 30 Valeriana foliis cordato-oratis subintegerrimis indivisis,
superioribus sessilibus.

Habitat ad fretum magellanicum. Com merson, Thoria 4
Pauis pedalis vel ultra, caespitibus pennis anserino, ~~caespitibus, 4;~~
tristis, glaber. Folia tripollicaria, sursum serbim minoro,
acutis acuta, integerrima, interdum obsolete se crenata, obscura
venosa, nervosa, nervi supra ad centem villosi, coctenim glabra
radicalia et inferiora petiolata, quatuor in caule, remota, duo
superiora sessilia: floralia infima linearia, obtusa, basi ciliata
ta. Corymbi ex axillis supremi oppositi, pauciflori; terminata
les multiflori, trichotomi. Flores triandri.

Valeria V floribus triandris dioecis, foliis pennatis integerrimis L. V
fl. Dan. t. 607.

♂ Valeriana alpina minor Bauh. prod. p. 87. per. 163.

Valeriana palestini minor Bauh. per. 164.

♀ Valeriana palestina inodora panem laciniata Bauh. per. 164.

Valeriana pratensis minor Moris. umb. 7-10. Die

Habitat in Europa et orientis campis uliginosis &

Caulis ^{met hamam} palustris vel ~~altus~~ ^{terre} glaber simplicissimus foliis
radicalia spatulata ovata ~~indurata~~ ^{quasi nana} ~~integerrima~~ ^{recte} glabra

caulina opposita ^{terminales majores} ~~scapula~~ pennatifida remota ^{interiores} ~~quatuor~~ ^{sempiternae} ~~minor~~

in laciniis inferiorum oblonga obtusissima superiorum

lanceolata obtusiuscula floralia lanceata integra. Compri
bi ex axillis supremis et apice caulis trichotomas.

floris ^{longe} foeminae ~~maiores~~ ^{longe} ~~quam~~ ^{maiores}

foliis pennatis f. d. y

♀ Valeriana
montana palestina
Ramar.

(Phe mai min Math. 41

Valeriana: quo ^{Thuron} Triop 62. ♀ Valeriana 4. omnium impatis & ma
Trog

carnosa 31 Valeriana foliis ovalibus dentatis carnosis ^{glabris} Smith pl.
ined. 3. p. 52. t. 52.

Valeriana magellanica; foliis spatulatis dentatis, caulibus
simplicibus, pedunculis oppositis bifidis, fructu prismati-
co. Lamarck. illustr. 1. p. 93.

Habitat ad fretum Magellanicum. Commerson, Thourin &

Caudex ascendens radicis crassitie penno asserino, articu-
latus, vaginis membranaceis vestitus. Caulis plures, semipe-

subcarnosa,
cytoberrima

dales; varietas glabri. Solia # radice petiolata, pollicaria
inqualiter dentato-subsinuata, basi attenuata: caulina
trium- parium, remota, vix unguicularia, sessilia, basi con-
nata, oblonga, dentata. Petiolus folio duplo longior. Corymbi
subracemosi, dichotomi.

Valeriana interrupta floribus triandris, foliis pennatifido laciniatis interruptis
vis: laciniis dentifolioribus, corymbis involucentis fl. Peruv. 1. pag 42
tab. 67. fig. a.

Habitat in alpebus Peruvianis ?

Succosa glabra. Radix crassa, bifida. Folia radicalia pennatifido laciniata (Sicronero laciniata haud ^{des} affinis) laciniis interruptis, dentifolioribus. Flores corymbosi involucenti. Involucentium diphyllum foliolis pennatifidis. Flores in capitulo sessiles. Bractea linearis ad faucem.
Corolla alba, quinquefida fl. Peruv.

foliis interrupte pennatifidis pinnis longioribus subpennatifidis

foliis in caule nulla nisi sub floribus.

tuberosa. 32 Valeriana foliis obtusis integerrimis: radicis albae lanceolato-oblongae ~~in~~ indivisis: caulibus pinnatifidis laciniis linearibus
Nardus montana Matth. B.S.

~~et~~ Nardus montana radice olivari Bauh. pin. 165.

β. Nardus montana, longius radicata Cam. epit. 16.

Nardus montana radice oblonga Bauh. pin. 165.

Valeriana tuberosa; floribus triandris, foliis radicalibus lanceolatis integerrimis, reliquis pinnatifidis
Lin. Syst. Veg. Pl.
Habitat in Galloprovincia, Sicilia, Dalmatia & Calabria. Radix crassitie digiti. Caulis palmatis, ~~per~~ foliis radicalibus petiolatis, pollicariis, crassiuscula, puberula: caulina plerumque duum parium, bipollicaria, basi connata: laciniis integerrimis: floralia longitudine corymbi. Corymbi terminata densus, hemisphaericus.

Valeriana An Valeriana bulbosa Imper. hist. nat. 863
huius pertinet: foliis vero latiora et ovata vel cordata secundum figuram.
Similam medum com muricant cel. Ramondia Pyrenaeis diversa

radice apice divisa in ramos tres - quatuor, & reliquis petiolorum & grammoso,
est & specie diversa.

Spica 33 Valeriana foliis radicalibus cordatis, caulinis oblongis

Valeriana jatamansi; flores triandri; folia integra, duum parium,
radicalia petiolata, cordata, reliqua sublancoolata, semina papposa

Fohn in Act. bengh. 4. p. 433. 2. p. 405. 4. p. 433 cum figura

Radix descendens, subramosa, superna satis tereta. Caulis hex-
decim pollicaris, basi persistens fibrisque involutus. ^{globis} folia ^{duo} radicalia
in fema ebb cordato-oblonga, pendulata, acuta; caulina sess lumbis

Dichotomus

Ex mente Fohn est antiqua spica mardus antiquorum

Spica
fol. ^{infer} rad. petiol. caul. sess. oblonga

an. Hatai *S. umbellata* ^{linearis} *composita* specio oblongis squamis dichotomis *sepalibus* squa-
mis pubulatis, involucrio brevissimo longitudine umbellae

Habitat in America meridionali

Facies S. dichotomi. Culmi plures erecti filiformes triquetri apiculati
nalmares vel pithamoi glauci virentes. Umbella terminalis
composita cincta. Pedicellae radiatae radii plurimi divisi
les qui pallicares reliqui unguiculares monostachyi pedicelli
simplicissimi 3-6. Monostachyi raris distachyi spicula
alt. era fossilis. Involucrium petaleum 4-5 phyllum foliolo
unico longitudine umbellae reliqui ut unguiculares
folia petalea brevissima basi vaginantis vaginis supero
fermyneis. Squama concava ovata in aristas attenuata angusta

elongata 34 Valeriana foliis radicalibus ovatis: caulinis cordatis sessilibus
inciso subhastatis Lin. spec. pl. 1664. Paigu. Austr. 3. t. 269. t.
Nardo celtico similis alia, sive Valeriana alpina minor Lin. am. t. p. 214. Offic.
Valeriana flor elongata; floribus triandris, foliis dentatis subova-
tis: summi basi hastato incis, panicula elongata Paigu. Vind.
205. t. 1.

Habitat in alpebus S. Caraberg, Austriae inferioris 4

Caulis erectus, spithameus. Folia radicalia longius petiolata, in-
tegermina, raro subdentata, obtusa, crassiuscula, nitida: caulina
oppositionibus duabus tribus, amplexicaulia, profunde dentata vel
incisa. Racemi terminales, erecti, longi: pedunculi, pariter opposi-
ti, dichotomi, breviusculi. Bracteae lineares Lin. t. c.

Supina 35 Valeriana foliis simplicibus integerrimis ciliatis: radicalibus
obovatis: caulinis lanceolatis

Valeriana alpina, foliis integris, radice repente in odora Rai. hist.
1. p. 309.

Valeriana montana minor Italia, foliis integris, radice repente
Barr. ii. p. 68.

Valeriana supina, ~~foliis~~ floribus tetrandris, caule repente
foliis radicalibus cuneiformibus, emarginatis, ciliatis And.
Spec. 2. p. 13. t. 3.

Valeriana supina; floribus tetrandris, involucri hexaphyl-
lo trifloro, foliis integris Lin. Mant. 27. Wulf. in Jacq. misc. Col.
2. p. 114. t. 17. f. 2.

Habitat in Alpibus Carinthia 7

Radix crassitie pennae asperna, nuda, repens, nuda, superior
Duisa. Caulis pollicares, ~~erectus~~, junioribus tenuiter
villosus. Folia radicalia in rosulam expansa, petiolatis

3 4
Eurasia compungitur a Wild. minus forte rufa, ut minus inermis

craspius & dula, avenia: caulina sessilia. Peduncululi ex axillis ultimis, oppositi
positi aetudine caulis, et ex apice, triflori. Bractea duo ad basin singuli
floris, ciliata. Corolla rubella. Stamina ^{per unquam} inter duo tria, interdum quatuor.
Semen striatum. Pappus plumosus. Nullus l. c.

Saxatilis 36 Valeriana foliis indivisis: radicalibus ellipticis trinerviis in-
tegemimis subdentatisque: caulinis linearibus, compositis ramosis
Valeriana Sylvestris alpina II. Saxatilis. Clus. hist. 2. p. 56.

Nardo celtica similis Bauh. pin. 84. p. 165.
Valeriana minima, nardo folia Bauh. bot. 3. p. 206.
Valeriana alpina nardo celtica similis in odora Pluken.
alm. 380. t. 232. f. 2.

Valeriana saxatilis; floribus triandris, foliis subdentatis, in-
tegemimis radicalibus ovatis; caulinis linearibus lanceola-
tis Lin. Syst. veg. 81. Jacq. Vind. 204. Fl. austr. 3. t. 268.

Habitat in alpebus Stiriae, Austriae, Badii, montalbanis Italiae

4

Radix superne ramentis albidis vestita. Caulis filiformis, spitha-
micos, erectus, glaber. Folia radicalia petiolata, pollicaria, obtusa, ore
lentis margine serrata: caulina duo in medio caulis integerrima, obtusa,
floribus in composito composito. Pedunculi fliferi pariter approximati:
fructiferi remoti, bini dichotomi, cum flore perfoliati in dichotomia. Bractea pedu-
culi brevioribus brevioribus.

Flora Dicini Faig. l. c.

Salicornia 37 Valeriana foliis linearibus - cuneiformibus integerrimis tridentatis, floribus umbellatis subsessilibus.

Salicornia Neapolitana Dalech. g. 2.

Nardus et Apulia Bauh. pin. 165.

Valeriana Salicornia All. fl. ped. n. g. t. 70. f. 1.

Habitat in alpidibus Italiae

Planta cespitosa. Radix multiceps. Caulis erectus, digitatus.

vel parum ultra. Folia radicalia in rosetam expansa, pollicaria,

integro, crassiuscula, glaberrima. Caulis

quum parum, remotissima, linearis, integerrima, vel

interdum tridentata. Flores in apice congesti. Pappus plu-

mosus. ~~Ramus~~

Stamina tria. Semina striata. Olor fortissimus All.

l. c.

Salicornia *Valeriana* foliis linearibus - cuneiformibus.

Valeriana salicornia Dalech. 982. All. fl. ped. n. g. t.
70. f. 1.

Celtica 30 Valeriana. foliis indivisis integerrimis: radicalibus cuneato-ob-
longis: caulinis linearibus, floribus racemosis

Nardus celtica, seu alpina Clus. pan. 514. Bauh. hist. 3. p. 205.
Monn. 3. p. 7. t. 15. f. 25.

Nardus celtica altera Bauh. pin. 166.

Nardus celtica; floribus triandris, foliis ovato-oblongis ob-
tusis integerrimis Lin. Syst. Veg. 86. Jacq. collect. 1. p. 24. t. 1.

Valeriana foliis integerrimis, radicalibus ovatis, caulinis li-
nearibus obtusis Hall. n. 209. fide specimenis ab ipso determi-
nato.

Habitat in Alpibus Helvetiae, Valis, Austriae &
Praxi Planta dig. 1. glabra. Radix multiceps, squamis fuscis
tecta. Folia ^{sempiternis} rasse ovata oblonga, basi attenuata, crassiuscula.
caulibus duos. Pediculi pariter oppositi, inferiores tri-
flori, supremi uniflori.

Flores divici Hall.

37
~~adde Syn. Jacq. et quorundam quod nardus~~

vite

Spathulata 29 Valiniana foliis spathulato-oblongis pubescentibus, floribus terminatis sessilibus involucriis, corollis trifidis +

Valeriana spathulata; floribus triandris, foliis spathulatis pubescentibusque obtusis, corollis trifidis, umbella sessili involucriata.
Fl. per. 1. p. 40. t. 68. f. 6.

Habitat in alpinis Peruvia. 2

Cespitosa. Radix ramosa. Caulis sub palmans, ancapo, inferne foliis numerosis vertus. Folia radicalia confertissima, superiora sparsa, erecto-patentia, integerrima, ope lentis ciliata; pubescentia. Flores sessiles, involucriati. In involucrio ^{un} monophylla ^{un} quadri-sex ^{un} flori; laciniis linearibus, acutis. Calyx marginatus. Corolla limbus trifidus. Semina margine coronata fl. per. l. c.

Compositis

Connata 40 Valeriana foliis lanceolatis connatis integerrimis, floribus var-

^{rare, rariis, com. natis.}
~~Vicillata~~ ^{ibus} ~~apicatis~~, caule suffruticoso procumbenti basi

Valeriana connata; floribus triandris, foliis lanceolatis con-

natis integerrimis, spicis verticillatis. Fl. per. 1. p. 39. t. 67. f. a.

Habitat in locis frigidis Peru.
Habitus Polygoni persicaris. Caulis plures, ramosis simi, cortice
cinereo: Rami assurgentes, virgati, articulati, fere vaginati,
cavi, teneri, bifariam alternatim pubescentes, hirsus obscura
hirsuti, striati. Folia basi attenuata et ciliata, coetanea gla-

bra. Pedunculus elongatus: partiales oppositi, trifidi: ^{partiales} ~~bracte-~~
solidum utrinque basi connatum. Bractea lanceolata, obtusa. Calyx
marginalis. Stigma emarginatum. Pappus pilosus. Fl. per. l. c.

Valeriana
foliis lanceolatis
connatis
integerrimis
floribus
triandris
connatis
integerrimis
spicis
verticillatis.
Fl. per. 1. p. 39.
t. 67. f. a.
Habitat in locis
frigidis Peru.

Valeriana virgata floribus triandris, foliis pinnatis: foliolis bis. trifidis
laciniis linearibus, panicula subsymboea fl. Peruv. 1. pag. 42. tab
66. fig. 6.

Habitat in Provincia ^{Peruv} Canto promptis
glabra, Habitat Tagetis minuta. Caulis suffruticosus, tripedalis, ra-
mosissimus, tetragonus, striatus, parum ceras. obsolete pubescens
rami virgati, erecti. Folia opposita, impari pinnata. foliola
minuta, nonnulla integra, bifidaque, paucorum yfida: laciniis linearibus
integerrimis emarginatisque, supra nitida. ~~Panicula~~
~~bracteata~~ Pedicelli superiores dichotomi. Bractea opposita, linearis. Flo-
res ex dichotomia fertiles. Semen propressum, ovato oblongum, com-
pressum marginale, hinc striatum, inde dorso elevato fl. Peruv
foliola pubescentia

ramiculis dichotomis

Salicaria foliis Valeriana foliis cordatis lanceolatis integerrimis sessilibus,
racemis terminalibus decompositis

Habitat in Bonaria Commerson. Ex herbario Turbici.

Caulis, uti tota planta glaber, inferne radicans, sesquipedalis,
simpliciter bimus, striatus. Folia tri-quadrijugularia, basi subordi-
nata inferiora basi versus attenuata, superiora basi subordata, arenaria,
anervia.

penuriana Valeniana

Habitat in Pene herb ^{alpinis} No. 24

Folia radicalia copiosissima in roseta expansa, sesquipollicaria, lanceolata, rigida
super nitida, secundum costam lineam excavata, glaberrima arena, enervi, unta
gerima, Caulis nulli vel brevissimi inter folia versus centrum.

Valeniana rigida acaulis, floribus 3 andris, foliis linearibus lanceolatis coriaceis
mutis coronatis, corollis trifidis. Fl. Penev. 1. pag. 39 Tab. 65. fig. c.

Radix fusiformis, folia mucronata inferne ciliata, utraque obsolete punctata,
marginibus cartilagineis. Scapi brevissimi, compressi subaeque pures, albi, basi
attenuati, involucriati. Involucrum univocalia 1 phylla, bifida vaginantis
partibus simplicia. Flores sesiplex fruguli utraque involucria ^{etiam} proprium. Calyx
margo menepnus. Stigma bifidum. Semina nuda

pilosa 42. Valeriana pilosa, foliis lanceolatis integerrimis margine revolutis;
corymbis racemosis t.

Valeriana pilosa; floribus triandris, foliis linearibus lanceolatis
integerrimis margine revolutis Del. per. l. p. 39. t. 66. f. a
Habitat in locis frigidis? Penn.

B. 17.

Racis Plantaginis albicantis. Radix ramosa. Caulis solitari-
us, interdum duo vel tres, erectus, pedalis, striatus, versus me-
dium foliis duobus linearibus. Folia radicalia numerosissima,
Bisquialmiana, inaequalia, erecta; margine revoluta; floralia tri-
neura. Corymbi superne, oppositi: pedicelli tres quinque. Flo-
res in capitulo sessilibus. Bracteae obovatae, inter flores. Calyx
marginalis. Stigma emarginatum. Semina pappo piloso coro-
nata. Del. per. l. c.

^(radicalis)
Valeriana coarctata floribus triandris foliis lanceolato spatulatis margine
denticulatis ciliatis, spica conica coarctata fl. Penus. 1. pag 40 tab. 68.
fig. a

Habitata in locis altis frigidis Penus.

Radix fusiformis, inferne divisa. Caulis herbaceus fere pedalis, erectus striatus
inferne nudus, superne foliosus, pubescens, viliis deciduis. Folia radicalia
imbricata, bipalmata, canaliculata, ex his purpurascens: floralia ter
na, 4na lanceolata, omnia denticulata ciliata, utrinque glabra. Spica
terminali. Flores verticillati in capitula congesta, sessiles. Bractea brevis
cuneiformis. Verticillus inferior remotus. Semina oblonga squamis 5que
coronata fl. Penus.

Folia radicalia lanceolata caulis fere aphyllus nisi superne sub floribus

Coarctata 43 Valeriana foliis cuneato-lanceolatis denticulatis ciliatis,
floribus verticillato-spicatis +

Valeriana coarctata; floribus triandris, foliis lanceolato-
spathulatis margine denticulatis ciliatis, spica conica
coarctata. & l. per. 1. p. 40. t. 68. f. a.

Habitat in locis albis frigidis Peru.

Radix fusiformis, inferne divisa. Caulis ~~herbaceus~~, pro-
pedalis, ~~erectus~~, striatus, inferne nudus, superne folio-
sus, pubescens villis deciduis. Folia radicalia imbricata,
bipalmata, basin versus attenuata, canaliculata, estus
purpurascens: floralia ^{od} ternaria ^{et} quaternaria, lanceolata,
ut infra radicalia denticulata, ciliata, utrinque glabra.
Flores sessiles in verticillis; verticillus infimus distans, reliqui
contigui. Bractea brevis, cuneiformis. Semina oblonga,
squamis quinque coronata. & l. per. 6. c.

~~Valeriana pennatifida floribus mandis corymbosis, foliis inferioribus lanceolatis
integerrimis, reliquis pennatifidis laciniatis, panicula brachiata fl. Peruv. 1
pag. 40. tab. 69. fig. 6.~~

~~Habitat in collibus albis Lima~~

~~Baccosa. Radix tuberosa longa. Caulis herbaceus, erectus simplicis foris, striatus
canis inferne apiculatus. Folia radicalia longa petiolata: duo inferiora lan-
ceolata, integerrima caulina sessilia, basi amplexicaulia: la. cuneo serrata
dentata. Panicula elongata. Pedicelli dichotomi, bractea lineari sub pedun-
culis et pedicellis. Flores sessiles. Semen pappo coronatum fl. Peruv.~~

Serrata 44 Valeriana foliis cuneato-lanceolatis extrorsum serratis, floribus
verticillatis & spicatis. ^{semitridentis}

Valeriana serrata; foliis lanceolato-spathulatis, superne serratis,
spicis verticillatis. Fl. per. l. p. 40 t. 60. f. c.

Habitat in locis frigidis Pennsylv.

Respitosa, glabra. Radix crassa. Caules plures, teretes & striati,
puberuli; intermediis longioribus, sub floribus semipedalis, sub
flora foliosus. Folia radicalia copiosa: floralia apice serrata.

Spica terminalis, sesquipalmaris. Flores sessiles in verticillis
verticilli multifloris, inferiores distantes, superiores approxi-
matas. ^{br.} ^{bus} Bractea inter flores cuneiformes, membranacea. Semen
oblongum, squamis quinque coronatum Fl. per. l. c.

Mania

rigida 45 Valeriana acaulis foliis lanceolatis aggregatis imbricatis ex-
pansis sensim accrescentibus deoressentibus.

Valeriana rigida; acaulis, floribus triandris, foliis linearibus longioribus
latis, coriaceis, mucronatis, corollis trifidis. Fl. per. 1 p. 39. 7-65.

f. c.

Habitat in alpebus Penins. Ex herbario Russici 4

Stigma bifidum. Folia radicalia, copiosa bina, in usam expansa, imbricata, sesqui-
pollicaria, intus versus sensim minora, sic integerrima, mar-
gine ciliolata, basin versus ciliata, in acuminem subpur-
gente desinentia, coriacea, rigida, aevania, anervia, supra nitida,
utrinque a. oculo armata punctata. Scapi brevissimi vel
nulli, in centro foliorum.

Radix fusiformis. Scapi breves, compressi, subarcuati, albi,
base attenuati, & lora involucenti: involucrio uniseriali, uti
partiali monophyllo, bifido, vaginanti. Calyx & maris minimus 4

Valeriana serrata foliis lanceolatis - pinnatifidis, superiore serratis, pinnis viti-
cillatis

Habitat in locis frigidis Peruvia &

Radix caespitosa glabra. Radix crassa. ^{sub floribus foliis} Caules plures, teretes, striati, inferne
nudi, intermedium longior semper alii. Folia radicalia copiosa lanceo-
lato cuneiformia ex trunco serrata, floralia opposita apice serrata.
Spica terminalis sesquipalmari. Flores sessiles verticillati verticil-
li multiflori inferiores distantes superiores approximati. Bractea cune-
iformis membranacea inter flores. Semen oblongum squamis sex
coronatum fl. Peruvia

~~foliis foliis lanceolatis. un.~~

tenuifolia 46

Valeriana acaulis, foliis linearibus subulatis aggregatis ^{umbri-}
^{ca} ~~ti~~ expansis, extimis longissimis +
Valeriana tenuifolia; acaulis floribus triandris, foliis linearibus
subulatis gracilibus, corollis trifidis. Fl. per. t. p. 39. t. 68.
f. 9.

Habitat in alpidibus Peninsule

Radix fusiformis. Folia radicalia, numerosa, in stellam ex-
pansa, inaequalia, sessilia, basi dilatata, membranacea, infer-
ne ciliata, & integerrima, apice rigidiusculo, aerea, gla-
bra, nitida. Scapi, flores, stigma et semina ut in precedente
Fl. per. l. c.

Differt a precedente: foliis angustioribus, praesertim extimis lon-
gissimis, intimis multo brevioribus.

Haec est ^{habitu} praece- dentibus diversissimae

~~Valeriana spathulata floribus trandis foliis spathulatis sublineariibusque
obtusis, corollis trifidis, umbella sessili involuata fl. Peruv. 1. pag. 40. tab
68. fig. 6.~~

~~Habitat in alpebus Peruano. 7~~

~~Res. pitop. Radix ramosa. Caulis prolixis, subpalmaris, anceps, inferne
foliis numerosis teretibus. Folia erecto patentia, integerrima, pubescentia, ra
dicalia confertissima, ^{opra latis uliatis} superiora sparsa. Flores umbellati, sessiles, involu
crati. Involucra spithula, 4. 6 flora: laciniis lineariibus, acutis. Calyx
maris minimus. Corolla lobis trifidis. Semina neque coronata fl.
Peruv~~