

Sandellia

1. Diffusa V. foliis <sup>oblongis</sup> ~~ovatis~~ serratis subsopibus
2. petiolata V. foliis oppositis cordato-ovatis imatis petiolatis
3. brachysta V.

Vandellia pratensis, foliis petiolatis oblongis acutis crenatis

Basourinha, sive Tupicava Piso hist. nat. Bras. pag. 110

Matourea pratensis Aubl. fl. Guian. pag. 642. Tab. 259.

Habitat ab insula Trinitatis ad Brasiliam usque, frequentissima ad vias. Q. von Rohr. C.

Caulis herbaceus, erectus, tetragonus, angulis acutis, brachiatus. Rami  
structura caulis.

Folia opposita, petiolata, unguiculata, oblonga, utraque acuta, uti  
caulis ad lentem villosiuscula, viridi-canescentia, margine parum  
reflexa, inferiora crenata, suprema saepe ~~et~~ integerrima.

Petiolus brevissimus.

Flores axillares, sessiles, parvi

(Sequentia mecum communicavit von Rohr)

Bracteo tres ad basin calycis, sessiles, persistentes: duo laterales, subo  
vundo, uno latera productivis, suberecta, aequales, pagina inferior  
concava; tertia superior, reliquis duplo major, plana, corolla adpressis

Calyx monophyllus, profunde quadrifidus: lacinis linearibus, acutis ciliatis,  
duo bractea majori opposita, reliquis latiores.

Corolla monopetalala, ringens: Tubus cylindricus, longitudine calycis. Labium  
superius ad palatum depressum, dein ascendens hians, emarginatum,  
crenulatum, venosum: inferius majus, trifidum, lacinia intermedia  
angustiore; palato convexo, faucem ostendens.

Stamina - filamenta quatuor, intra faucem corollae, quorum duo exteriora  
minima, duo interiora majora, filiformia, superne incurva, desinen-  
tia in duo corpora pellucida, coherentia, antheras mentientia, cum  
quibus arcum formant. Anthera <sup>duo</sup> <sup>es</sup> <sup>dictis</sup> corporibus inferae  
adhaerens, unilocularis.

Pistillum. Germe ovatum. Stylus filiformis, <sup>persistentis.</sup> staminibus paulo brevior,

Stigma semiobovatum, versus antheras oblique ascendens.

Pericarpium. Capsula bifida ovata, unilocularis, <sup>stylis persistentibus</sup> bivalvis: valvulis ab  
apice ad basin dehiscens, singulis iterum externe semibifi-  
dis

Semina plurima, minima, subglobosa; receptaculo proprio, quadrangulo  
pyramidalis affixa

Litr. N.  
pag. 49.

*Vanille*

De corpusculis quibus anthera adherent nil habet Aubletius nec in descriptione  
nec in figura, differt praeterea Aubletii quod *Rhynchospora bifida*, at eam esse  
una eademque planta eo certius asserere possum. Cum in omnibus con-  
venit planta Prohri cum specimine ab ipso Aubletio lectam.

Planta haec sub nomine *pe m'en fou* in *Bayon. Memoires de Laperone Tom*  
*1. pag. 104 et sequi* occurrit. Adstringens validum. Aubletius ad repri-  
mendum et adstringendum effectus *Siphilitidis*, hinc nomen supra  
dictum dederunt incolae, quam vis morbum minime curat. *Von Rohr*



Vandellia

<sup>2</sup>  
diffusa Vandellia, foliis subtotundis subsessilibus

Vandellia diffusa Lin S.V.

In montibus & insula St. Crucis legit Ayan-

Caulis herbaceus, ramosus, tetragonus, fistulosus, pubescens.

Folia breviter petiolata, opposita, vix unguiculata, <sup>supra</sup>subrotunda, <sup>glabra</sup> glabra  
juniora subtus pilis rariis, serrata, avenia, enervia.

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, alterni, breves.

Calyx quadrifidus.

*Polypodium frondibus bipinnatis pinnis serratis rachide squamoso*

270

no 36

non forte

addit ad Pl. m. sel: tab. 10 at ~~caudex~~  
caudex non aculeatus

*Diffusa Vandellia* Lin. Meas. 89. l. v. p. 573

Habitat in Ins. St. Thomae

Habitus ser. arvensis. Caulis tetragonus ramosus repens glaber uti  
tota planta, rami oppositi. Folia opposita, subsessilia, ovata  
serrata nervosa a venis superioribus acuta angustiusculana.  
~~Peduncululi axillares foliis oppositi, foliis duplo longioribus~~

*Diffusa* v. foliis ovatis serratis subsessilibus

reticulata vix diffusa



perfoliata Vandellia  
~~retandrum~~

foliis oppositi cordato ovati serratis, pedunculi axillaribus uniflori Guss. prodr. pag 43. n. 235.

Habitat in Tahiti

Caulis herbaceus ramulosus diffusus tetragonus glaber rami oppositi ramulosi. Folia breviter petiolata, seminaquidularia avenia nervosa. Calycis pedunculi folio longiori uniflori Calycis foliola squaria longitudine capsula anfrata

Hot. Mal. y. V. 50.

an Burman. Capriana uniflora huius pertinet  
vix huius generis flos, an spec. villosa deest capsula diversa  
habitu gratula an Vandellia

*Vandellia? v. cellata - Atheranthus indicus Koenig*