

Vangueria

12 July

Vangueria Jusf: gen: Vavanya Rohrii

Character essentialis

Barba 4 spermata. Corolla tubus globosus, fauce pilosus. Stigma bila
mellatum.

edulis Vangueria Act. Soc. bot. Nat. Hafn. Tom. 2. p. 1. pag. 208. Tab. 7.

Vavanya chinensis von Rohr ib pag. 207.

Habitat in China an? colitur in hortis Botan.: Jusf. St. Emili de V.
Rohr.

Arbor ramis teretibus, glabris

Folia petiolata, opposita, ovata, attenuata, utrinque glabra, inter
gemma.

Stipula interpetiolares, connata, acuminata.

Pedunculi axillares, ter vel quater dichotome ramosi. Flores
pedicellati.

Fructus edulis

Prope Cheocoleam collocanda.

(ultimus descriptio generis generis uberior tradidit de von Rohr
Loco citato, speciei ego

edulis Varanga Tab. 7.

Tangueria Turf: gen. pl. pag. 206.

Num Chinam uti patriam agnoscat, ut suadet nomen triviale Qui von
Robr, vel madagascariam ut statueret Cicut secundum Dr. Fuspeu
michi caret, ideoque nomen triviale mutari.

Arbor ramis terribus glabris, cortice cinerasciente.

Folia petiolata, opposita, bif. 4 polliciana, ovata, attenuata, basi
acuta, membranacea, glabra nervosa, venosa, utrinque
glabra, integerrima, subtus pallidiora.

Stipula connata interpetiolari, acuminata, persistens.

Pedunculi axillares solitarii foliis breviores, ter vel quater dichotomi
ramosique pubescentes. Storvi pedicellati, alterni.

Bacca corticosa, globosa, magnitudine pneni. Cortex durus.

Caro in fructu reducta, fragosa, griseo purpureoque variegata. Recepta
culum nullum, ^{subtiliter} circa ossem posita undeque cum carne bacca
connata.

Semina quatuor, oblonga, figura fere loba, ^{inferne} compressiuscula,
topo acutiora, ^{superne} convexiora. Ategumentum duplex: cortex

Constituendum ossem flavum, durum, glabrum: interius membrana cum purpura

Litr. C. p.
209.

Bivalvata salvia 18a

antheris incompletis, submembranaceis lanceolato-falcatis bivalvatis:
valvulis membranaceis, lanceolato-falcatis, unica a singulo latere
femina, umbilico infixo. Albumen ^{scapus?} nullum femini ^{inf. me. al. quod} informe, albicans
farinaceum, bilamellatum, in ^{inf. me. al. quod} tur ampla cavitate, ^{scapus?} basi truncatum
embryone breviter tenerius, embryone breviter

Embryo didyldonum perfectus, didyldonum, Cotyledones lenes
oblongae, contiguae, adumbentes, rectae, medio ^{in terra}. Radicula oblon-
ga-subrotunda, directa, ~~superior~~, cotyledonibus triplo brevior, lutea
Tubercula parum angustior.

Cum nomen Vavanga vel Vangueria barbari vel si maris aliquid exteri habet
et tantum, uti plurima alia ejusdem indolis nomina, a Fuscis cooptatum
usque dum meliora imponuntur, optarem ^{ut} nomen in Wilmannia commuta-
retur in honorem ^{ablativus} Dni. Gulgentii Wilmanni in Lyceo Mediolanensi profusore
Botanico longe meritisimo & auctore Summae plantarum edita 1789.

Vavangam horrii & Vangueriam, cui Dnus. Jussieu attribuit
baccam i-locularem, i-fermam, albumen eandem esse
plantam ceteris scio, qui Vangueriam ab ipso Dno Jussieu
dono accipit.