

Vepois

Massa fœca subsque locutalis. Stigma sæsile truncatum

enervis. Vepnis enervis, foliis ternatis, foliolis lanceolatis acuminate

Habitat in Madagascar Fusca

Rami teretes cortice cinereo nigro, superne fusci

Folia pedicelata, alterna, ternata: foliolis lanceolatis, glaberrimis, utraque attenuatis
venosis, venis parum elevatis, nitidis, rigidis, ses utraque attenuatis, sessilibus, undulatis
lateralibus brevioribus bipollicantibus

Panicula terminalis diffusa, pedunculis pa alternis pedicellis suboppositis ^{sub} trifloris
floribus pedicellatis

Calyx nullus nisi ullus dentes quatuor minuti firmis

Corolla tetrapetala: Petalis oblongis deciduis

diaco

germen globosum; stigma sessile

angusti folia Toddalia

Habitat herb. La Martin

Inermis. Rami superne pubescentes. Folia alternas petiolata, ternata. Foliola subpetiolata, sesqui pollicaria, lanceolata, est breviter crenata, glabra, supra nitida. Subtus venosa, punctato perforata, obtusa. Petioli villosi, pollicares. Racemi axillares, simplices, brevissimi, villosi.

Cucurbita Toddalia

Habitat herb. La Martini

- Rami teretes, glabri: aculei sparsi, parvi, recurvi. Folia petiolata, alternata, venata: foliola sesipila, semipolliciana, subobovata, acuminata, obtusa, emarginata, venis sine venis, supra nitida. Petiolus submarginatus. Pedunculi axillares, petiolo brevior. Pedicelli pauci, ramosi, multiflori. Flores subsessile

paniculata *Podalia*

Habitat in

rebus la maris

glabra, inermis. Paniculae teretes, folia petiolata, ad comam, ternata: foliola sesquialtera
laevicollata oblonga, basi obliqua, costis venis, tenuissimis venosa, multinerviata
basi attenuata, subtus utroque armata paniculata. Panicula terminalis,
flores glabri.
an *Boeckia Thunbergii*?

cuneifolia Vepno subaculeata, foliis obovatis crenatis

Habitat in Madagascari Comerson herb. Guss. 3. Rami flexuosi.

Tota glabra. Aculei minimi. Sola ternata. Foliola pollicana, obtusissima, emarginata, extrorsum crenata, basi acuta. Rami flexuosi Racemi axillares, simpliciter, foliis breviores, pauciflori.

^{aculeata}
Cineas Vepris spinosa, folis ternatis lineari-bus-

Habitat herb. Tusc.

Aculei parvi, recurvi, remoti, sparsi. Folia petiolata. Soleola sessilis, pollicum
vel parum ultra, angusta, attenuata, glaberrima, integerrima, subtus palli-
diora, punctata. Flores non decant

inermis V. inermis, racemis terminalibus decompositis, floribus octandris

Habitat in Madagascar.

inferne cortice cinereo

Facies antecardium. Rami teretes glabri. Folia petiolata grossa
ternata. Foliola sessilia, bipollicaria, aequalia canaliculata utraque
attenuata, nervo medio venosa puncta glabra, pubes
degeneranti supra nitida et fere. Racemus terminalis decompositus
natus pedicellis 3-4. umbellati

forte
ad fructum speciem esse suspensum credit

Commerfonii V. fo. ramis pumpe petiolis muticis racemis compositis axillaribus
Habitat. in Madagascar In Insula supra oculo armato pubescentibus
Facies procedenti et rami parie aculeati: petioli inermes entror
sum ^{ramis} dilatati quod non in procedente: folia ^{seca} sesquipedaliana
equalia, aut lateralibus altera latere via angustiora lora isolata
utrinque attenuata, venis evidentioribus pedunculis plerumque
gemini ~~ramis~~ ramis alternis, foetana tamen procedenti quoad folia
huic similia