

Verbascum

1. thapsus V. foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simpliciter
2. thapsoides V. foliis decurrentibus, caule ramoso
3. Boeckhianum V. foliis sublyratis supra nudis inferius subtus subtomentosis floribus sessilibus
4. hamorrhoidale V. foliis ovatis-oblongis basi attenuatis tomentosis obsolete crenulatis, racemis spiciformibus elongatis, sepaliis florum et bracteis
5. phlomidis V. foliis lanceolato ellipticis subtus tomentosis antheris petiolatis, bracteis flore longioribus
6. Lychnidis foliis cuneiformi oblongis bracteis longitudine pedicellorum
7. ferrugineum V. foliis sabulosis rugosis: caulinis subsessilibus equaliter crenatis, radicalibus oblongis cordatis duplicato crenatis
8. nigrum V. foliis cordato-oblongis subtus tomentosis
- XXX 9. phoeniceum V. foliis ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoso

10. blattaria V. foliis amplexicaulis oblongis glabris, pedunculis solita
 11. ^{nis} sinuatum V. foliis ^{imbricatis lanceolatis} tomentosis radicalibus pennatis ped. o. repandis cauli
^{nis amplexicaulis, floribus sessilibus} ^{subtus tomentosis}
 12. pennatifidum V. foliis linearis lanceolatis pennatis pedis: laciniis ob
^{tusis dentatis, floribus sessilibus glomeratis}
 13. Barnadesii V. caule subnudo, foliis lanceolatis dentato-sinuatis glabris
^{pedunculis unifloris}
 14. Osbeckii V. caule folioso, foliis dentato-incisis, calycibus cora
^{dis, pedunculis bifloris}
 15. spinosum V. caule folioso spinoso pubescente
 16. mylonii V. scapo nudo, foliis lanatis radicalibus

Ambrosia Triguera
Sebastiani Officini

Scandens Castrium foliis ovatis attenuatis glabris, racemis axillaribus subcompositis,
caule scandente

Habitat prope St. Martham An. v. Rohr 5

Rami teretes, glabri

Folia petiolata, alterna, remota, bipollicaria, serrata, attenuata, acuta
virescens, integerrima, tenera, glabra, obscure venosa

Petoli unguiculares. Stipula nulla. superiores breviores

Pedunculi axillares, solitarii, palmares, teneri, pubescentes. pedicelli
filiformes ^{maiores} superiores, glabri, pollicares superius versus sensim minores remoti;

inferiores uniflori. Floris pedicellati. Bractea parva, lineari,

ad basin calycii

Calyx oblongus, ^{tubo} corolla amplior et splo brevior
quinque dentatus: dentibus minutis ^{pollicariis}, rebus limb in paucis ^{via}

Corolla sesqui-pollicaris: tubus filiformis: laciniis limbi subulato

sepe unguiculares

Stamina ^{filamenta} quinque brevifera versus faucem tubi, dentula - anthera

Globo

germen minutum subglobosum. Stylis capillaris longitudine
tubi. Stigma dilatatum obtusum

agrimoni ~~Verbastrum~~
folium

Blattaria orientalis agrimoidis folio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

habes

Verbascum

Verbascum orientale angusto et oblongo folio

Habitat ad Pontum Euxinum herb. Tournef.

Caulis erectus, simplex, tomento denso, uti spica et folia subtus albidis et
te glabror. Folia radicalia inferne attenuata, pithamea lanceolata, obso-
le dentata, venosa, supra uti reliqua fere nuda; caulina simplicia, ovato-oblonga
acuta, integerrima. Calyces lanati, simpliciter, inferiores remotiores, 2-3. Bractea
lineari lanceolata, uti lacini calycis eamque longitudine. Flores me-
diorum flari

Verbascum

Blattana orientalis, Bugulaefolia, flore matris in
semicirculum formati Tournef. Corpage
Habitat in Oriente herb. Tournef.

Folia indivisa: radicalia ovata, obtusa, simpliciter anisoglabra, dentata; can-
lina linear-lanceolata, alterna, remota, infima simpliciter anisoglabra. Caulis
villosus. Flores papilionacei, remoti, solitarii, bractea bracteolis.
Calyx laciniis lanceolatis, margine villosis.

Verbascum

Verbascum orientale, cony eo folio, flore micante - ferrugineo ad aureum
colorem vergente Tournef. Cor. mag. P.

Habitat in oriente herb. Tournef. simplicissimus superne aphyllus

Caulis erectus, pedalis, raris, hirsutus. Folia radicalia et caulina inferiora
petiolata, superiora sessilia, bipollicaria, ^{vel minor} cordata, oblonga, inaequaliter
crenata, uti petioli hirsuta, obtusa. Pedunculus terminalis: pedicelli soli-
tarii, remoti, unguiculares, unilobii, juniores incano hirsuti. Bractea linea-
res, longitudine fere pedicelli. Calycis lacini lineares. Capsula villosa,
magnitudine Piperis

Micromatum Verbasum

Habitus herb. La Martii

Caulis erectus 6-8 pedalis, frutuosus, foliosus, crassitie penno cygneo. Solum
radicibus petiolatis, pollicariis, ellipticis, crenato-tomentosis, uti caulina:
caulina decurrentia, ovato-oblonga, si penno integerrima, supra compressa,
in medio cordata, recurvata, mucrone hamoso. Pedunculi ramosi, patentes
partiales elongati, fastigiati. Flores distantes, conglomerati, sesplices tomen-
tosi.

Verbascum

Verbascum gracile ^{fruticosum} folio candidissimo Tournef. Cor. 9

Habitat in Graecia herb. Mus.

Totum dense tomentosum. Caulis erectus. Sola radicalia frequentia, pithamocae
^{subtus venosa}

sinuato crenata subpinnatifida; lobi rotundati, integerrima, inferne versus minora:

caulina sessilia, ovato-lanceolata, 3-4 pollicaria, acuta, inferne obtuse sinuata: floralia cordata longitudine foliorum calycium. Spica terminalis, elongata:

flores plures, distantes, ~~Verbasci~~ nigri minores, flavae
obtusis

p. 2. folus inferioribus oblongis, superioribus cordato-subrotundis acutis, floralibus rotundatis

rigidum Verbascum?

Habitat in oriente Herb. Mus.

Totum incanum tomentosum, superne rufum in pedunculis densius. Stola radicalis
cuneata petiolata: caulina decurrentia, lanceolata, suprema ovata, pappi
Spica composita: flores aggregati. Calycis lacinae lanceolatae

Verbascum

Blattaria lutea rugoso folio integro Cupani Hort. Cath.

Habitat in Sicilia herb. Mus.

Totum tomento denso uti Thapsus vestitum. Stipes radice alba pedicellata, prithemosa et
ultra, lysata laciniâ terminali maxima, oblonga ovata, inaequaliter crenata:
caulinea sessili oblonga ~~ovata~~, 3-4 pollicaria, inaequaliter dentata, basi ver-
sus angustata dentibus majoribus incisâ: floralia ovata, integerrima, floribus
longiora. Flores sessili in fructu crassa, oblonga magni-
ca Boeckhii?

reniindam Verbafeum

Habitat in oriente herb. Mas.

Folia radicalia, petiolata, pithumosa, tomentosa, ciliata, reniinata: lobi dentato-sulcati; terminalis ovatus. Scopus erectus, glaber, teres, ramifcus: rami simplices, apyllis. Flores geminati, parvi, racemosi: calycis 5 foliola cuneata

Verbascum

Britannia Hispanica folio undulato, flore maximo. Hort. Lanf.

Habitat in Hispania herb. mus.

Caulis erectus, teres, pubescens. Folia inferiora petiolata, lyrata: lacinae oblongae dentatae, obtusae, terminali maxime, sinuata, lobis obtusis, obtuse dentatis: superiora sessilia ovata, obtusa; floralia cordata, supra glaberrima subtus villosa: floralia villosa. Calycis lacinae rhombae ovatae, serratae. Flores solitarii, breviter pedicellati. Bractea pedunculi vix longior.

Verbascum

Habitat in Lyna herb. Desfont.

Caulis plures, simplices, pedales, erecti, in parte foliis et tomento densi uti
folia lanata incani. Folia radicalia et inferiora petiolata, pollicum, cuneata,
crassa, obsolete crenata, superiora oblonga, sessilia. Spica terminalis
caulis, flores versus basin imperpetuum, semoti, aggregati, tomentoso incani

Hybridum Verbascum

Habitat hort Paris. herb. Defont.

Fomentop. incanum. Folia decurrentia elliptica; unequaliter grosse venata
inferiora pedalia, superiora ovata, acuta, serrulata. Spica ramosa. Flores
aggregati.

urticaefolium Verbascum

Habitat Panpis herb Ventenat.

Caulis herbaceus, tener, glaber. Folia inferna petiolata, spatulata, cordata, supra glabra, subtus villosa, unequaliter grosse dentata incisiva. Racemi superne, elongati. Pedicelli plures, aggregati, unguicularis, inaequalis, uti calycis. Bractea petalis. Calycis lacinae lineares. Corolla Verb. nigri.

Chamae Verbascum

Habitat

hab. Ventenat

Caulis teres, incanus. Folia inferiora petiolata, superiora sessilia ovato-oblonga, obtuse serrata, 2-3 pollicaria, venosa, incana: Strobilia cordato-lanceolata: Pedicelli brevissimi aggregati.

parviflorum Verbascum

Verbascum dentis Leonis folio. utraque argenteo Sherard.

Habitat in Oriente herb. Guss.

^{scapus}
Caulis erectus, simplex, pedalis, subvillosus. Folia radicalia, petiolata, 4-5 polli-
ciana, mucronata, villosa, supra etate glabrona, subtus incana, venos-vegeta,
lacina oblonga, dentata. Pedunculi a basi pro, alterni, frequentes simplicissimi.
Flores remoti, parvi, solitarii, breviter pedicellati, solitarii vel gemini. Pedicelli
somentosi. Calycis foliicola linearia, obtusa. Flores parvi. Folia floralia minutu.

buglossifolium Verbaſcum.

Blattaria orientalis bugloſifolius, flore maximo viſcente, luteis luteis in ſemineculo
ſtatis Tournef. Cor

Habitat in oriente herb. Guſf.

Caulis erectus, pedalis, ſimplicis ſpinosus, teres, glaber. Folia radicalia longe petiolata, ſu-
perius pollicaria, oblonga, glabra, venoſa, ſubrepanda: caulina inferiora petiolata, ſu-
periora ſupſilia lanceolata, ſerrulata, ungui culana, glabra. Petiolus folio longior
ſtrobilus calyce longior, linearis, villoſo canescente, uti calyces. Flores breiter
pedicellati. Calycis lacina lanceolata.

Cynatum Verbascum

Habitat herb. Guss.

Caulis teres, villosus, superne ramosus. Folia petiolata, lyrato-pinnatifida: pinnis oblongis, obtusis, crenatis: superiora petiolata, oblonga, basi attenuata, inaequaliter dentata: floralia cordata, parva, sessilia, dentata; omnia supra nitida infera, subtus villosula, venosa. Pedunculi longitudine foliorum floralium. Calycis lacinae ovatae, serratae, acutae, villosulae, uti pedunculus et petioli.

conf. cum spec. Calpo

cordatum Verbasium folus tomentosi; radicalibus cordatis petiolatis crenula-
tis obtusis: caulinis amplexicaulis integerrimis Desfont.
Fl. mont Atlas pag. 106.
Habitat in monte Atlas

Elytrium Verb. *rupicum* foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis, cauleni
inæqualiter dentatis sub sessilibus, calycis pentaphyllo fœmato L. Mant.

T. E. 2. pag. 33.

Habitat in rupibus ?

folia radicalia Rupibus

pulverulentum. Verbascum. foliis ovato-oblongis, lobis serratis utraque pul-
verulentis, caule, hereti paniculato Smith Fl. Brit. pag. 251.
Engl. Bot. Tab. 407.

Verbascum pulverulentum, flore luteo, parvo Raii Syn. 207.
β. nigro pulverulentum.

Habitat in ruderalis, sepius et marginibus agrorum, solo glareo
siccato calcareo &c.

Totum Yomento pulverulento facile detergendo lectum. Caulis erectus
3-4 pedalis, heri, foliosus, superne paniculatus, ramosissimus, multi-
florus. Folia omnia sessilia, obsolete serrata, vel crenata; radica-
lia allephtico oblonga, pedalia caulina ovata, acuminata, fere
amplexicaulia. Inflorescentia ut in Verb. Lychnitide, sed ramosior et
flores majores, aurei. Stamina villo albo. Smith l. c.

β foliis magis cinnam crenatis, radicalibus petiolatis, caule petio-
losiore purpureo, staminum villo violaceo Smith.

virgatum. Verbascum foliis oblongo-lanceolatis dentatis sessilibus: radicalibus
gublyatis pubescentibus, caule ramoso, floribus aggregatis ^{sub} sessilibus Smith
Fl. Br. pag. 252. Engl. Bot. tab. 550

Blattana magno flore Lob. Ic. 564. Bauh. Hist. 3. pag. 869

Habitat in arvis et ad vias. ♂

Caulis erectus, 5-6 pedalis, a basi ramosus, lignosus, teris, sed pro foliis de-
currentibus angulatus. Rami simpliciter, elongati, virgati, apice racemosi.
Folia radicalia quasi Primula vulgaris, lanceolato-oblonga, rugosa, in-
aequaliter dentato-crenata, basi pennatifido-incisa, subsessilia super-
nitidiuscula, pubes sparsa, deorsum subtus venosa, lanata: caulina
oblongo-lanceolata, dentata et incisa, subsessilia, superiora cordata
dentata, sessilia. Flores subsessiles, flavi, ore purpurascente, maxi-
mi Smith l. c.

par. vi. florum Verbasi foliis pennatis fido - multinatis, ut naque Tomentosi radi-
calibus; caule ramoso, nudis fulo, floribus minimis la Mark
P. En. 2. pag 33.

Habitat in oriente?

Rolus Taraxaci ad Tomentosa

unda Catam Verbasci Tomentosum foliis radicalibus pinnatis crispis; can-
lis septembris induripi, caule rugato, floribus septembris La Mart. T. En

2-pag 93

Verbascum graecum fruticosum foliis pinnatis candidissimis Tournefort.

1-pag 939

Habitat in oriente

bugulofoleum Vest. foliis radicalibus ovatis longe petiolatis nudis caulibus
simplibus caule simplicii La Mart P. E. 2. pag 349

Tournef. A. 2. t. 101.

Habitat in oriente

blathonordes Verb. foliis nudisculis oblongis amplexicaulis; radicalibus pinnatis
to-crenatis pedunculis brevissimis subtrifloris Ca. Martii P. E. p. 2. p. 34
Habitat

mucronatum Verbascum caule alt. spino fructo, apice ramor., foliis subde
currentibus utroque tomentis, supremis acute mucronatis La Mark
T-E. 2. pag 32.

Habitat in Candia ♂

urticifolium Verb. foliis petiolatis subcordatis grosse serratis corolla punctata
tu La Mart. T. E. p. 33. Tom. 2

Habitat
affine verbosio nigro

Thapsus V. foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici L. S. V
fl. Lon. 7. 361.

Verbascum latius Dod. pempt. 143.

Verbascum mas latifolium luteum Bauh. pin. 239

Habitat in Europa glareosis frutibus

Caulis erectus simplex semis bi vel tripedatis ~~tot~~ lanato tomen-
tosis uti tota planta. folia lanceolata elliptica pitha
mosa vel pedalia, ~~superiora~~ dentata superiora acumina-
tonga terminata suprema integerrima. Flores conosi
conferti in spica cylindrica elongata obtusa. Bractea
lanceolata in acumine longitudine florum producta basi
vntus glabra Corolla extus tomentosa

Chaixii V. caule ramoso, foliis nudis cordato petiolatis basi cuneatis Villars
fl. Delph. 2. p. 49. t. 13

non vidi

Pulverulentum V. caule ramoso, calycibus spinosis fasciculatis, corollis lateri-
vallis fl. Delph. 2. p. 490

non vidi

biolle Verb foliis decurrentibus utraque tomentosa, caule simplicis, trigmate
D. Dyma Schrank bayr. Fl. p. 465.
Verbascum biolle Reut. Sylloge 1. p. 91.
Habitat in Bavaria

non vidi

~~Urticoides C. foliis linearibus subulatis ciliatis, floribus axillaribus sessilibus
tubo florum filiformi, caule ramoso fruticatoso
Habitat in Cap. b. j. et
Fruticulus ramosissimus ramis pilosis teretibus foliis frequentibus
semperque ulana cum nidimentis aliorum in axillis
flos laterales copiosi. ^{pelosum} germina parva, germen inferum. semina
spidua~~

in Boella micata L. vix Campanula quamvis sub hoc nomine a Bakker
haberi

Boerhavi V. foliis sublyatis, floribus sesplebis Lin. Mant. 45 +

Verbascum Blattaria foliis nigrum, amplioribus foliis luteis, apicibus purpu-
rascentibus Boek. Lugd. b. 1. p. 228

Verbascum foliis radicalibus ovatis petiolatis, caulinis oblongis sesplebis, subtus
tomentoso serratis Mell. Diet. 8. 273.

Habitat in Europa australi

Caulis ~~simplex~~ folia sesplea, praethulata basi angustis-
sima, serrata, vix tamen lyata supra nudiuscula, subtus
subtomentosa. Specio similibus Thapsi floribus sesplebis
non confertissimis sed ad bractea singulas plumbis majo-
ribus. Corolla lutea

an mea Linnaei. Caulis vix pubescens. Folia radicalia
crenato repanda, sup. caulina oblonga basi in petiolum
attenuata crenata suprema sesplea ovato-lanceola
sa flores solitarii. emoti brevissime pedicellati
Specio facili Blattariae. An mea modo varietas
Blattaria

hemorrhoidale Verbasium foliis ovato-oblongis basi attenuatis tomentosis obsolete
crenulatis, racemis spiciformibus elongatis, basi iculis florum ebracteatis
Hort. Vind. 1. p. 236.
Habitat in Madaga &

Lychnis ^{#1} foliis cuneiformi oblongis L.V.

fl. Dan. T. 506

Verbascum mas angustioribus foliis, floribus pallidis Bauh. pin. 239

Verbascum pulvenulentum, flore cides parvo Bauh. hist. 3. p. 812 72

β. Verbascum candidam femina Buchf. hist. 847.

Verbascum lychnitis, flore albo parvo Bauh. pin 240 Bauh. hist. 3. p. 873

V. Phlomis mas alter Lob. ic. 562.

Habitat in Europa ruderatis cultis &

Caulis erectus purpurascens teretes tomentosus, squamulis
in racemis ramis diffusis. Folia superiora lanceolata

to elliptica inferne angustata crenata supra glabra
superiora ovata lanceolata supra nudiuscula

fructus tomentosus
iniani
radice & radice
bar - couleum
orati.

subtus tomentosus iniani. Racemus compositus
terminalis proter aliquot est simplices est alii in
fere supremis flores copiosi. To calycis ut pedicelli
tomentosi iniani. bractea pedicellati plures. bractea
lanceolata supra glabra longitudine pedicellorum
flores pallidi vel flavi

Semegineum Verbascum foliis subvillosis rugosis: cauleni subsessilibus equaliter
crenatis; radicebus oblongis cordatis duplicato crenatis Hort. Kew. 1. p. 237

Verbascum semegineum Mill. Dict.

Habitat in Europa australi &

non vidi nisi phoeniceum meum est

nigrum V. foliis cordato-oblongis petiolatis Lin. S. V

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente Bauh. pin. 240

Habitat in Europa ad pagos, raras &

Calidis interdum triped alio erectus, simplex, purpurascens tenor
pilis stellatis hinc et inde leviter adpressis. Folia inferiori
pithamisa superne profunde uncinata venosa nigra crenata
obtusiuscula supra subtus incana. Racemus terminalis
elongatus flores sparsi frequentes, saepe pilosus ex eodem
puncto bractea subulata flore brevioribus

subtus tomentosi

phoeniceum ✓ foliis ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo nullo
Sp. Lin. l. V. p. 2194. Jacq. fl. austr. 2. t. 125
Blattaria flore cœrulea vel purpurea Bauh. hist. 3. p. 874
Blattaria purpurea Bauh. pin. 241. Ray hist. 1096.

Habitat in Europa ^{australi} ~~orientali~~ ♂

Caulis erectus, superne subangulatus, simplex, pedalis, rami
ex inferis alis altitudine caulis erit simplices. Folia
radicalia ovata ^{sub} sessilia, nuda, laevia, rugosa vix
crenata. Folia caulina cordata, sessilia glabra, rugo-
venosa. Racemus terminalis pedalis simplex. Peduncul
li solitarii uniflori. Corolla saturate purpurea. filament
sa purpurea barbata tria inferiora superiora barba
alba

mea a Linnaei paululum recedit an ferrugineum Hort
Kew. ex herbo upf. Iconen habeo. Caulis superne suban
gulatus velle cetero ad apicem folia caepe cordato-lanceola
ta crenata inferiora petiolata superiora sessilia utrinque
nuda vix emi 3 superne alterni. Flores di. Stantibus pedicel
li solitarii vel gemini pubescentes bractea subulata longitudine
p. cellorum. barba filamentorum purpurea

Blattana foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis Lin. S. 2

Blattana lutea folio longo lacinato Bauh. pin. 240

Blattana lutea Bauh. hist. 3 pag. 174.

β. *Blattana alba* Bauh. pin. 241.

Habitat in Europa australis anglicis O

Caulis glaber teres superne ramosus. folia superiora cordata
grossè venata acuta bipollicaria. Racemus terminalis. Flores
solitarii alterni remoti pedicelli pubi glandulosi pubescentes
bractea ovata acuminata longitudine pedicellorum. Calyx
foliolo lanceolata raris villosa.

Truncatum V foliis radicalibus pennatifido-repandis tomentosis caulinis amplexi-
caulibus nudiusculis, ramis primis oppositis Lin. spec. pl. p. 254
Verbascum emipium et truncatum Bauh. hist. 3. p. 372
Verbascum nigrum, foliis papaveris corniculati Camer. hist. 403. V. 403
Bauh. pin. 240.

Habitat mofpelijs, Florentia inque Barbana ♂

Caulis erectus, bipedalis stritus, alternatim ramosus tomen-
tosus teris. Folia radicalia lanceolata basi attenua-
ta, tomentosa rugosa obtuse ^{inæqualiter} serrata ^{sub} pinnata
fifida venata. Caulina semiamplexicaulia cordata
lanceolata alterna, par primis in ramis opposita
reliqua alterna, floris alterna ^{sub} sespites 1-4 simul
alterni. bractea ovata longitudine calycis. floris
cubici

Truncatum foliis tomentosis
subsespilibus

floribus

Asbeckia V. foliis incisis nudi, caule folioso, calycibus lanatis pedunculis
bifloris L. S. V.

Blattania orientalis, bugula folio, flore maximo virescente lobis luteis in
penniculum striato. Tournef. corol. p. 11. r. p. 037. 03. Kunth. cent. 5. p.

17. 8. 32.

Habitat in Hispania; circa Bosphorum

Caulis herbaceus glaber folia ovato oblonga basi in
petiolum attenuata retinetque ^{stipulae} glabra serrato-incisa
superiora sessilia. flores axillares solitarii biflori Calycis
lanati. Corolla violacea.

9-10 pinnatifidum ^{Verbascum} foliis lance linearibus - lanceolatis pinnatifidis: laciniis
obtusis dentatis, floribus sessilibus glomeratis

In Insulis Archipelagi legit Dioscorides

Caulis erectus, pedalis, basi tomentosus, statura glaber, teres, inferne
ramosus.

Folia inferiora et caulina petiolata, bipollicaria, crassiuscula
supra glabra, subtus tomentosa: laciniis inaequalibus, oblongis
obtusis, saepe dente uno alterove obtuso dentatis: folia sub
ramis sessilia, dentata incisa.

Flores sessiles in ramis, alterni, remoti, tres vel quatuor simul:
foliola sterilia lanceolata, integra ^{longiora} ~~calycibus~~ ^{longiora} ~~calycibus~~
longiora.

Calyx valde tomentosus, inaequalis.

A Verbasci pinnato differt. foliis radicalibus et caulinis
pinnatis. profunde divisis, petiolatis ~~in~~ an a Verbasci: g^oco Tournef
corol. pag. 8 diversa?

0011 Bas nadesi Verbascum caute subnudo, foliis lanceolatis semper subpinnatifidis
laciniis dentatis, pedunculis unifloris

Habitatio colliculis de hinc capie versus oppidum Ortaleza tractus
madritensis Barnades pater specimen communicavit filius
inventoris de Barnades

Colia ^{tripolliciana} pluriana radicalia, petiolata, lamina angusta, subtus
laciniis lanceolatis dentatis, basi minus profunde divisa
senis majore denticulatis

Pedunculi solitarii patentes remoti, pollicares

Caulis pedalis, glaber simplicis spinis foliis inferne foliolo uno
alterove lanceolato integro

Pedunculi a basi caulis ad apicem usque, solitarii uniflori
remoti, pollicares uniflori. Soliolum cordatum parvum
cuspidatum ad basim singuli floris

Calyx laciniis inaequalibus tribus oblongis duobus majoribus
subrotundis, omnibus subdenticulatis

Corolla flava

an folia potius lanceolata dicenda

710. Barnadesii Verbascum ^{Verbascum lanceolatis dentato-} glabris,
caule subnudo, foliis sinuatis pennatifidis dentatis,
pedunculis unifloris

Habitat in colleculis de Linca p[er] versus oppidum Oñate
tractus Madritensis. Specimen unicum communicavit Cel.
Dr. Barnades filius inventor.

+ Folia plurima radicalia, vix tripollicaria, petiolato, ^{bo} ^{lanceolata} angusta
+ dentato-sinuata basi minus profunde ^{divisa} ^{acutis}: laciniis lanceolato, dentatis, sinus majores denticula
causa vel subpenna ^{ti}: caulina integra
Vesida

1 Caulis pedalis, glaber simplicissimus; inferne folio uno alterove

Pedunculi a basi ad apicem usque, solitarii, remoti, pollicares
uniflori. foliolum ^{um} ^{simplex} cordatum, parvum, cuspudatum ad basin
h[uius]modi floris.

quomodo calycis Calycis laciniis inaequales, tres oblongo, duo subrotundo majores
omnes subdenticulato ^{glabris} ^{oblongo} ⁱⁿ ^{petalorum} ^{oblongis} ^{petiolatis}
Corolla flava ^{foliis} ^{caudicis} ^{obovatis} ^{denticulatis}

Verbascum oblectivum differt caule foliosque pedunculis calycibusque
lacinatis. Verbascum sinuatum distinguitur foliis oblongis
tomentosis, floribus sessilibus aggregatis

myconi Verb. foliis lanatis radicalibus, scapo nudo Lin. f. V. pag

Mil. ii.

4.274

Accurcula usq. myconi Dalech. hist. 837. Bauh. hist. 3. p. 869

Sanicula alpina, foliis Boraginis, villosa Bauh. pin. 243.

Habitat in Pyrenaeorum nemorosis &

Folia radicalia spatulata, pollicaria obtusa velles densi terti.

Scapus erectus simplicissimus teres vix pilosus digitalis.

Floros 2 vel 3 vespis apicem nutantes. filamenta glabra

Junosum Verba scam caule foliosopinoso frutescente Lin. S. V. pag
220

* Erudex semipedalis, rigidus, ramosisimus. Rami alterni, seseter
tomentosi, incani; inferiores state nudi

Folia sessilia, alterna, unguiculata, tomentosa, lanceolata, ba-
si attenuata obtusa, inferne laciniis utroque geminis otto-
bas. Fasciculus foliorum in axillis: folioli cuneiformibus
integri.

Racemus terminalis, ^{flexuosus} inferne ramosus, rigidus. Pedunculus in
Junam desinens. Pedicelli rigidi, ^{alterni} uni flori interdum, ~~et~~ ^{et} ~~saepe~~
Coco ^{pedicelli} ~~pediculi~~ spina patentissima, alterni vel oppositi.

Bractea ovata, minuta sub linguula pedicello

Calycis laciniis ovato

Corolla parva exilis tomentosa

Capsula magnitudine seminis Coronidis, glabra

(Figura Alpini minuscula mala

Erudex Junosum Alp. bot. 3. 7. 136
Agrostoides 1. cretica
Methastem Junosum verticem Cb. Alp. 113
Racemum coccinum Junosum micranum Lichm
Mach. Jun. 101.
Verba scam verticem Junosum frutescens Tourne
Cv. 8.
Verba scam Cb. 5

V. Chaixi Vall
hemorrhoidale
regium
ferrugineum
obedum) Bantf.